

Corpus confertim subtiliter punctulatum, pube tenuissima depressa flavescenti vestitum, fusco-testaceum, abdomen ante apicem nigro. Antennae thorace sesqui longiores, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulo tertio secundo paulo longiore, quarto tertio paulo crassiore at dimidio breviore, 5—10 longitudine aequalibus, transversis, sensim paulo crassioribus, subcylindricis, ultimo maiusculo, praecedentibus tribus coniunctis longitudine prope aequali et paulo crassiore, subovato, apice subacuminato, rufae, articulo ultimo ferrugineo. Caput fronte leviter convexa. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine duplo brevior, antrorsum leviter angustatus, lateribus et angulis anterioribus rotundatus, apice leviter emarginatus, basi leviter bisinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominulis, rotundatis, supra parum convexus, margine laterali late planato. Elytra thorace paulo longiora, subdepressa. Abdomen longius pubescens et praecipue versus apicem parcus profundiusque punctatum.

Dinarda Leach.

Mannerh. Brachelytr. p. 65. — Er. Col. March. I. p. 373.
Lomechusa Curtis Britt. Ent. IX. t. 410.

Maxillae mala interiore unco simplice terminata.

Ligula angusta, bifida; paraglossae latae, breves, rotundatae.

Palpi maxillares 3-articulati, articulo secundo paulo breviore.

Tarsi antici 4-, posteriores 5-articulati, postici articulo primo vix elongato.

Corpus latiusculum, alatum. Caput parvum, rotundatum, insertum, oculis parvis rotundatis, vix prominul. Labrum breve, apice truncatum, lateribus rotundatum, mandibulas haud obtengens. Mandibulae muticae. Maxillae (t. III. f. 24.) mala exteriore interiore haud superante, cornea, apice membranea, dense pubescente, mala interiore cornea, margine interiore membraneo, longius dense introrsum barbato, margine exteriore incrassato, apice unco simplice introrsum spectante malam terminante. Palpi maxillares breviores, articulo secundo tertio paulo breviore, hoc parum incrassato, quarto tenui, subulato. Labium (t. III. f. 15.) mento brevi, apice emarginato, ligula angusta, palporum labialium articulum primum paulum excedente, bifida, paraglossis ligula duplo brevioribus, triangulariter acuminatis. Palpi labiales triarticulati, articulo primo crassiusculo, maiore, secundo tertio paulo breviore. Antennae breves, crassae, medium versus incrassatae, articulo secundo tertio duplo fere breviore, hoc leviter elongato, obconico, articulis 5—10 subtransversis, arcte coactis, ultimo longiore, subacuminato. Thorax coleopterorum latitudine, brevis, antrorsum angustatus, apice profunde emarginatus, basi bisinuatus, margine laterali dilatato, plano, angulis posterioribus elongatis, acuminatis. Scutellum triangulare. Elytra apice truncata, ad angulum exteriorem profunde emarginata, hoc elongato, acuminata. Abdomen apicem versus sensim angustatum, supra planiusculum, subtus leviter convexum, segmento septimo conspicuo, liceat minuto. Pedes breves, intermedii approximati, tarsi antici 4-, posteriores 5-articulati, postici articulis 4 primis sensim subdecrecentibus.

Observationes.

- Genus satis distinctum, cuius affinitates partim cum Lomechusa, partim

cum Aleochara esse videntur, illis thoracis elytrorumque forma et maxillarum mala interiore apice uncinata, his corporis habitu et labii structura propria accedit.

2. Differt ab Aleochara imprimis ligula graciliore, palpis labialibus triarticulatis, maxillarum mala interiore apice uncinata, palpis maxillaribus articulo conico-acuminato terminatis, thorace lateribus dilatato, tarsis anticus 4-articulatis.

3. Differt a Lomechusa praecipue antennis brevibus, fusiformibus, ligula bifida, paraglossis distinctis, maxillarum mala interiore unco simplice terminata, thorace apice emarginato, abdomen non revoluto, segmento sexto dorsali integro, pedibus brevibus, intermediis basi approximatis.

4. Differentias ab Euryusa in huius generis illustratione notavi.

5. Dom. Curtis Dinardam dentatum pro generis Lomechusa e typ depinxit. Oris partes dissecatae ab eadem desumptae, at uncus corneus, quo maxillarum mala interior terminatur, et paraglossae auctorem fugerunt, ceterum illae sat exacte depictae.

6. Sexus differentia abdominis segmento inferiore penultimo in maribus emarginato constare videtur.

7. Victus in formicetis.

* 1. *D. dentata*: Nigra, thoracis lateribus elytrisque brunneis, capite thorace elytrisque crebre punctatis. — Long. 1½—2 lin.

Mannerh. Brachelytr. 65. 1. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 524. 1. — Runde Brachelytr. Hal. 27. 1. — Er. Col. March. I. 374. 1.

Lomechusa dentata Grav. Mon. 181. 4. — Gyll. Ins. Suec. II. 441 4. — Zetterst. Ins. Lappon. 74. 3. — Curtis Britt. Ent. IX. t. 410.

Staph. strumosus Payk. Fn. Suec. III. 402. 45.

Habitat in Europa.

Nigro-picea, sericeo-micans. Antennae capite sesqui longiores, crassiusculae, subfusciformes, articulo quarto praecedente dimidio breviore, at paulo crassiore, 5—10 transversis, sensim paulo crassioribus, ultimo praecedentibus ambo longiore, at minus crasso, apicem versus sensim attenuato, nigrae, basi apiceque ferrugineae. Caput dense punctatum, fronte subimpressa, antice retusa, ore rufescente. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos plus duplo brevior, antrorsum angustatus, lateribus fortiter ampliato-rotundatus, apice profunde emarginatus, basi profunde bisinuatus, angulis posterioribus retrorsum valde prominulis, anterioribus obtusis acuminatis, supra lateribus late explanatis, medio parum convexus, obsolete canaliculatus, confertum punctatus, breviter pubescens, niger, lateribus late obscure ferrugineis, seu saturate rufo-ferrugineus, disco nigro. Elytra thoracis longitudine, confertim punctata, breviter pubescentia, ferruginea, angulo apicis exteriore retrorsum valde prominulo, acuminato. Abdomen segmentis tribus anterioribus parcus, posterioribus tribus parce punctatis, supra parcus, subtus densius longiusque fulvescenti-pubescentis, segmentorum marginibus anque ferruginei. Pedes ferruginei.

Obs. Insectum rarum, plerumque in Formicae rufae nidis obvium. Dom. Aubé eam etiam in Formicae cuniculariae societatibus observavit, et exempla prope Lutetiam in silva Boloniensi ex utroque formiceto cum formicis benevole mihi communicavit. Specimina cum F. rufa degentia omnino congruent cum iis, quae e Germania, Hungaria et Suecia hic exstant, individua e nidis F. cuniculariae recepta illis quidem sunt duplo minora, ceterum vero nullo modo distincta. Cave igitur, ne in variis formicetis varias hospitum species gigni credas. Forte eiusdem speciei magnitudinis varietas e vario insecti loco natali derivanda, cum apud formicam maiorem individua maiora, apud minorem minora nascantur.

Lomechusa Grav.

Grav. Mon. p. 178. — Mannerh. Brachelytr. p. 65. — Er. Col. March. I. p. 375.

Maxillae mala interiore unco duplice terminalae.

Ligula brevis, integra; paraglossae nullae.

Palpi labiales 3-articulati, articulo primo paulo maiore.

Tarsi antici 4-, posteriores 5-articulati, postici articulo primo elongato.

Corpus latiusculum, crassiusculum, alatum. Caput minutum, sub-porrectum, fronte planiuscula, oculis parvis, rotundatis, modice prominulis. Labrum transversum, apice truncatum, mandibulas haud obtegens. Mandibulae muticae. Maxillae (t. III. f. 25.) mala exteriore cornea, apice membrana pubescenteque, malam interiorem paulo superante, hac cornea, margine interiore membraneo, pubescente, exteriore incrassato, apice unco bispino, introrsum spectante, malam terminante. Palpi maxillares breviores, articulo secundo apicem versus leviter incrassato, tertio hoc paulo crassiore, haud incrassato, quarto parvo, subulato. Labium (t. III. f. 16.) mento transverso, apice emarginato, ligula lata, rotundata, integra, paraglossis nullis. Palpi labiales 3-articulati, articulo primo crassiusculo, maiore, secundo hoc duplo minore, tertio secundo tenuiore et parum longiore. Antennae elongatae, fortes, apicem versus subattenuatae, articulo primo incrassato, ultimo leviter elongato, acuminato. Thorax coleopterorum latitudine, apice truncatus, basi bisinuatus, margine laterali dilatato, incrassato, angulis anterioribus rotundatis, posterioribus acuminatis, disco plano. Scutellum triangulare. Elytra apice truncata. Abdomen parallelum, subitus convexum, supra planum, revolutum, segmentis tribus primis margine barbato, sexto apice late profundeque emarginato, lobis acuminatis, septimo superiore in praecedentis sinu sat conspicuo, inferiore occulto. Pedes elongati, crassi, intermedii basi late distantes, tibiae apice subattenuatae, tarsi tenues, haud elongati, antici 4-, posteriores 5-articulati, postici articulo primo modice elongato.

Observationes.

1. Habitus huius generis valde singularis, corpore in hac tribu maiusculo, crasso, abdome fortiter revoluto, capite minuto, antennis validioribus, filiformibus, elongatis, acuminatis, pedibus elongatis, sat robustis, thorace margine dilatato, basi profunde bisinuato, abdominis segmento dorsali sexto emarginato. Maxillarum structura eadem fere ut in Dinarda, at mala interior unco duplice sive fisso terminalata. Labii forma magis cum Gyrophaena convenit, at ligula latior et palpi labiales triarticulati. Habitu Myrmeconiae nunnullae quodammodo Lomechusae speciem prae se ferre videntur antennis fortioribus rigidis, abdome revoluto et pedibus intermediis basi late distantibus.

2. Gravenhorst genus Lomechusam praecipue secundum thoracis elytrorumque formam condidit, quare etiam L. dentatam, reliquis omnibus notis adeo distinctam, huic generi subiunxit. Mannerheim, Lomechusam et Dinardam palporum maxillarium articulo ultimo conico-acuto a reliquis Aleocharinis distinxit, in Lomechusa autem palpi maxillares articulo terminali eodem modo quam in reliquis huius tribus generibus constructo mihi videntur.

3. Atemelis Dillwyn seu Goniodes Kirby, (Stephens Illustr. V. p. 107.) certe idem hoc genus, cui L. strumosa adscribitur, thoracis angulis posterioribus obtusis a Lomechusa thoracis angulis posterioribus acuminato-spinosis distinctum. Lomechusae typum Dom. Stephens L. emarginatam afferit, dubito autem, an eadem sit ac nostra, cum ei antennae medio magis incrassatae et fortius fusiformes quam Lomechusae et Dinardae tribuantur (p. 109.); neque spicandum est, hanc meram esse Dinardam dentatam, cum abdominis segmentum penultimum emarginatum, processibus duobus styliformibus instructum et pedes elongati descripta sint.

4. Hospitatur hoc genus in formicetis. Villis in abdominis basi forte quaedam analogia est cum illis, quos Müller (Germ. Mag. III. p. 79. et 95.) in Clavigero fo-veolato observavit. Notatu dignum videtur, quod reliqua huius tribus insecta, quae-cunque in formicetis degunt, his villis destituta sunt.

* 1. *L. strumosa: Ferruginea, thorace subtiliter granulato, canaliculato, antrorsum angustato. — Long. 3 lin.*

Grav. Mon. 179. 1. — Gyll. Ins. Suec. II. 437. 1. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 403. 1. — Zetterst. Ins. Lappon. 64. 1. — Mannerh. Brachelytr. 65. 1. — Runde Brachelytr. Hal. 27. 1.

Staph. strumosus Fab. Ent. Syst. I. II. 525. 28. Syst. El. II. 597. 36.

Aleochar. strumosa Grav. Micr. 91. 35. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 387. 35.

Habitat in Germania, Suecia.

Obscure rufo-ferruginea, elytris pedibusque paulo dilutioribus. Antennae articulo primo breviuscule, crasso, tertio secundo duplo prope longiore, clavato seu apice subito incrassato, 4—10 cyathiformibus, sensim paululum longioribus, ultimo praecedente duplo prope longiore, acuminato, pube brevissima subtilissima depresso albida obducta. Caput laeve, pilis parcis depressis griseis adspersum, antice subretusum, fronte late impressa. Thorax basi coleopteris parum angustior, antrorsum angustatus, lateribus et angulis anterioribus rotundatus, apice truncatus, basi profunde bisinuatus, angulis posterioribus retrorsum vix prominulis, subrectis, apice summo rotundatis, lobo intermedio fortiter producto, rotundato, supra medio subdepressus, subtiliter canaliculatus, margine laterali late elevato, crassiusculo, parce subtiliter granulatus, pilis subtilissimis depressis griseis adspersus. Elytra thorace paululum longiora, apice truncata, subtiliter punctata, pube subtilissima depresso grisea adspersa. Abdomen medio fuscum, segmentis basalibus margine laterali et apicali fulvo-villosis, segmento dorsali sexto minus profunde emarginato, lobis lateralibus triangularibus. Pedes fulvo-tomentosi, basi glabri.

Difert sexu abdominis segmenti dorsalis quinti angulo apicali aut simplice aut lateraliter elevato prominuloque.

Obs. Prof. Sahlberg hanc speciem in societate cum Formica, (Myrmica) rubra lectam esse memorat.

* 2. *L. paradoxa: Ferruginea, thorace laevi, utrinque leviter impresso, lateribus rotundato-ampliato. — Long. 2—2½ lin.*

Grav. Mon. 180. 3. — Gyll. Ins. Suec. II. 438. 2. — Germ. Faun. Ins. Europ. V. 2. — Mannerh. Brachelytr. 65. 2. — Guér. Iconogr. Regn. Amin. Ins. t. 10 f. 6. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 526. 1. t. 2. f. 2. — Runde Brachelytr. Hal. 27. 2. — Er. Col. March. I. 376. 1.

Staph. emarginatus var. Payk. Mon. Staph. p. 57. not. Faun. Suec. III. p. 402. not. — Oliv. Ent. III. 42. t. 2. f. 12. b.

Habitat in Europa.

Sequenti valde affinis, at plerumque paulo maior, saturate ferruginea vel brunneo-testacea. Antennae articulo primo crasso, tertio elongato, secundo duplo prope longiore, apicem versus sensim leviter incrassato, 4—10 crassitie aequalibus, sensim paulo longioribus, prioribus transversis, ultimis crassitie haud longioribus, ultimo praecedentibus ambobus longiore, sensim attenuato et acuminato, pube subtilissima longiore albida vestita,

certo situ quasi velatae. Caput inter antennas leviter impressum, glabrum, nigricans, ore ferrugineo. Thorax latitudine dimidio prope brevior, coleopteris vix angustior, antrorum haud angustatus, lateribus ampliatus, pone medium subsinuatus, ante medium cum angulis anterioribus rotundatus, apice truncatus, basi profundius bisinuatus, angulis posterioribus oblique productis, acutis, lobo intermedio subtruncato, laevis, glaber, obsolete canaliculatus, utrinque leviter impressus, margine lateralii elevato, incrassato, Elytra thorace paulo longiora, apice sinuata, confertissime subtilissimeque punctata, subtilissime fulvo-pubescentia. Abdomen parce subtilissime punctulatum, segmentis basalibus margine lateralii fulvo-villoso, segmentis quarto quintoque nigris, segmento dorsali sexto profunde emarginato, lobis acuminatis, spiniformibus, apice villosis. Pedes glabri.

Sexus differentia latet.

Obs. 1. In *Myrmicae rubrae* nidis D. Aubé hanc speciem cepit, „in societate cum *Formica parva nigra*“ eam repertam esse refert Gyllenhal (Ins. Suec. IV. p. 495.); ipse eam in gramine prope *Formicae rufae* nidos legi. Conf. quae apud Dinardam dentatam observavi.

2. Specima illa, quae ipse prope oppidum Freyenthal legi cum exemplis Suecis a Dom. Schüppel communicatis congruunt statura maiore et colore saturatiore. Exempla collectionis Hoffmannseggiana, a Dahllo in Germania transrhenana lecta his sunt minora et pallidiora, statura et colore L. emarginatae aequalia. Specimina Lutetiae collecta, a Dom. Aubé mihi communicata, his intermedia sunt.

3. *Staphylinus emarginatus* Oliv. a Gravenhorstio ad hanc, a Gyllenhalio ad sequentem speciem allegatur, mihi ambae ab Oliviero sub nomine illo confusae videntur; fig. a. *L. emarginata*, fig. b. *L. paradoxam*, praecipue secundum thoracis formam bene exhibet.

* 3. *L. emarginata*: *Ferruginea, thorace subtilissime punctulato, antrorum angustato.* — *Long. 2 lin.*

Grav. Mon. 179. 2. — Gyll. Ins. Suec. II. 440. 3. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 404. 2. — Mannerh. Brachel. 65. 3. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 526. 2. — Runde Brachelytr. Hal. 27. 3. — Er. Col. March. I. 376. 2.

Staphylinus emarginatus Payk. *Mon. Staph. 56. 40. Faun. Suec. III. 401. 44. — Fab. Ent. Syst. I. II. 528. 46. Syst. El. II. 600. 57. — Oliv. Ent. III. 42. 31. 44. t. 2. f. 12. a.*

Habitat in Europa.

Ferruginea, vel rufo-testacea, abdome ante apicem pectoreque piceis nigrisve, saepius quoque capite, nonnunquam etiam thoracis disco vel thorace fere toto nigricantibus. Antennae articulo primo crasso, secundo tertio obconicis, hoc paululum longiore, 4—10 cylindricis, sensim paulo longioribus, prioribus crassitis vix brevioribus, ultimis eadem paulo longioribus, apicali elongato, praecedentibus tribus coniunctis longitudine aequali, sensim attenuato et acuminato, dense subtilissime longius albido-pubescentes ut in praecedente. Caput subtilissime punctulatum, inter antennas obsolete impressum. Thorax latitudine baseos dimidio brevior, basi coleopterorum prope latitudine, antrorum aequaliter angustatus, ante medium cum angulis anterioribus rotundatus, apice truncatus, basi profundius bisinuatus, angulis posterioribus oblique productis, valde acuminatis, lobo intermedio leviter rotundato, supra subtilissime punctulatus, obsolete canaliculatus, utrinque leviter impressus, margine lateralii elevato, haud incrassato. Elytra thorace

paulo longiora, apice exterius leviter sinuata, confertissime subtiliter punctata, pube subtilissima depressa fulva densius vestita. Abdomen parce subtilius punctatum, segmentis duobus primis margine laterali fulvo-villoso, dorsali penultimo profunde emarginato, lobis acuminatis, spiniformibus, apice villosis. Pedes glabri.

Sexus differentia latet.

Obs. 1. Praecedenti simillima et aegre distinguenda, differt autem thorace antrorum sensim angustato, angulis posterioribus paulo acutioribus, dorso punctulato et antennis paulo longioribus, articulo ultimo magis, articulo tertio autem non elongato.

2. Habitat secundum Gyllenhal semper in *Formicae rufae* nidis, Dom. Aubé autem specimen in *Formicae cuniculariae* societate legit. Forte, ut affines, in variis formicetis obvia.

3. In Museo Regio exemplum inveni patria America septentrionali signatum, certe ad hanc speciem pertinet, an etiam patria eius indubia?

Species mihi invisa.

4. *L. inflata*: *Parum punctata, fusco-rufescens, antennis subfiliformibus, thoracis lateribus incrassatis, elytris pedibusque saturate rufo-testaceis, thoracis elytrorumque angulis posticis prominulis.*

Zetterst. Faun. Lapp. I. 95. 1. Ins. Lapp. 74. 2.

Habitat in Lapponia rarissime, sub cortice Betulae albae emortuae et trunco perforato unicum specimen cum *Formica rufa* ad Wittargi Lapponiae Tornensis, initio mensis Junii inveni.

L. strumosa similis et affinis, sed differt antennis dilutioribus, thoracis lateribus magis incrassatis, disco obscuriori, et quod duplo minor et ultra, *L. paradoxae* aequalis. Caput parvum, nigrum, laeve, fronte foveata. Os rufescens. Antennae elongatae, rufo-ferrugineae, articulo primo crassissimo, 2 brevissimo, 3 longiore, obconicis, 4—10 nodiformibus, remotis, subaequalibus, ultimo elongato, angustiore, conico, acuto. Thorax fere ut in *L. strumosa* formatus, scilicet brevis, transversus, postice in medio productus, utrinque sinuatus, angulis subrectis, minime prominulis, supra discum depresso, inaequalis, vix canaliculatus, margine antico et postico parum, lateribus valde elevatis, et his etiam incrassatis, fusco-piceus, nitidus, lateribus ferrugineo-testaceis, opacis, totus parce et obsolete punctulatus, subpilosus. Elytra, abdomen et pedes omnino ut in *L. strumosa*, etiam quoad pubescentiam. (Zett.)

Obs. Pedibus tomentosis propriis ad *L. strumosa*, quam ad *L. paradoxam* accedere videtur.

Silusa Er.

Er. Col. March. I. p. 377.

Maxillae malis inaequalibus, interiore elongata, cornea, apice uncinata, intus subserrata.

Ligula elongata, angusta, integra.

Palpi labiales exarticulati, setacei.

Tarsi antici 4-, postici 5-articulati, omnes articulis primis aequalibus.

Corpus elongatum, lineare, supra depresso, subtus sat convexum, ala-

tum. Caput exsertum, deflexum, basi haud constrictum, subglobosum, ore attenuato, leviter elongato, oculis mediocribus, minus prominulis. Labrum minutum, semiobtusum. Mandibulae muticæ. Maxillæ (t. III. f. 26.) mala interiore valde elongata, cornea, cultriformi, apice acuto introrsum aduncus, margine interiore ante apicem spinulis minutis brevissimis serrulata, dein tenuiter ciliata, mala exteriore haud elongata, interiore duplo breviore, medio cornea, basi apiceque membranæ, portione membranæ apicali pubescente. Palpi maxillares malam interiore parum excedentes, articulo secundo tertioque subaequalibus, illo elongato-subobconico, hoc tumidulo, quarto minuto, subuliformi. Labrum (t. III. f. 17.) mento sat magno, apice sat fortiter emarginato, ligula tenui, filiformi, integra, paraglossis nullis. Palpi labiales setacei, valde elongati, prominuli, subarticulati, articulo primo secundoque subaequalibus, tertio minimo. Antennæ crassiœculæ, articulo secundo tertioque obconicis, subaequalibus, 5—10 subtransversis, ultimo oblongo-ovato. Thorax transversus, basi coleopterorum prope latitudine, apicem versus parum angustatus. Scutellum triangulare. Elytra apice truncata, ad angulum exteriorem profunde excisa. Abdomen parallelum. Pedes breviusculi, intermedii basi approximati, tarsi antici 4-, posteriores 5-articulati, articulis 4 primis aequalibus.

O b s e r v a t i o n e s .

1. Genus oris fabrica satis distinctum, mandibularum mala altera solita strucutra, altera elongata, ambiguum quasi inter praecedentia et sequentia.
2. Habitu Aleocharæ generis quibusdam speciebus accedit, a quibus tarso-rum structura differt. Tarsis anticis 4-articulatis, posterioribus articulis 4 primis inter se aequalibus cum Homalotis convenit, a quibus praeter caput basi haud constrictum et os attenuatum nisi ore accuratius inspecto aegre distinguatur.
3. Abdominis segmentum inferius sextum maris apice bisinuatum, medio leviter productum, feminae rotundatum.
4. De victu nihil mihi cōpertum.

* 1. *S. rubiginosa*: *Confertim punctata, nigra, antennis, pedibus elytrisque rufis, his circa scutellum anguloque exteriore apicis fuscis, thorace basi foveolato*. — Long. 1½ lin.

Er. Col. March. I. 378. 1.

Habitat Berolini, Dom. Schüppel et Dom. Weber, in Austria, Dom. Schüppel, Lutetiae, Mus. Dom. Aubé.

Corpus totum griseo-puberulum. Antennæ vix capitum thoracisque longitudine, rufae. Caput laeve, subnitidum, nigrum, ore rufescente. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine duplo fere brevior, lateribus leviter rotundatus, antrorsum vix angustatus, angulis anterioribus rotundatis, posterioribus rectis, parum convexus, subtilissime punctatus, basi foveola transversa impressus, niger, margine lateralí obscure rufescente. Elytra thorace paulo longiora, confertim fortiter punctata, sutura elevata, opaca, rufa, macula communis scutellari anguloque posteriore exteriore fuscis, seu fusca, vitta lata oblique ab humero ad angulum interiore descendente rufa. Abdomen densius fortiter punctatum, minus subtiliter pubescens, nigrum, segmentis quatuor primis margine piceis. Pedes rufi.

Mas abdominis segmento dorsali quinto acute carinato distinctus.

Obs. 1. Al. *foveolatae* Dej. nomine hoc insectum in collectione D. Aubé signatum vidi.

2 Labrum maiusculum, mandibulas omnino obtusas.

* 2. *S. rubra*: *Punctatissima, rufa, abdomen supra parce punctato, ante apicem capiteque piceis, thorace basi fovea lata impresso*. — Long. 1½ lin.

Habitat in Germania meridionali, Dom. Schüppel.

Statura omnino praecedentis, rubra seu rubro-testacea, punctatissima, subtiliter pubescens. Antennæ capitis thoracisque longitudine, apicem versus subincrassatae. Caput confertim sat fortiter punctatum, infra antennas laeve, nigro-piceum, oris partibus rufo-testaceis. Thorax coleopteris parum angustior, latitudine dimidio brevior, lateribus leviter rotundatus, angulis omnibus subrectis, anterioribus deflexis, leviter convexus, confertim sat profunde punctatus, basi fovea transversa, antrorsum explanata, media et utrinque puncto impressus. Elytra thorace paulo longiora, fortiter punctata, subrugosa. Abdomen elongatum, obscure rufum, ante apicem nigricans, supra parce punctatum, segmentis posterioribus sublaevibus. Pectus piceum. Pedes flavo-testacei.

Mas abdominis segmento dorsali quinto bicarinato insignis. Femina mihi invisa.

Variat colore minus saturo, rufo-testaceo, capite pectoreque concoloribus.

Obs. Labrum minus quam in praecedente, et mandibulae sub eodem prominentes. Nihilominus cum praecedente, quantum examinatione exteriore videre licet, oris reliqui et praecipue maxillarum structura haud differt.

Pronomaea Er.

Er. Col. March. I. p. 378.

Maxillæ malis aequalibus, elongatis, interiore cornea, apice uncinata, intus serrata.

Ligula bifida, minuta, sub mento occulta; paraglossæ nullæ.

Palpi labiales exarticulati, setacei.

Tarsi antici 4-, posteriores 5 articulati, postici articulo primo elongato.

Corpus elongatum, lineare, supra subdepressum, infra modice convexum, alatum. Caput exsertum, cernuum, basi haud constrictum, ore attenuato, valde elongato, oculis mediocribus, parum prominulis. Labrum dependens, fere oblongum, apice rotundatum, mandibulas obtusas. Mandibulae muticæ, membranula fimbriatae, apice libero, acuto, introrsum aduncus. Maxillæ (t. III. f. 27.) mala utraque elongata, lineari, tenui, interiore cornea, apice acuto, introrsum aduncus, margine interiore apicem versus spinulis minutis deorsum versis serrulata, inferius ciliato, mala exteriore membranacea, margine tenuissimo interiore apiceque membranæ, apice pubescente, malæ interiori aequali. Palpi maxillares elongati, articulis secundo tertioque aequalibus, parum incrassatis, quarto minimo, subulato. Labium (t. III. f. 18.) mento sat magno, apice profunde exciso, ligula brevissima, biloba, sub mento occulta, paraglossis nullis. Palpi labiales valde elongati, setacei, exarticulati. Antennæ apicem versus sensim subincrassatae, articulo secundo

tertioque subaequalibus, ultimo ovato. Thorax coleopterorum latitudine, apicem versus haud angustatus. Scutellum triangulare. Coleoptera apice coniunctim leviter emarginata, ad angulum apicalem exteriorem profundius excisa. Abdomen lineare. Pedes breviusculi, intermedii brevi spatio distantes, tarsi antici 4-, posteriores 5-articulati, postici articulo primo subelongato.

Observationes.

1. Mentum magnum, ligulam omnino occultans, quae nonnisi mento destructo conspicitur.

2. Habitus corporis linearis Oxypodae Sect. II, a qua autem non modo tarsis anticis 4-articulatis distinguitur, sed capite etiam tumido, ore producto, attenuato, fere rostrato, palpis maxillaribus elongatis et labialibus quam plurimum exsertis, setaceis discedit.

3. Sexus differentiam non cognovi.

4. Victor in silvis in musco et sub foliis deciduis.

* 1. *P. rostrata*: Nigra, nitida, thorace basi foveolato, elytris pedibusque piceis. — Long. 1½ lin.

T. 1. f. 3.

Er. Col. March. I. 379. 1.

Habitat in Germania, Gallia. In Sardinia etiam a Dom. Prof. Gené lecta.

Linearis, nigra, nitida, subtiliter punctata, tenuiter pubescens. Antennae capite thoraceque breviores, crassiusculae, obscure piceae, basi dilutiores, apice summo ferrugineo. Caput sat magnum, subtilissime punctulatum, fronte leviter convexa, clypeo apice membranaceo, luteo, labro piceo. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine dimidio brevior, lateribus subrectis, basin versus subangustatus, angulis anterioribus rotundatis, deflexis, posterioribus obtusis, supra leviter convexus, subtiliter punctulatus, basi foveola impressus. Elytra thorace paulo longiora, cebre fortius punctata, longius pubescens, picea. Abdomen supra parce punctatum, fere laevigatum, parce pubescens, ano piceo. Pedes rufo-picei.

Diglossa Haliday.

Entomol. Mag. IV. p. 252.

Maxillae malis aequalibus, elongatis, exteriore cornea, apice uncinata, intus serrata.

Ligula sub mento occulta.

Palpi labiales exarticulati, setacei.

Tarsi omnes 4-articulati.

Corpus elongatum, apterum. Caput exsertum, porrectum, thorace haud angustius, basi haud constrictum, ore attenuato, producto, oculis minutis. Labrum transversum, apice leviter sinuatum. Mandibulae productae, prominulae, angustae, acutae, apice leviter introrsum incurvae, medio obsolete dentatae. Maxillae malis elongatis, longitudine aequalibus, exteriore setacea, interiore lineari, apice introrsum curvata, cornea, margine interiore subtiliter denticulata. Palpi maxillares elongati, articulo primo minuto, secundo tertioque longis, longitudine subaequalibus, hoc vix clavato, quarto obsoleto. Mentum transversum, antrorsum angustatum, apice trun-

catum. Ligula sub mento occulta. Palpi labiales exarticulati, setacei, portrecti. Antennae graciliores, articulo primo cylindrico, secundo paulo longiore, clavato, tertio breviore, obconico, sequentibus brevibus, subglobosis, extremis sensim paulo crassioribus, fere transversis, ultimo iterum longiore, subgloboso-ovato. Thorax coleopteris angustior, basin versus leviter angustatus. Elytra truncata, ad angulum exteriorem vix sinuata. Abdomen elongatum, lineare. Pedes breviores, tibiis anticis angulo apicali exteriore profunde emarginato, sinu dentibus prominulis acutis terminato, tarsis omnibus 4-articulatis, anterioribus brevissimis, posticis brevibus, articulo primo paulo longiore, quarto (unguiculari) primo breviore crassioreque, unguiculis brevibus, fortiter curvatis, validis.

1. *D. mersa*: Nigra, subtiliter pubescens punctataque, palpis pedibusque ferrugineis. — Long. 1 lin.

Haliday Ent. Mag. IV. p. 252.

Habitat in arenis maritimis Hiberniae, aestu alterno opertus et reiectus.

Nigra, leviter pubescens, capite, thorace elytrisque subtiliter punctulatis. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apicem versus perparum incrassatae, obscure ferrugineae. Palpi saturate ferruginei. Mandibulae dilutius ferrugineae. Thorax capite elytrisque angustior, latitudine longior, lateribus ante medium rotundatus, basin versus angustatus, basi apiceque truncatus. Elytra thorace haud longiora. Pedes saturate ferruginei, tibiis pubescensibus medio femoribusque obscurioribus, tarsis dilutis.

Obs. Insectum mihi invisum, ab auctore citato l. c. accuratius descriptum et icone ligno inciso illustratum, corporis habitu et oris structura summanum cum Pronomaea rostrata nostra similitudinem praese fert. Tarsi 4-articulati, articulo ultimo brevi incrassato, unguiculis brevibus, fortibus, fortiter curvatis instructo et tibiae anticae apice emarginatae huic generi peculiares. Victor in Blediorum quorundam. Analogia cum Oxytelis tibiarum anticarum structura probatur. Nomen generis ex errore, quo auctor palpos labiales pro ligulae laciniis habuit, ortum, non sine dubio immutatum recepi,

Myllaena Er.

Er. Col. March. I. p. 382.

Centroglossa Matthews Ent. Mag. V. p. 194.

Maxillae malis aequalibus, elongatis, interiore cornea, apice uncinata, intus serrata.

Ligula brevis, integra.

Palpi labiales exarticulati, setacei.

Tarsi antici 4-, posteriores 5-articulati, antici articulo primo brevissimo, postici subelongato.

Corpus oblongum, antice obtusum, anum versus sensim attenuatum, acuminatum, convexum, alatum. Caput basi haud constricta a thorace receptum, deflexum, subglobosum, ore attenuato, modice elongato, fronte convessa, oculis lateralibus, mediocribus, parum prominulis. Labrum coriaceum, semi-orbiculare, mandibulas obtegens. Mandibulae muticæ. Maxillæ (t. III. f. 29.) mala utraque valde elongata, interiore cornea, linearicultriformi, apice acuto introrsum aduncio, margine interiore apicem versus

spinulis brevissimis subtiliter serrulato, exteriore membranea, linearis, interiori aequali, apice pilosulo. Palpi maxillares malas parum superantes, articulo secundo satis elongato, tertio hoc paulo breviore, tumidulo, quarto minuto, subulato. Labium (t. III. f. 20.) mento transverso, apice leviter emarginato, utrinque spina porrecta, linearis, valde elongata terminata, ligula brevissima, rotundata, integra, paraglossis nullis. Palpi maxillares valde elongati, prominuli, setacei, exarticulati. Antennae tenuiusculae, articulo secundo tertio sesqui longiore, ultimo oblongo-ovato, apice acuminato. Thorax basi coleopterorum latitudine, eaque amplectens, lateribus rotundatus, apicem versus fortiter angustatus, convexus. Scutellum thoracis margine obtectum. Coleoptera apice coniunctim emarginata, utrinque ad angulum exteriorem excisa. Abdomen apicem versus sensim attenuatum, acuminatum, stylis analibus exsertis. Pedes breviusculi, intermedii basi approximati, tibiis glabris, tarsis anticis 4-, posterioribus 5-articulatis, anticis articulo primo brevissimo, posticis elongato.

O b s e r v a t i o n e s .

1. Corpus totum subtilissime punctatum, pube densa subtilissima brevissima que sericeum. Thorace amplio et abdome apicem versus attenuato habitus omnino Tachypororum, Oxydoris sectionis prioris quoque non dissimiles minutae hae species, quibuscum insuper elytris apice ad angulum exteriorem excisis congruent, distinctae tamen ore attenuato, subrostrato. Palpi labiales setacei plerumque prominent.

2. Ingeniose Com. Mannerheim Myllaenam sequenti generi adscribit, attamen accuratius examinata oris et tarsorum structura, tibiisque haud spinulosis satis distincta.

3. Abdominis segmentum inferius sextum in altero sexu apice truncatum, in altero acute rotundatum.

4. Vinctus in silvis in musco et sub foliis deciduis.

* 1. *M. dubia*: *Nigra, opaca, cinereo-sericea, thoracis angulis posticis prominulis. — Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Er. Col. March. I. 383. 1.

Aleochar. dubia Grav. Mon. 173. 67. — Gyll. Ins. Suec. II. 426. 48. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 395. 85. — Zetterst. Ins. Lappon. 79. 32.

Gymnusa dubia Mannerh. Brachelytr. 66. 2.

Centroglossa conuroides Matthews Ent. Mag. V. p. 195. f. 1.

Habitat in Europa.

Antennae fuscae, articulo primo flavo. Palpi flavi, articulo tertio fuscus. Thorax antrorum angustatus, lateribus angulisque anterioribus rotundatis, angulis posterioribus retrorsum prominulis, basi profundius bisinuatus. Abdomen apice segmentorumque ventralium marginibus rufo-piceis. Pedes flavi, femoribus fuscis.

* 2. *M. intermedia*: *Nigra, opaca, cinereo-sericea, thoracis angulis posticis subrectis. — Long. $\frac{3}{4}$ lin.*

Er. Col. March. I. 383. 2.

Habitat in Germania.

Praecedenti affinis, at plus duplo minor. Antennae fuscae, articulo primo flavo. Os flavum. Thorax antrorum angustatus, lateribus minus

rotundatus, basi leviter bisinuatus, angulis posterioribus parum prominulis, subrectis. Abdomen apice testaceum. Pedes testacei, postici fuscescentes.

Variat immatura colore rufo-testaceo, abdominis basi pectoreque nigris.

* 3. *M. minuta*: *Nigra, opaca, cinereo-sericea, thoracis angulis posticis obtusis. — Long. $\frac{1}{2}$ lin.*

Er. Col. March. I. 384. 3.

Aleochar. minuta Grav. Mon. 174. 68. — Gyll. Ins. Suec. II. 427. 29.

Habitat in Germania, Suecia.

Praecedenti simillima, at paulo angustior et duplo minor. Antennae articulo primo concolore. Os fusco-testaceum, palpis maxillaribus fuscis. Thorax antrorum vix angustatus, lateribus parum rotundatus, basi levissime bisinuatus, angulis posterioribus obtusis. Pedes fusco-testacei.

Gymnusa Karsten.

Grav. Mon. p. 173. — Mannerh. Brachelytr. p. 66. — Er. Col. March. I p. 380.

Maxillae malis aequalibus, elongatis, interiore cornea, apice uncinata, intus inaequaliter serrata.

Ligula bifida, lacinis porrectis, elongatis, setaceis, palpis aequalibus; paraglossae nullae.

Palpi labiales setacei, exarticulati.

Tarsi omnes 5-articulati, postici articulo primo elongato.

Corpus oblongum, utrinque attenuatum, convexum, alatum. Caput basi hand constricta a thorace receptum, deflexum, subglobosum, ore attenuato, elongato, fronte convexa, oculis facialibus, mediocribus, parum prominulis, ovatis. Labrum maiusculum, suborbiculare, dependens, mandibularum apicem tegens. Mandibulae elongatae, lineares, apice acute bidentatae, dente altero apicali, altero ante apicem sito, margine interno infra dentes membranula interne acute denticulata fimbriato. Maxillae (t. III. f. 28.) mala utraque cornea, valde elongata, interiore cultriformi, apice acuto, aduncio, margine interiore ante apicem inaequaliter acute serrato, exteriore linearis, ad basin sinuato-excisa, apice setulis duabus barbulaque introrsum vergente terminata. Palpi maxillares itidem valde elongati, tenues, articulo secundo longissimo, tertio hoc paulo breviore, apicem versus parum incrassato, quarto minimo, subulato: Labium (t. III. f. 19.) mento sat magno, apice profunde emarginato, ligula elongata, bifida, lacinis coriaceis, linearibus vel subsetaceis, palpis subaequalibus, paraglossis nullis. Palpi labiales elongati, setacei, apice obsolete articulati, ita ut, si articulatos respicias, articulus primus sit longissimus, secundus minimus, tertius hoc paululum longior. Antennae tenues, articulis 2—10 subobconico-teretibus, 11mo ovato. Thorax basi coleopterorum latitudine, eaque amplectens, basi utrinque subsinuatus, antrorum angustatus, lateribus rotundatus, supra convexus. Scutellum thoracis margine obtectum. Coleoptera apice coniunctim emarginata, utrinque ad angulum exteriorem excisa. Abdomen apicem versus sensim attenuatum, stylis analibus distinctis. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes brevius-

sculi, intermedii basi approximati, tibiis spinulosis, tarsis omnibus 5-articulatis, postici articulo primo valde elongato.

O b s e r v a t i o n e s .

1. Genus insigni modo distinctum, neque cum aliquo confundendum. Mandibulae acute dentatae, oculi in capitis facie anteriore siti, tibiae spinulosae et styli anales exserti characteres sunt singulares in hac tribu, in cuius finem collocavi hoc genus, pariter ad Tachyporinos atque ad Staphylinos vergens.

2. Abdomen segmento sexto inferiore maris apice leviter emarginato, septimo fortiter inciso, feminae segmento sexto apice utrinque leviter sinuato, medio acute rotundato, septimum occultante. Qua sexus differentia a reliquis Aleocharinis hoc genus quodammodo discedit, magis autem Staphylininis quam Tachyporinis appropinquatur.

3. Victor sub musco et ad arborum radices.

* 1. *G. brevicollis*: Nigra, antennarum articulo primo tarsisque testaceis.
— Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Mannerh. Brachelytr. 66. 1. — *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 534. 1. —
Er. Col. March. I. 381. 1.

Staphyl. brevicollis *Payk. Faun. Suec.* III 398. 40.

Aleoach. brevicollis *Gyll. Ins. Suec.* II. 425. 47. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 394. 84.
— *Zetterst. Faun. Lappon.* I. 103. 22. *Ins. Lappon.* 79. 31.

Aleoach. carnifora *Grav. Mon.* 171. 60.

Aleoach. excusa *Grav. Mon.* 172. 66.

Habitat in Germania, Suecia.

Nigerrima, subnitida, subtilissime tenuissimeque cinereo-pubescentia. Antennae articulo primo rufo. Caput laeve. Thorax basi coleopterorum latitudine, latitudine paulo brevior, basi subsinuatus, angulis posticis obtusiusculis, convexus, subtiliter punctatus. Elytra thoracis longitudine, confertim subtiliter punctata, opaca. Abdomen minus subtiliter punctatum. Pedes nigri, tarsis rufo-testaceis.

2. *G. laticollis*: Atra, tenuiter sericeo-pubescentia, palpis tarsisque luteofuscis. — Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in Germania, Gallia.

Habitu omnino praecedentis, at plus duplo minor, tota confertissime subtilissimeque punctulata, atra, pube tenuissima cinereo-sericea dense vestita. Antennae filiformes, basi obscure fuscescentes. Labrum transversim orbiculatum palpique flavescenti-fusca. Thorax coleopteris sublatior, brevis, longitudine duplo latior, basi bisinuatus, angulis posterioribus subrectis, retrorsum prominulis, supra leviter convexus. Elytra thorace longiora. Pedes nigri, geniculis tarsisque fusco-luteis.

Obs. Statura triplo fere minore, pube densa, sericante, labro transverso, thorace breviore et latiore a praecedente facile distinguitur.

Tribus secunda.

T a c h y p o r i n i .

Stigmata prothoracica conspicua.

Antennae sub frontis margine laterali insertae.

Labrum integrum, corneum, fimbria et laciniis membraneis nullis.

Mandibulae haud prominentes, muticae, trigonae aut subfalcatae, limbo membranoso, interne ciliato, margini interiori affixo intus fimbriatae, apice libero acuto in plerisque;

valde elongatae, tenues, falcatae, acutae in *Tanygnatho*.

Maxillae cardine stipiteque corneis, malis coriaceis membranaceis, exteriore apice, interiore margine interiore barbatis in plerisque;
malis, elongatis, linearibus, interiore apice unicata in *Trichophyo*.

Palpi maxillares 4-articulati, articulo primo minuto, secundo tertio elongatis, quarto

minuto, subulato in *Hypocrypto*, *Conuro*, *Tachyporo*, *Mycetoporo*;
elongato, apice valde acuminato in *Habrocero*.

praecedenti aequali, apice leviter acuminato in *Tachino*, *Trichophyo*, *Boletobio*, *Tanygnatho*.

Mentum corneum, transversum, antrorum angustatum, apice truncatum aut leviter emarginatum.

Labium membranaceum magis minusve exserendum.

Ligula membranea,
lata biloba, paraglossis ei connatis, linea ciliata indicatis in *Conuro*, *Tachyporo*, *Habrocero*, *Tachino*;

angustiore, paraglossis nullis in *Boletobio* et *Mycetoporo*;
rotundata, medio producta, paraglossis nullis in *Hypocrypto*;
binda, paraglossis eadem brevioribus in *Trichophyo*.

Palpi labiales triarticulati plerisque;
filiformes *Conuro*, *Tachyporo*, *Habrocero*, *Tachino*, *Boletobio*;
articulo ultimo subulato aut fere subulato *Hypocrypto*, *Mycetoporo*,
Tanygnatho;
biarticulati (?) *Trichophyo*.

Antennae infra oculos sub capitis margine laterali insertae,
11-articulatae, filiformes plerisque;
tenues, articulis singulis verticillato-pilosis, primis duobus crassiusculis
in *Habrocero* et *Trichophyo*;
10-articulatae, clavatae in *Hypocrypto*.

Oculi parvi rotundati aut ovales, haud prominentes.

Caput thoraci insersum, basi haud constrictum, deflexum vel inflexum.

Thorax amplius, convexus, postice coleopterorum basin, antice caput amplectens.

Prosternum triangulare, spatio pone coxas anteriores membraneo.

Pectus metathoracis epimeris magnis, retrorsum prominentibus.

Scutellum triangulare.

Elytra pectore distincte longiora in *Hypocrypto*, *Conuro*, *Tachyporo*, *Habrocero*, *Tachino*;

aut pectus longitudine vix superantia in *Trichophyo*, *Boletobio*, *Myctoporo*, *Tanygnatho*.

Abdomen apicem versus attenuatum, segmentis sex primis distinctis, septimo saepius occulto, stylis analibus plerumque haud distinctis;

marginatum in plerisque;

immarginatum in *Conuro*.

Pedes coxis anticis exsertis, conicis, posticis parallelopedis, trochanteribus posticis fulcrantibus, tibiis aut omnibus aut posterioribus plerumque, nonnunquam etiam femorum apice spinulosis, tarsis

5-articulatis in plerisque,

4-articulatis in *Hypocrypto* et *Tanygnatho*,

anticis saepe dilatatis;

unguiculis tenuibus, falcatis, simplicibus.

Sexus differentia saepius abdominis segmentorum posteriorum figura et tarsis anticis maris fortius dilatatis cognoscitur, in generibus et speciebus variis vario modo se habens, et in isdem describendis accuratius illustranda.

Observationes.

1. Corpus minutum, agile, habitu quodam peculiari, convexum, ante et postice attenuatum, licet antice obtusiusculum, ab domine in vivis modice elongato.

2. Huius tribus minus numerosae plerasque sibi cognitas species *Fabricius* immerito *Oxyporo* subiunxit, *Gravenhorst* genera *Tachyporum* et *Tachinum* ex iis constituit, illud primo (*Micr.* p. 124.) species palporum maxillarum articulo quarto subulato, dein (*Mon. p. 1.*) methodo magis naturali, species elytris longioribus continens, hoc primo (*Micr. p. 134*) species palpis maxillaribus filiformibus, dein (*Mon. p. 22.*) species elytris pectore haud longioribus amplectens. Genera hodierna pleraque iam ab auctore celebri familiarum nomine in utroque genere suo distincta sunt.

Hypocryptus Schüpp.

Er. Col. March. I. p. 387.

Hypocryptus *Mannerh.* *Brachelytr.* p. 58. — *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. p. 519.

Cypha *Stephens Illustr.* V. p. 187.

Antennae 10-articulatae, articulis ultimis tribus crassioribus.
Palpi maxillares articulo quarto subulato.

Ligula rotundata, integra.

Elytra pectore longiora.

Tarsi 4-articulati.

Corpus parvum, globatum, alatum. Caput latum, inflexum, oculis rotundatis, parum prominul. Labrum transversum, integrum. Mandibulae minuta, muticae. Maxillae (t. IV. f. I. b.) malis membraneis, interior apice oblique truncata, ibique barbata, exteriore extus profunde sinuata, apice introrsum barbata, interior paulum superante. Palpi maxillares articulo primo minimo, secundo elongato, subclavato, tertio ovato, tumidulo, quarto minimo, subulato. Labium (t. IV. f. I. a.) mento transverso, apice truncato, ligula membranea, semiorbiculari, medio processu minuto umbonata, paraglossis nullis. Palpi labiales articulis duobus primis crassiusculis, secundo breviore, tertio sat elongato, tenui, subuliformi. Antennae 10-articulatae, articulis primis duobus crassiusculis, ultimis tribus leviter incrassatis, clavam oblongam formantibus. Thorax transversus, basi coleopteris latitudine subaequalis, antrorsum angustatus, rotundatus, basi utrinque sinuatus, leviter convexus. Scutellum obtectum. Elytra convexiuscula, apice singula rotundata. Abdomen minus elongatum, apicem versus attenuatum. Pedes breves, debiles, intermedii basi satis distantes, interstitio aequali, coxae posticæ haud ampliae, parallelipedae, tibiae omnes laeves vel subtilissime setulosae; tarsi omnes 4-articulati, articulo primo leviter elongato, tarsorum anteriorum incrassato, sequentibus duobus minimis, ultimo primo paulo breviore.

Observationes.

1. Corpus laeve, parce pubescens, capite thoraceque fortiter inflectendis globatile, globatum *Agathidiorum* more seminulum mentiens.

2. Affinitates huius generis cum *Aleocharinis* admodum obviae videntur, ligaeque forma affirmantur. Antennarum insertio autem huius Tribus. Cum genere *Oligota* arctissime coniungitur, non solum corporis figura, sed etiam articulorum antennarum tarsorumque numero communio.

3. Victor in sylvis, vel sub lignorum cortice recentiore, nondum exsiccatu latitantes vel in gramine herbisque vagantes reperias. Reliqua vivendi ratio latet. Praeter indigenas paucas nulla mihi innotuit species.

4. Genus hocce sub *Scaphidio* apud *Paykul* et *Gyllenhal*, sub *Tachyporo* apud *Gravenhorst* militans, primus cognovit et propositus Dom. *Schüppel*. *Vulgo* scribunt *Hypocryptus* contra regulas etymologicas, scribendum esset aut *Hypocryptus* aut *Hypocryptus*. Hoc ultimum nomen ab inventore eruditio pro suo agnoscitur.

* 1. *H. longicornis*: *Niger*, *nitidus*, parce pubescens, antennis apicem versus sensim incrassatis pedibusque testaceis, thoracis angulis posterioribus subrectis. — Long. $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ lin.

Mannerh. Brachelytr. 58. 1. — *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 521. 3. — *Er. Col. March. I.* 388. 1.

Scaphidium longicorne *Payk. Faun. Suec.* III. 340. 3. — *Gyll. Ins. Suec.* I. 191. 6 IV. p. 294. — *Salib. Ins. Fenn.* I. 63. 4.

Scaphidium acuminatum *Marsh. Ent. Britt.* 234. 3.

Tachyporus granulum *Grav. Mon.* 3. 1.

Hypocryptus granulum *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 520. 1.

Hypocryptus globulus *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 521. 2.

Habitat in Europa, sub arborum cortice.

Niger, nitidus, pube subtili depressa cinerea parce adspersus. Antennae testaceae, articulis duobus primis sat magnis, primo subgloboso, secundo cylindrico, 3—5 tenuibus, inter se aequalibus, crassitie vix longioribus, 6 et 7 paulo crassioribus et sensim paulo longioribus, subobconicis, sequentibus tribus clavam valde elongatam, parum incrassatam, fusiformem formantibus, penultimis duobus aequalibus, obconicis, ultimo his coniunctis longitudine aequali, at non crassiore, apicem versus sensim attenuato. Palpi testacei. Caput fronde planiuscula, laevi. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, antrorum angustatus, latitudine baseos plus duplo brevior, lateribus cum angulis anterioribus fortiter rotundatus, apice truncatus, basi leviter bisinuatus, angulis posterioribus subrectis, fortiter convexus, margine laterali dilatato, pallido, pellucido. Elytra thorace sesqui longiora, apice rotundata, convexa, parcus subtilissime punctata, nigro-picea. Abdomen parce subtilissime punctatum, apice plerumque piceum. Pedes testacei.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice profunde triangulariter exciso, femina eodem integro rotundato. Tarsi antici in utroque sexu simplices.

Obs. H. granulum Boisd. et Lacord. thorace elytrisque piceis, H. globulus eorundem auctorum nonnisi statura paulo minore a genuinis discedunt.

* 2. *H. discoideus*: *Niger, pubescens, antennis articulis ultimis tribus abrupte maioribus pedibusque testaceis, elytris disco rufis, thorace angulis posterioribus rotundatis.* — Long. $\frac{1}{2}$ lin.

Er. Col. March. I. 388. 2.

Habitat Berolini, Dom. Schüppel et ipse.

Praecedente dimidio vel duplo minor, nigro-piceus, pube longiore, depresso, fulvescenti-grisea densius vestitus. Antennae flavo-testaceae, pilosae, articulis 3—7 tenuioribus, 8 et 9 his duplo crassioribus, subobconicis, ultimo his coniunctis longitudine aequali, elongato, apice acuminato, his ultimis tribus clavam valde elongatam at parum incrassatam formantibus. Caput parcus subtiliter punctatum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, antrorum angustatus, latitudine baseos plus duplo brevior, basi subbisinuatus, angulis posterioribus rotundatis, transversim convexus, parcus subtilissime punctatus, piceus, margine basali tenui et lateralii subdilatato testaceo-pallidis. Elytra thorace sesqui longiora, apice oblique truncata, leviter convexa, crebre subtiliter punctata, testaceo-rufa, basi et lateribus fusca. Abdomen parce subtiliter punctatum, piceum, supra segmentis anterioribus quatuor margine posteriore rufescente, ultimis duabus totis rufo-testaceis, subtus rufo-testaceum, basi piceum. Pedes testacei.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice emarginato, tarsis anticus articulo primo dilatato.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, tarsis anticus simplicibus.

* 3. *H. laeviusculus*: *Niger, antennis articulis ultimis tribus abrupte maioribus pedibusque nigricantibus, thorace angulis posterioribus subrectis.* — Long. $\frac{1}{2}$ lin.

Mannerh. Brachelytr. 58. 2. — Er. Col. March. I. 389. 3.

Scaphid. longicorne var. b Gyll. Ins. Suec. II. 191. 6. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 63. 4.

Habitat in Europae pratis.

H. longicorni duplo minor, niger, nitidus, parce subtiliterque cinereo-pubescent. Antennae articulis duobus primis crassiusculis, 3—7 minutis, subaequalibus, 8 et 9 maioribus, inter se aequalibus, ultimo his coniunctis longitudine aequali et paulo crassiore, apice acuminato, cum iis clavam elongatam minus incrassatam formante, albido-pilosellae, nigro-vel fuscopiceae, basi nonnunquam dilutiores. Palpi nigro-picei. Caput parce subtilissime punctatum. Thorax basi coleopterorum latitudine, antrorum angustatus, latitudine baseos plus triplo fere brevior, basi subbisinuatus, angulis posterioribus subrectis, acumine summo rotundatis, transversim convexus, parce subtilissime punctatus, margine laterali anguste obsoleteque obscure testaceo-pellucente. Coleoptera thorace sesqui longiora, apice oblique truncata, convexa, crebrius subtiliter punctata. Abdomen crebrius punctulatum, longius pubescens, segmentis singulis piceo-marginatis. Pedes vel nigro-vel fuscopicei, tarsis subtestaceis.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice emarginato, tarsis anticus articulo primo dilatato.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, tarsis anticus simplicibus.

Variat immaturus colore corporis ferrugineo.

* 4. *G. seminulum*: *Niger, nitidus, antennis ultimis tribus abrupte maioribus pedibusque testaceis, thorace angulis posterioribus subrectis.* — Long. $\frac{1}{3}$ lin.

Er. Col. March. I. 389. 4.

Habitat in Germania: Berolini a me lectus.

Praecedente plerumque paulo minor, niger, nitidus, tenuiter subtiliterque cinereo-pubescent. Antennae articulis duobus primis crassiusculis, 3—5 minutis, subaequalibus, 6 et 7 vix crassioribus, 8 et 9 distincte maioribus, ultimo his coniunctis longitudine subaequali et paulo crassiore, apice acuminato, longius pilosellae, totae rufo-testaceae. Palpi rufi. Caput parce subtilissime punctatum. Thorax basi coleopterorum latitudine, antrorum angustatus, latitudine baseos triplo fere brevior, basi leviter bisinuatus, angulis posterioribus subrectis, convexus, laevis, margine laterali tenui pallido-pellucido. Elytra thorace tertia parte longiora, apice oblique truncata, crebrius subtiliter punctata. Abdomen parcus punctulatum, subtus apice piceo-rufescens. Pedes rufo-testacei, femoribus posticis nigro-piceis.

Mas latet.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, tarsis anticus simplicibus.

* 5. *H. pulicarius*: *Niger, nitidus, thorace elytrisque piceis, antennis articulis ultimis tribus abrupte maioribus pedibusque testaceis, thorace angulis posterioribus subrotundatis.* — Long. $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in Germania: Berolini a Dom. Schüppel lectus.

Praecedenti affinis, at paulo maior, niger, nitidus, pube longiore depresso grisea parce vestitus. Antennae longiores, articulis duobus primis maiusculis, 3 — 5 minutis, aequalibus, 6 et 7 his paulo longioribus, at vix crassioribus, 8 et 9 distincte maiorbis, subobconicis, inter se aequalibus, ultimo elongato, his coniunctis paulo longiore et paulo crassiore, fusiformi, apice fortiter acuminato, parce pilosellae, totae laete rufo-testaceae. Caput laeve, ore cum palpis rufo-testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, apicem versus angustatus, latitudine baseos plus duplo brevior, basi vix sinuatus, angulis posterioribus subrotundatis, convexus, laevis, piceus, margine anteriore et posteriore dilutiore, rufescente, laterali latioire, testaceo-pellucido. Elytra thorace tertia parte longiora, oblique truncata, convexa, parce subtilissime punctata, picea. Abdomen parce subtilius punctatum, apice rufo-piceum. Pedes dilute testacei.

Mas latet.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, tarsis anticis simplicibus.

Obs. Praecedenti proxime affinis, differe autem videtur statura maiore, antennis longioribus et pedibus dilutioribus, thoracis angulis posterioribus potius rotundatis, elytris parce punctatis.

Conurus Steph.

Steph. Illustr. V. p. 188.

Tachyporus * Er. Col. March. I. p. 390.

Antennae 11-articulatae, filiformes.

Palpi maxillares articulo quarto subulato.

Ligula biloba, lobis emarginatis.

Elytra pectore longiora.

Abdomen immarginatum.

Tarsi 5-articulati.

Corpus oblongum, antice obtuse rotundatum, postice sensim attenuatum, convexum, alatum. Caput thoraci insertum, deflexum, convexum, ore obtusiusculo, oculis mediocribus rotundatis, parum prominentibus. Labrum per breve, integrum. Mandibulae breves, trigonae, intus membrana angusta fimbriatae. Maxillae malis membranaceis, apice barbatis, exteriore inferiore vix superante. Palpi maxillares articulo primo minuto, secundo tertioque longitudine subaequalibus, hoc leviter incrassato, quarto parvo subulato. Labium (t. IV. f. 2.) mento transverso, ligula membranacea, incisione profundiore biloba, lobis latis, fortiter emarginatis, apice introrsum spinulis nonnullis validioribus munitis, paraglossis ligulae aequalibus eique omnino connatis, nonnisi ciliarum serie indicatis. Palpi labiales articulo primo crassiusculo, secundo hoc duplo breviore, tertio primo longitudine aequali, tenuiore, acuminato. Antennae filiformes, apicem versus saepius subincrasatae. Thorax convexus, basi elytris arce applicatus, antrorsum magis minusve angustatus, apice truncatus, angulis anterioribus tamen leviter prominentibus, acutiusculis. Elytra pectore paulo longiora, lateribus marginata, angulo apicali exteriore recto. Abdomen immarginatum, apicem versus sensim fortiter attenuatum, vivis sat elongatum. Mesosternum carinatum. Pedes elongati, coxis posterioribus parallelopipedis, ad femorum basin

scutiformi-elevatis, antice femoribus tibiisque muticis, posteriores femoribus apice tibiisque totis magis minusve spinulosis, spinis tibiarum terminalibus omnibus subtilibus, tarsis omnibus articulis 4 primis decrescentibus, posterioribus valde elongatis, undique glabris, articulo ultimo leviter elongato.

Observationes.

1. Corpus totum pube subtili depresso sericante vestitum, abdomine lateribus et apice magis minusve pilosellum.

2. Genus summa affinitate cum Tachyporo coniunctum, at notis pluribus, praeter habitum peculiarem distinctum videtur. Differt imprimis ligulae lacinii emarginatis, mesosterno carinato, abdomine immarginato, femoribus posterioribus apice spinulosis, tibiae autem minus spinulosis, tarsis subtus haud pubescentibus, articulo quarto non adeo minuto et corpte toto pube sericante obducto.

3. Differentia sexualis fere ut in Tachyporo:

Mas abdominis segmento sexto superiore integro, vel apice subacuminato, inferiore apice exciso, septimo conspicuo.

Femina abdominis segmento sexto superiore apice quadrifido, inferiore apice subacuminato, setis rigidis dense ciliato.

4. Victor sub arborum cortice, in truncis putridis et sub foliis deciduis.

* 1. *C. littoreus*: Fuscus, sericeo-pubescent, antennis basi apiceque, thoracis angulis posterioribus, elytrorum macula basali pedibusque rufo-testaceis. — Long. 2 lin.

Staphyl. littoreus Linn. Faun. Suec. n. 852. Syst. Nat. I. II. 685. 18. — Goeze Ent. Beitr. I. 720. 18. — De Vill. Ent. I. 416. 18.

Tachyporus littoreus Er. Col. March. I. 390. 1.

Oxyporus cellaris Fab. Ent. Syst. I. II. 532. 5. Syst. El. II. 605. 5.

Staphyl. cellaris Payk. Faun. Suec. III. 421. 67.

Tachypor. cellaris Grav. Micr. 131. 10. Mon. 5. 7. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 8. 10. — Gyll. Ins. Suec. II. 244. 9. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 292. 9. — Zetterst. Ins. Lapp. 55. 8. — Mannerh. Brachelytr. 60. 11. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 518. 9.

Staph. pubescens Payk. Mon. Carab. App. 138. 53—54.

Staph. tomentosus Rossi Faun. Etr. Mant. 95. 219. (ed. Hellw. 443. 218.)

Oxyporus 2-maculatus Fab. Ent. Syst. I. II. 533. 8. Syst. El. II. 606. 8.

Staph. maculatus Fourc. Ent. Par. I. 169. 20.

le Staph. noir à taches jaunes Geoffr. Hist. Ins. I. 369. 20.

Habitat in Europa.

Leviter convexus, fuscus, opacus, dense subtiliterque sericeo-pubescent. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apicem versus vix incrassatae, articulis 5 — 10 subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo ovato, abrupte acuminato, testaceae, medio fuscae. Caput fronte leviter convexa, parce subtilissime punctatum, nigrum, ore flavo-testaceo. Thorax coleopteris perparum latior, latitudine paululum brevior, antrorsum angustatus, apice plus dimidio quam basi angustiore, lateribus praecipue pone medium rotundatis, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus postice prominulis, acutis, modice convexus, dense subtilissime punctatus, angulis posterioribus macula magna rufo-testacea notatis. Elytra thorace sesqui prope longiora, apice oblique truncata, parum convexa, confertissime subtilissimeque punctata, macula magna statim pone basin, aequali spatio a sutura et a margine exteriore distante, rhomboidea rufo-testacea. Abdo-

men parcus subtilissime punctulatum, longius pubescens, minus pilosellum, segmentis singulis margine apicali rufescentibus. Mesosternum modice carinatum. Pedes testacei, coxis anterioribus concoloribus, tibiis parce spinulosis, tarsis posticis valde elongatis.

Mas abdominis segmento sexto subtus apice sat fortiter triangulariter exciso, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice medio triangulariter producto, setis rigidis dense ciliato, superiore quadrifido, laciis intermediis profunde divisis, tarsis anticis simplicibus.

Variat elytrorum macula effusa, discum totum occupante, margine tenui, angulo scutellari latius, apice exteriore late fuscis. Thoracis latera ante maculam testaceam saepe fusco-rufa.

Obs. 1. Oxyporum bimaculatum Fabr. nonnisi secundum eius descriptionem huic speciei allegavi, specimen enim descriptum in collectione citata deseratur.

2. Exemplum nomine Tachypori trinotati a Dahlio missum, in Carinthia lectum, communicavit Dom. Schüppel.

* 2. *C. grossus*: *Fusco-niger, sericeo-pubescent, elytris thorace paulo longioribus, pedibus rubris, antennis longis, articulis duobus primis rubris.* — Long. 3 lin.

Habitat in Madagascar, Dom. Goudot.

Reliquis multo maior, sat convexus, fusco-niger, subnitidus, pube fusco-nigra vestitus. Antennae elongatae, coleopterorum apicem fere attingentes, apicem versus haud incrassatae, articulis a tertio inde omnibus elongatis, ultimo apice sensim acuminato, nigro-fuscae, articulis duobus primis rubris. Palpi rubri. Caput parcus subtiliter punctatum, fronte leviter convexa, nigrum, infra oculos rufo-piceum. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine basos paulo brevior, antrorum fortiter angustatus, apice basi triplo fere breviore, lateribus aequaliter rotundatus, margine basali recto, angulis posterioribus fortiter prominentibus, subrotundatis, fortiter convexus, sat dense subtiliter punctatus. Elytra thorace paululum longiora, apice oblique truncata, transversim convexa, confertissime subtiliter punctata. Abdomen minus confertim subtiliter punctatum, parcus pubescens, fortiter nigro-pilosellum, summo apice nonnunquam rufescente. Pectus fortiter carinatum. Pedes rubri, coxis anticis concoloribus, femoribus posterioribus apice fortius, tibiis interne parcus breviterque spinulosis, tarsis posticis sat elongatis.

Mas abdominis segmento quinto subtus apice leviter emarginato, sexto inferiore profunde inciso, superiore sat acute acuminato, tarsis anticis articulis tribus primis fortiter dilatatis, antennis longioribus, articulis ultimis magis elongatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, setis fulvis dense ciliato, superiore quadrifido, laciis intermediis sat profunde divisis, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis, antennis articulis ultimis minus fortiter elongatis.

Variat corpore subtus toto rufo-brunneo vel castaneo.

* 3. *C. australis*: *Niger, fusco-pubescent, antennis basi apiceque testaceis, pedibus rubris, elytris thorace terlia parte longioribus, apice oblique truncatis.* — Long. 2 lin.

Habitat in Terra Van-Diemensis, Dom. Schayer.

Habitu omnino C. pubescens, at paulo maior, praecipue latior, C. littoreo aequalis, hoc autem multo convexior, niger, subnitidus, pube brevi, depressa, fusca, subsericante vestitus. Antennae capitum thoracisque prope longitudine, articulis 3 et 4 elongatis, teretibus, 5—10 subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo ovato, apice acuminato, articulis duobus primis pallide testaceis, tertio testaceo, apice fusco, 5—10 fuscis, ultimo testaceo. Caput convexiusculum, laevigatum, parcus pubescens, nigrum, nitidum, ore rufo-testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine paulo brevior, antrorum angustatus, apice duplo quam basi angustior, lateribus rotundatus, margine basali recto, angulis posterioribus leviter retrorsum prominentibus, subrectis, convexus, confertim subtilissime punctatus, margine basali piceo. Elytra thorace terlia parte longiora, apice oblique truncata, convexa, confertissime subtiliter punctata. Abdomen confertim subtiliter punctulatum, segmentis singulis piceo-marginatis, lateribus et apice fortius pilosellum. Mesosternum acute carinatum. Pedes rubri seu ferruginei vel testacei, coxis anticis concoloribus, tarsis posticis sat elongatis.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice triangulariter exciso, superiore apice rotundato, tarsis anticis articulis tribus primis modice dilatatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice obtuse acuminato, setis rigidis ferrugineis dense ciliato, superiore quadrifido, laciis intermediis ad segmenti medium usque divisis.

Obs. C. pubescens proximus, differt autem statura paulo robustiore, antennis brevioribus et debilioribus magis fuscis, thoracis angulis posterioribus magis prominentibus, elytris apice oblique truncatis, abdome fortius pilosello.

* 4. *C. pubescens*: *Fusco-niger, griseo-pubescent, elytris thorace longioribus, antennis pedibusque rufo-testaceis.* — Long. 2 lin.

Tachyporus pubescens Grav. Micr. 130. 9. Mon. 5. 8. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 8. 9. — Gyll. Ins. Suec. II. 243. 8. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 292. 8. — Mannerh. Brachelytr. 60. 10. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 518. 10. — Er. Col. March. I. 390. 2.

Staph. pubescens var. β Payk. Mon. Carab. App. 138. 53—54.

Staph. cellaris var. β Payk. Faun. Suec. III. 421. 67.

Staph. tomentosus var. β Rossi Faun. Etr. Mant. 97. 218. (Ed. Helv. I. 443. 218.)

Var. a: *Fuscus, elytris brunneis.*

Tachyporus sericeus Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 519. 11.

Var. b: *Totus pallide testaceus, immaturus.*

Oxyporus testaceus Fab. Ent. Syst. I. II. 535. 18. Syst. El. II. 607. 18. — Panz. Ent. Germ. 361. 14.

Habitat in Europae silvis, in truncis putridis. In China meridionali etiam lectus a Prof. Meyen.

Pube brevi depressa griseo-sericea dense vestitus. Antennae capitum

thoracisque longitudine, apicem versus sensim subincrassatae, articulis **3—5** elongatis, teretibus, **6—10** subobconicis, sensim paulo crassioribus breviori busque, ultimo apice abrupte acuminato, testaceae, medio fuscae. Os cum palpis testaceum. Caput modice convexum, laevigatum, parcus subtiliter pubescens, nigrum, nitidum. Thorax coleopteris latior, latitudine parum brevior, antrorum fortiter angustatus, apice duplo prope angustior quam basi, lateribus aequaliter rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus postice vix prominulis, subrectis, fortiter convexus, omnium subtilissime confertim punctatus, piceo-niger, pube derasa nitidus, margine summo basali rufescente. Elytra thorace tertia fere parte longiora, convexa, confertissime subtiliter punctata, apice truncata. Abdomen fuscum, apice pilosello segmentorumque singulorum margine apicali late castaneis. Pectus nigrum, nitidum, mesosterno acute carinato. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus, posteriores femoribus apice tibiisque parce spinulosis, tarsis posticis sat elongatis.

Mas abdominis segmento quinto subtus apice leviter emarginato, sexto inferiore leviter triangulariter exciso, superiore apice rotundato, tarsis anticis articulis tribus primis dilatatis, antennis paulo longioribus.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice leviter triangulariter producto, setis rigidis ferrugineis dense ciliato, superiore quadrifido, lacinia intermedia ad medium segmenti usque divisis, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

Variat colore corporis aut nigro, elytris aut concoloribus aut castaneis, aut fusco, elytris dilutius rufo-brunneis, aut toto ferrugineo, aut minus maturus testaceo.

Obs. Specimina nigra elytris concoloribus nomine *Tachypori alpestris* ex alibus Carinthiae, et *T. tristis* e Styria, specimen immaturum, corpore testaceo nomine *T. rufescens* ex Austria a Dahllo sibi missa, dedit Dom. Schüppel. *Oxyporus testaceus* Fab. secundum ipsum specimen ab auctore descriptum hoc loco allegatus.

* 5. *C. crassus*: *Fusco-niger, tenuiter griseo-pubescentis, antennis testaceis, thoracis margine, elytrorum basi, ano pedibusque rufescens, elytris thorace parum longioribus.* — Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Tachyporus crassus Grav. Micr. 190. 1. Mon. 6. 9.

Habitat in America septentrionali.

Praecedente triplo maior, multo latior, fortiter convexus, fusco-niger, nitidus. Antennae capitis thoracisque prope longitudine, apicem versus parum incrassatae, testaceae, articulis 3 et 4 elongatis, teretibus, **5—10** subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, basi fuscescentibus, ultimo oblongo-ovato, toto flavo. Caput parum convexum, omnium subtilissime punctatum, parcus pubescens, nigrum, ore cum palpis rufo-testaceo. Thorax coleopterorum basi parum latior, latitudine paulo brevior, antrorum angustatus, apice plus duplo quam basi angustior, lateribus aequaliter rotundatis, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum parum prominulis, rotundatis, valde convexus, omnium subtilissime punctulatus, pube depressa griseo-fusca tenuiter vestitus, margine lateralii basali sanguineo. Elytra thorace paululum longiora, apice oblique truncata,

convexa, confertim minus subtiliter punctata, nigro-fusca, tenuiter pubescens, margine basali sanguineo, densius pubescente. Abdomen breviusculum, subtilissime punctulatum, pube depressa griseo-fusca sericante densius vestitum, lateribus et apice fortius pilosellum, segmentorum singulorum margine apicali rufo-piceo, ano rufo-testaceo. Mesosternum fortiter carinatum. Pedes rufo-testacei, coxis anticis concoloribus, postici femoribus apice fortiter, tibiis interne parce breviterque spinulosis, tarsis posticis modice elongatis.

Mas mihi invisus.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice acuminato, setis rigidis fulvis dense ciliato, superiore quadrifido, laciinis intermediis ultra segmenti medium divisis, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

6. *C. tumidus*: *Fuscus, griseo-pubescentis, thoracis margine summo elytrorumque basi rufescens, pedibus rufo-testaceis, antennis nigris, articulis 1 primis ultimoque testaceis.* — Long. 2 lin.

Habitat prope Puerto Cabello Columbiae, Dom. Moritz.

Statura omnino praecedentis, at paulo minor, *T. littoreo* paulo latior et multo convexior, fuscus, nitidus, subtiliter punctulatus, pube minus subtili depressa fulvo-grisea densius vestitus. Antennae capitis thoracisque prope longitudine, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulis 4 primis testaceis, tertio quartoque elongatis, teretibus, **5—10** obconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, nigris, ultimo ovato, apice acuminato, flavo, basi fuscescente. Palpi dilute testacei. Caput leviter convexus, parce subtilissime punctulatum, ore et subtus totum rufo-testaceum. Thorax coleopteris paulo latior, antrorum angustatus, apice quam basi plus duplo angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus aequaliter rotundatus, basi truncatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominulis, obtusis, subrotundatis, fortiter convexus, parce subtilissime punctatus, margine lateralii et basali rufescente. Elytra thorace paulo longiora, convexa, apice vix oblique truncata, parcus subtilissime punctata, tascia basali, parum distincta, externe abbreviata rufescente. Abdomen crebrius subtiliter punctatum, densius pubescens, segmentis singulis piceo-marginatis, apice testaceum et pilosellum. Mesosternum subtiliter at sat acute carinatum. Pedes rufo-testacei, posteriores femoribus apice tibiisque fortius spinulosis, tarsis posticis fortiter elongatis.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice fortiter triangulariter exciso, tarsis anticis articulis tribus primis valde dilatatis.

Femina latet.

* 7. *C. bipustulatus*: *Niger, subtiliter griseo-pubescentis, antennis basi apiceque pedibusque testaceis, elytris thorace paulo longioribus, macula basali rhombea rufa.* — Long. 2 lin.

Tachyporus bipustulatus Grav. Micr. 132. 11. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 9. 11. — Gyll. Ins. Suec. II. 245. 10.

Tachyporus bimaculatus Grav. Mon. 5. 6.

Habitat in Hungaria, Dahl, in Styria et in Suecia, Dom. Schüppel.

Statura omnino *C. pubescens*, at paulo maior, convexus, niger, ni-

tidulus, pube deppressa subtili fulvescenti-grisea tenuiter vestitus. Antennae capite thoraceque parum breviores, apicem versus leviter sensim incrassatae, testaceae, articulis 3 et 4 elongatis, teretibus, 5—10 subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, fuscis, ultimo oblongo-ovato, flavo. Caput modice convexum, parce omnium subtilissime punctatum, ore rufotestaceo. Thorax coleopteris paulo latior, antrorum angustatus, apice duplo quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus sat rotundatus, margine basali medio late recto, angulis posterioribus retrorsum modice prominulis, subrectis, convexus, minus confertim subtilissime punctatus. Elytra thorace paulo longiora, apice parum oblique truncata, convexa, confertim subtiliter punctata, macula rhombea subtransversa testaceo-rufa ad basin, basin ipsam haud attingente, a margine exteriore paulo magis quam a sutura remota, sat distincta et terminata. Abdomen sat dense subtiliter punctatum, segmentis ultimis rufo-marginatis, apice pilosellum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufi, tibiis intermediis parce, posticis vix spinulosis, tarsis posticis tibia parum longioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice fortiter triangulariter exciso, superiore apice rotundato, tarsis anticis articulis tribus primis mo-
dice dilatatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, setis rigidis fulvis dense ciliato, superiore quadrifido, laciiniis intermediis profunde divisis, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

Obs. Nomine Tachypori interrupti a Dahlia et Zieglero missus.

* 8. *C. binotatus*: *Fuscus, fulvescenti-pubescent, antennis pedibusque rufo-testaceis, elytris thorace sesqui longioribus, macula magna basali rufa.* — Long. 1½ lin.

Tachyporus binotatus Grav. Micr. 132. 12. Mon. 5. 5. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 9. 12. — Er. Col. March. I. 391. 3.

Habitat in Germania.

C. pubescens paulo minor, fuscus, nitidulus, pube subtiliore deppressa fulvescente vestitus. Antennae capite thoraceque paulo breviores, apicem versus leviter incrassatae, articulis 5—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, obconicis, ultimo ovato, apice abrupte acuminato, pilosellae, rufotestaceae, articulo ultimo flavo. Caput leviter convexum, parce subtilissime punctatum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopteris parum latior, antrorum angustatus, apice vix duplo quam basi angustior, latitudine baseos dimidio prope brevior, lateribus sat rotundatus, basi utrinque sub-
sinuatus, angulis posterioribus retrorsum sat prominulis, rotundatis, modice convexus, densius subtiliter punctatus, margine basali rufescens. Elytra thorace sesqui longiora, apice truncata, leviter convexa, confertim subtiliter punctata, macula magna rotundata rufo-testacea, a basi ad elytri medium usque descendente, margini exteriori et suturae aequaliter approximata, minus distincte terminata, margine apicali summo rufescens. Abdomen densius subtiliter punctatum, segmentis singulis margine rufis, apice testaceum et parcus pilosellum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei, tibiis intermediis longius, posticis vix spinulosis, tarsis posticis tibia paulo longioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice sat fortiter triangulariter exciso, superiore apice obtuse acuminato, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, pilis brevissimis tenuiter ciliato, superiore quadrifido, laciiniis intermediis sat pro-
funde divisis, tarsis anticis levissime dilatatis.

* 9. *C. basalis*: *Fuscus, nitidus, griseo-pubescent, elytris macula basali transversali summoque margine apicali rufescens, antennis elongatis pedibusque testaceis.* — Long. 1½ lin.

Habitat in Carolina meridionali, Dom. Zimmermann.

C. binotato paulo minor, convexus, fuscus, subnitidus, pube deppressa fulvescenti-grisea sericante densius vestitus. Antennae sat elongatae, gracieles, apice leviter incrassatae, articulis 3—5 elongatis, teretibus, 6—10 elongato-obconicis, sensim paulo crassioribus at vix brevioribus, ultimo oblongo-ovato, apice abrupte acuminato, obscure testaceae, basi flavescens, articulo ultimo dilute flavo. Caput convexum, vix punctulatum, nigrum, nitidum, ore late testaceo. Thorax coleopteris latior, antrorum angustatus, apice duplo fere quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus aequaliter rotundatus, margine basali medio late recto, angulis posterioribus retrorsum prominentibus, acutiusculis, fortiter convexus, confertissime subtiliter punctatus, nigro-fuscus, margine basali et apicali rufescens. Elytra thorace longiora, apice truncata, convexa, confertissime subtiliter punctata, fusca, macula magna in ipsa basi, a margine exteriore magis quam a sutura distante, rufa, margine summo apicali rufescens. Abdomen subtilissime punctulatum, segmentis singulis apice piceis, posterioribus subtestaceis, densius pubescens, lateribus et apice fortiter nigro-pilosum. Mesosternum acute carinatum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus, femoribus posterioribus apice parce; tibiis vix spinulosis, tarsis posticis sat elongatis, anticis articulis tribus primis in utroque sexu leviter dilatatis.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice triangulariter exciso, antennis capite thoraceque longioribus.

Femina abdominis segmento sexto superiore quadrifido, laciiniis intermediis profunde divisis.

Variat corpore dilutiore, fusco-rufescens.

10. *C. interruptus*: *Fuscus, griseo-pubescent, coleopteris fascia basali, medio interrupta pedibusque rufis, antennis testaceis, medio fuscis.* — Long. 1½ lin.

Habitat in valle Araguensi Columbiae, Dom. Moritz.

Praecedenti affinis, at paulo angustior, convexus, fuscus, nitidulus, subtiliter punctulatus, pube deppressa griseo-fulvescente subsericante tenuiter vestitus. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice sensim incrassatae, articulis 4 primis testaceis, tertio quartoque teretibus, modice elongatis, 5—10 subobconicis, sensim crassioribus at vix brevioribus, ultimo crassiusculo, ovato, apice acuminato, 5—9 fuscis, ultimis duabus laete testaceo-flavis. Caput modice convexum, vix punctulatum, ore cum palpis testaceo.

Thorax coleopteris parum latior, antrorum modice angustatus, apice dimidio fere quam basi angustior, latitudine baseos parum brevior, lateribus leviter rotundatus, basi truncatus, utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorum vix prominulis, rectis, valde convexus, parcus omnium subtilissime punctulatus, margine basali et lateraliter obsolete rufescens. Elytra thorace parum longiora, apice oblique truncata, leviter convexa, densius subtiliter punctata, fascia basali ad suturam abbreviata rufo-testacea, margine summo apicali rufescens. Abdomen subtilissime punctulatum, apice testaceum, densius pubescens, lateribus et apice fortiter nigro-pilosum. Mesosternum leviter carinatum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus, posteriores femoribus apice tibiisque parce spinulosos, tarsis posticis modice elongatis.

Mas segmento abdominis sexto inferiore apice leviter triangulariter exciso, tarsis anticis articulis tribus primis fortius dilatatis.

Femina latet.

Obs. Affinis praecedenti, statura autem paulo angustiore, antennis articulis 5 — 9 distincte fuscis, coleopterorum fascia ad marginem exteriorem continuata etc. satis distinctus.

* 11. *C. cinctulus*: *Niger, subnitidus, tenuiter pubescens, antennis basi apiceque pedibusque testaceis, coleopteris fascia basali integra rufa, sutura abdominali densius pubescentibus*. — Long. 1½ lin.

Habitat in Carolina meridionali, Dom. Zimmermann.

Statura et summa affinitas C. basalis. Antennae capitis thoracisque longitudine, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulis 2 — 4 subelongatis, teretibus, 5 — 10 subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, penultimis transversis, ultimo breviter ovato, apice subacuminato, articulis tribus primis flavis, sequentibus fuscis, ultimo testaceo. Caput modice convexum, parce subtiliter punctulatum, parce griseo-pubescentia, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, antrorum leviter angustatus, apice dimidio fere quam basi angustior, latitudine baseos distincte brevior, lateribus rotundatus, margine basali medio late recto, angulis posterioribus retrorum leviter prominentibus, acutusculis, fortiter convexus, dense subtiliter punctatus, fusco-niger, subnitidus, margine basali et lateraliter tenui rufescens, pube depressa flavescenti-grisea tenuiter vestitus. Scutellum fuscum. Elytra thorace paulo longiora, apice oblique truncata, leviter convexa, confertissime subtiliter punctata, nigro-fusca, subnitida, fascia integra in ipsa basi rufa, tenuiter fusco-pubescentia, fascia basali et sutura pube densa depressa griseo-fulvescente sericante obductis. Abdomen confertissime subtiliter punctatum, nigrum, segmentis singulis margine apicali piceo, quinto testaceo, pube depressa griseo-fulvescente dense vestitum, apice nigro-pilosum. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei, coxis anticis concoloribus, posteriores femoribus apice tibiisque parcus spinulosos, tarsis posticis minus elongatis, tibiae longitudine aequalibus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice triangulariter exciso, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

Femina latet.

Obs. Differt a praecedentibus coleopterorum fascia integra, antennarum colore, abdomine lateribus haud piloso etc.

* 12. *C. varius*: *Niger, sericeo-pubescentia, thorace pedibusque testaceis, elytris nigro-testaceo-que variegatis*. — Long. 1½ lin.

Habitat prope Caracas Columbiae, Dom. Moritz.

C. fusculo paulo angustior, totus pube minus subtili, depressa, griseofulvescente minus dense vestitus. Antennae capite thoraceque parum breviores, apicem versus leviter incrassatae, articulis 2 — 4 elongatis, subteretibus, 5 — 10 brevioribus, subobconicis, sensim paulo crassioribus, ultimo maiuscule, subovato, apice acuminato, rufo-testacea, basi flavescentes. Caput parum convexum, vix punctulatum, nigro-piceum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopteris paulo latior, antrorum angustatus, apice quam basi duplo angustior, latitudine baseos distincte brevior, lateribus parum rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorum haud prominulis, obtususculis, modice convexus, parce subtilissime punctulatus, testaceus, nitidus. Scutellum nigrum. Elytra thorace tertia parte longiora, apice truncata, leviter convexa, subtiliter sat crebre punctata, nigra, maculis oblongis confluentibus testaceis variegata. Abdomen piceum, lateribus et apice fortiter nigro-pilosum. Pectus nigrum. Pedes testacei.

Mas latet.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice leviter producta, setis rigidis densius ciliato, superiore apice quadrifido, tarsis anticis leviter dilatatis.

13. *C. venustulus*: *Tenuiter pubescens, piceus, capite, thorace pectore-que rufis, elytris nigris, his macula magna basali pedibusque flavis*. — Long. 1¼ lin.

Habitat prope Puerto Cabello Columbiae, Dom. Moritz.

Statura omnino C. fusculi. Corpus totum pube depressa fulvescenti-grisea parce vestitum. Antennae capite thoraceque paulo breviores, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulis 2 — 4 elongatis, teretibus, 5 — 10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, 5 — 7 subobconicis, 8 — 10 transversis, ultimo breviter ovato, apice obtuse acuminato, testacea, articulis 7 — 10 fuscis. Palpi testacei. Caput parum convexum, parce disperse subtiliter punctatum, nitidum, testaceo-rufum. Thorax coleopteris perparum latior, antrorum angustatus, apice dimidio fere quam basi angustior, latitudine baseos parum brevior, lateribus leviter rotundatus, basi truncatus, angulis posterioribus retrorum paululum prominulis, acutusculis, modice convexus, parcus subtiliter punctatus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum testaceum. Elytra thorace longiora, apice vix oblique truncata, modice convexa, dense minus subtiliter punctata, nigerrima, nitida, macula magna densius pubescente in ipsa basi flavo-testacea. Abdomen piceum, densius pubescens, lateribus et apice fortiter nigro-pilosum. Pectus rufum. Pedes flavo-testacei, coxis anticis concoloribus, posticis femoribus apice tibiisque parce longius spinulosos, tarsis posticis satis elongatis.

Mas latet.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice producto et setis rigidis parciорibus ciliato, superiore quadrifido, laciinis intermediis profunde divisis, tarsis anticis articulis tribus primis parum dilatatis.

* 14. *C. obsoletus*: *Fuscus, fulvescenti-pubescent, thorace elytrisque rufo-testaceis, his thorace sesqui longioribus, antennarum basi pedibusque testaceis*. — *Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Habitat prope Caracas Columbiae, Dom. Moritz.

Statura omnino *T. fusculi*. Corpus totum pube tenui depresso griseo-flavescente subsericante minus dense vestitum. Antennae capite thorace que paulo breviores, apicem versus vix incrassatae, articulis 2—4 modice elongatis, teretibus, 5—10 brevioribus, subobconicis, sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, ultimo praecedentibus ambobus paulo longiore, apice acuminato, fuscae, articulis 5 primis pallide testaceis. Palpi flavi. Caput parum convexum, laeve, testaceo-rufum vel rufo brunneum, nitidum, ore rufescente. Thorax basi coleopterorum latitudine, antrorsum angustatus, apice duplo prope quam basi angustior, latitudine baseos brevior, lateribus parum rotundatus, apice truncatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominulis, subrectis, modice transversim convexus, vix punctulatus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum fuscum. Elytra thorace sesqui longiora, leviter convexa, subtilissime punctulata, rufo-testacea, lateribus medio infuscatis. Abdomen fuscum, lateribus et apice fortiter nigro-pilosum. Pectus fuscum. Pedes flavo-testacei, posticii femoribus apice et tibiis parce spinulosis, tarsis posticis sat elongatis.

Sexus differentia in specime descripto haud perspicua.

* 15. *C. fumatus*: *Fuscus, nitidus, fulvescenti-pubescent, antennarum basi pedibusque testaceis, thorace limbo rufescente, angulis posterioribus haud prominulis, rotundatis, elytris thorace longioribus*. — *Long. 1 $\frac{1}{2}$ lin.*

Habitat in Terra Van-Diemenii, Dom. Schayer.

Statura intermedium quasi inter *C. pubescens* et *fusculum*, utriusque affinis, ab utroque autem pube minus subtili et thoracis angulis posterioribus haud prominulis rotundatis satis distinctus. Nigro-fuscus, nitidus, pube depresso minus subtili fulvescente sericante leviter vestitus. Antennae longiores, articulis 4—10 subobconicis, sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, fuscae, articulis 4 primis testaceis; (ultimo specimini unico deest). Caput fortiter convexum, laevissimum, ore testaceo. Thorax coleopteris vix latior, antrorsum sat angustatus, apice duplo quam basi angustior, latitudine baseos dimidio brevior, lateribus fortiter rotundatus, basi truncatus, utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominulis, rotundatis, modice transversim convexus, parce subtiliter punctatus, limbo omni piceo-rubo, disco indeterminate fusco-piceo. Elytra thorace tertia parte longiora, apice oblique truncata, leviter convexa, densius subtiliter punctata, fusca, margine summo apicali rufescente. Abdomen parce subtiliter punctatum, parcus pubescens, lateribus et apice longius nigro-pilosum, apice et segmentorum singulorum margine posteriore rufo-piceo. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei, tibiis posterioribus vix spinulosis, tarsis posticis minus elongatis, tibia haud longioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice sat fortiter triangulariter exciso, superiore apice rotundato, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

* 16. *C. fusculus*: *Fusco-niger, griseo-pubescent, antennis basi testaceis, apice flavis, pedibus rufis, elytris thorace longioribus*. — *Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Tachyporus fusculus Er. Col March. I. 591. 4.

Tachyporus pedicularius Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 519. 12.

Habitat in Germania.

Habitus et summa similitudo *C. pubescens*, at triplo minor, convexus, fusco-niger, pube subtili depresso grisea sericante vestitus. Antennae capitis thoracisque fere longitudine, articulis 3 et 4 elongatis, teretibus, 5—10 subobconicis, sensim brevioribus et paulo crassioribus, primis eorum sat elongatis, ultimo praecedente parum maiore, fuscae, articulis tribus primis testaceis, ultimis duabus flavis. Caput leviter convexum, laevigatum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, antrorsum angustatus, apice duplo quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus modice rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum paululum prominulis, acutis, convexus, confertim subtilissime punctatus, margine basali summo rufescente. Elytra thorace paululum longiora, apice truncata, leviter convexa, confertissime subtiliter punctata, margine apicali rufescente. Abdomen confertim subtiliter punctatum, segmentis singularis margine postico rufescente, apice pilosellum. Mesosternum acute carinatum. Pedes rufo-ferruginei, coxis anticis concoloribus, tibiis intermediis parce, posticis vix spinulosis, tarsis posticis modice elongatis, tibia parum longioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice sat fortiter triangulariter exciso, superiore subacuminato, tarsis anticis articulis tribus primis modice dilatatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato, setis rigidis fulvis dense ciliato, superiore apice quadrifido, laciinis intermediis brevi spatio divisis, tarsis anticis articulis tribus primis leviter dilatatis.

Variat minus maturus corpore ferrugineo vel rufo-testaceo.

Obs. *C. pediculario* similis, statura autem sesqui maiore, antennis medio fuscis, thoracis angulis posterioribus acutis et elytris longioribus facile distinguendus.

* 17. *C. lividus*: *Rufo-testaceus, fulvescenti-pubescent, pectore piceo, elytris thorace paulo longioribus*. — *Long. 1 lin.*

Habitat Lutetiae, Dom. Dr. Aubé, in Sardinia, Dom. Prof. Gené.

Statura et summa affinitas *C. pedicularii*, rufo-testaceus, pube depresso minus subtili fulvescente densius vestitus. Antennae longiores, apice sensim subincrassatae, articulis teretibus, penultimis tribus quatuorve subobconicis, ultimo praecedente sesqui maiore, apice abrupte acuminato, flavo-testaceae. Caput leviter convexum, laevissimum. Thorax coleopteris paululum latior, antrorsum angustatus, tertia parte quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus rotundatus, margine basali medio recto, angulis posterioribus leviter retrorsum prominentibus, acutiusculis, convexus, omnium subtilissime punctatus. Elytra thorace paulo longiora, apice oblique truncata,

convexa, confertim subtilius punctata. Abdomen subtilissime punctatum, segmentus duobus primis summa basi nigricantibus, apice nigro-pilosellum. Pedes piceum. Mesosternum acute carinatum. Pedes testacei, tibis posterioribus haud spinulosis, tarsis posticis tibia paulo brevioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice fortiter triangulariter exciso, superiore apice obtuse rotundato, tarsis anticis leviter dilatatis, antennis capite thoraceque longioribus.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice leviter triangulariter producto et dense fulvo-ciliato, superiore apice quadrifido, tarsis anticis simplicibus, antennis capitis thoracisque longitudine.

Obs. A C. pediculario differt antennis elytrisque longioribus, thoracis angulis posterioribus acutioribus et mesosterni carina fortiore, acuta etc., a C. fuscuso statura minore elytris brevioribus, ab utraque pube minus subtilli. Ceterum speciminibus eorum immaturis similis, at color testaceus huic speciei normalis.

* 18. *C. pedicularius*: *Nigro-piceus, nitidus, subtiliter griseo-pubescent, antennis pedibusque testaceis, elytris thorace subbrevioribus*. — Long. 1 lin.

Tachyporus pedicularius Grav. Micr. 133. 14. Mon. 4. 2. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 10. 14. — Gyll. Ins. Suec. II. 246. 11. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 293. 11. — Mannerh. Brachelytr. 60. 13. — Runde Brachel. Hal. 25. 7. — Er. Col. March. I. 392. 5.

Var.: *Totus testaceus, immaturus*.

Tachypor. truncatellus Grav. Mon. 5. 3.

Habitat in Europa.

Minutus, convexus, nigro-piceus, nitidulus, pube subtili depresso grisea sericante densius vestitus. Antennae capitis thoracisque prope longitudine, apicem versus subincassatae, articulis 5—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo praecedente sesqui maiore, apice abrupte acuminato, totae testaceae. Caput convexus, laeve, nigrum, ore testaceo. Thorax coleopteris latior, antrorsum angustatus, apice duplo fere quam basi angustior, lateribus sat rotundatus, margine basali medio recto, angulis posterioribus retrorsum fortiter prominulis, rotundatis, valde convexus, densius omnium subtilissime punctatus, margine basali summo rufescens. Elytra thoracis longitudine vel paulo breviora, apice oblique truncata, convexa, confertim subtiliter punctata, margine apicali rufescens. Abdomen dense subtilissime punctulatum, segmentis singulis margine postico rufescens, apice parcus nigro-pilosus. Mesosternum leviter carinatum. Pedes rufo-testacei, tibis posterioribus muticis, tarsis posticis tibia paulo brevioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice fortiter triangulariter exciso, superiore apice obtuse rotundato.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice leviter triangulariter producto et subtilius fulvo-ciliato, superiore apice quadrifido, tarsis anticis haud dilatatis.

Variat minus maturus corpore ferrugineo vel testaceo.

* 19. *C. bipunctatus*: *Niger, nitidus, tenuiter sericeo-pubescent, elytrorum macula basali arcuata pedibusque rubris, antennis testaceis, medio fuscis*. — Long. 1 lin.

Tachyporus bipunctatus Grav. Micr. 133. 13. Mon. 5. 4. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 9. 13. — Gyll. Ins. Suec. III. 702. 10—11. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 293. 10. — Mannerh. Brachelytr. 60. 12. — Er. Col. March. I. 392. 6.

Habitat in Germania, sub cortice Salicis.

C. pediculario statura et magnitudine aequalis, niger, nitidus, pube subdepressa grisea tenuiter vestitus. Antennae capite thoraceque breviores, apicem versus sensim leviterque incassatae, articulis 3 et 4 leviter elongatis, subobconicis, 5—10 transversis, sensim paulo crassioribus, ultimo praecedente paulo longiore, apice subacuminato, testaceae, medio fuscae. Caput parce subfisiter punctatum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, antrorsum angustatus, apice duplo fere quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum sat prominulis, rotundatis, convexus, parce subtilissime punctatus. Elytra thorace sesqui fere longiora, apice oblique truncata, convexa, densius subtiliusque punctata, margine laterali setoso, macula magna testaceo-rufa, ante basin transversali, dein secundum suturam elongata, ideoque arcuatim ab humero ad angulum suturalem apicalem pertingente. Abdomen, parce subtilissime punctatum, segmentis singulis margine postico rufo-piceo, apice rufum, dorso parce, lateribus et apice crebre nigro-pilosum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufi, tarsis testaceis, tibis posterioribus vix spinulosis, tarsis posticis tibia haud longioribus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore apice triangulariter exciso, superiore apice obtuso, tarsis anticis leviter dilatatis.

Femina abdominis segmento sexto inferiore apice rotundato ciliatoque, superiore quadrifido, laciniis intermediis profundius divisis, tarsis anticis vix dilatatis.

Variat elytrorum macula obliqua basali et litura longitudinali subsuturali disiunctis.

Tachyporus Grav.

Tachyporus ** Er. Col. March. I. p. 392.

Antennae 11-articulatae, filiformes.

Palpi maxillares articulo quarto subulato.

Ligula biloba, lobis rotundatis.

Elytra pectore longiora.

Abdomen marginatum.

Tarsi 5-articulati.

Corpus oblongum, antice obtusiusculum, postice sensim attenuatum, convexum, alatum. Caput thoraci insertum, fronte convexiuscula, antice angusta, oculis mediocribus, rotundatis, convexis. Labrum transversum, integrum. Mandibulae breves, trigonae, intus membrana angusta interne ciliata fimbriatae. Maxillae (t. III. f. 3. b.) malis corneis, apice barbatis, exteriore interiore parum superante, hac interne membranosa. Palpi maxillares articulo primo minuto, secundo tertioque modice elongatis, longitudine subaequalibus, hoc incassato, quarto parvo, subulato. Labium (t. IV. f. 3. a.) mento transverso, ligula lata, membranosa, biloba, lobis integris, rotundatis, divergentibus, paraglossis ligulae connatis, nonnisi ciliarum serie cognoscen-

dis. Palpi labiales articulis duobus primis crassiusculis, subaequalibus, tertio haud breviore at tenuiore, acuminato. Antennae filiformes, apicem versus plerumque subincrassatae. Thorax amplus, transversim convexus, transversus, basi coleopteris arcte applicatus, antrorum angustatus, apice truncatus, licet angulis anterioribus sat promentibus, acutis. Scutellum triangulare. Elytra pectore longiora, tenuiter marginata, angulo apicali exteriore truncata. Abdomen distincte marginatum, apicem versus sensim at sat fortiter angustatum, vivis modice elongatum. Mesosternum simplex. Pedes modice elongati, coxis posticis parallelopedis, ad femorum basin scutiforme elevatis, femoribus omnibus laevibus, tibiis anticis muticis, posterioribus sat fortiter spinulosis, tarsis posterioribus elongatis, omnibus articulis 3 primis decrescentibus, subtus pubescentibus, quarto minimo, quinto leviter elongato.

Observationes.

1. Caput et thorax laevissima, glaberrima, elytra subtiliter punctata, iam glabra, iam tenuiter pubescentia, margine laterali pilosello. Abdomen saepius subtilissime pubescens, lateribus et apice pilosellum.

2. Mas abdominis segmento sexto superiore integro, inferiore apice exciso, septimo conspicuo.

Femina abdominis segmento sexto superiore apice quadrifido, laciinis aequalibus, acutis, inferiore integro, apice pilis rigidis dense ciliato.

3. Victus in quisquiliis, sub foliis deciduis, musco etc.

* 1. *T. obtusus*: *Testaceo-rufus, nitidus, pectore, elytrorum basi abdominalisque apice nigris*. — Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Mannerh. *Brachelytr.* 59. 6. — Er. Col. March. I. 392. 7.

Staph. obtusus Linn. *Syst. Nat.* I. II. 684. 9. — *Fab. Syst. Ent.* 266. 10. *Spec. Ins.* I. 336. 11. *Mant. Ins.* I. 221. 17. — *Schrantz Enum. Ins. Aust.* 237. 451. — *Goeze Ent. Beitr.* I. 718. 9. — *De Vill. Ent.* I. 414. 9. — *Rossi Faun. Etr.* I. 251. 621. (*Ed. Hellw.* 311. 621.) — *Marsh. Ent. Britt.* 520. 61.

Oxypor. analis Fab. *Mant. Ins.* I. 222. 3. *Ent. Syst.* I. II. 533. 10. *Syst. El.* II. 606. 10. — *Panz. Faun. Germ.* 22. 16. *Ent. Germ.* 360. 6.

Tachypor. analis Grav. *Micr.* 129. 8. *Mon.* 6. 10. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins.* X. 8. — *Gyll. Ins. Suec.* II. 239. 4. — *Zetterst. Faun. Lapp.* I. 58. 4. *Ins. Lapp.* 55. 5. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 290. 4. — *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 516. 4. — *Runde Brachelytr. Hal.* 24. 3.

Staph. vernalis Müll. *Prod.* 98. 1103. — *Goeze Ent. Beitr.* I. 727. 27.

Staph. dispar var. γ Payk. *Mon. Staph.* 78. 54. *Faun. Suec.* III. 423. 69.

Staph. chrysomelinus var. 2 Walk. *Faun. Paris.* I. 273. 19.

Staphyl. melanurus Marsh. *Ent. Britt.* 525. 80.

Habitat in Europa.

Antennae capite thoraceque paulo longiores, apicem versus parum incrassatae, testaceae, articulis 4 primis flavis. Caput laevissimum, rufo-testaceum, oculis nigris. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine dimidio brevior, angulis posterioribus obtusis, externe rotundatis, basi utrinque subsinuatus, transversim convexus, laevissimus, totus rufo-testaceus. Scutellum nigrum. Elytra thorace sesqui longiora, subtiliter punctata, rufo-testacea, basi lata nigra. Abdomen rufo-testaceum, segmentis ultimis duobus nigris, omnibus basi punctatis. Pectus nigrum. Pedes testacei.

Mas tarsis anticis leviter, femina vix dilatatis.

* 2. *T. abdominalis*: *Rufo-testaceus, nitidus, pectore abdominalisque fuscescentibus, elytris thorace parum longioribus*. — Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Er. Col. March. I. 393. 8.

Tachypor. abdominalis var. a Gyll. *Ins. Suec.* II. 238. 3. — *Zetterst. Faun. Lapp.* I. 58. 3. *Ins. Lapp.* 55. 4. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 290. 3. — *Mannerh. Brachelytr.* 59. 4.

Habitat in Europa.

Habitu omnino praecedentis, at paulo minor, rufo-testaceus, nitidus, pectore abdominalisque tota fuscescentibus, hoc segmentis singulis margine late testaceis. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice sensim subincrassatae fuscescentesque. Caput laevissimum. Thorax latitudine plus dimidio brevior, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum parum prominulis, rotundatis, transversim convexus, laevissimus. Elytra thorace parum longiora, parcus subtilissime punctata, tenuissime pubescentia, immaculata. Abdomen parcus subtiliter punctulatum.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Obs. Synonymia huius speciei minus perspicua, et dubito an loci a Gyllenhalio citati omnes hue referri possint. *Tachyp. abdominalis* Grav. certe ad *T. brunneum* pertinet. *Oxyporus abdominalis* F. ab. (Spec. *Ins. Suppl.* 501. 6. *Mant. Ins.* I. 222. 7. *Ent. Syst.* I. II. 535. 17. *Syst. El.* II. 507. 17.) mihi omnino dubius, in Museo etiam a Fabricio citato invisus, minime ad speciem nostram revocandus videtur, huic enim minime est abdomen atrum, nitidum. — *T. abdominalis* var. b apud Gyllenhal aegre ad hanc speciem alleganda, specimina auctore ipso sub hoc nomine missa, quae Dom. Schüppel mihi communicavit, potius specimina omnino immatura aliis cuiusdam speciei vel aliarum quarundam specierum esse puto.

* 3. *T. rufus*: *Rufo-testaceus, nitidus, pectore abdominalisque nigris, elytris thorace sesqui longioribus, basi prope scutellum nigricantibus*. — Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Tachypor. abdominalis Boisd. et Lacord. *Faun. Ent. Paris.* I. 515. 5.

Habitat Lutetiae, Dom. Aubé.

Statura omnino *T. chrysomelinii*. Antennae capite thoraceque paulo longiores, tenuiores, apicem versus leviter sensim incrassatae, articulo ultimo apice abrupte acuminato, flavae, articulis penultimis tribus fuscis, ultimo testaceo. Caput laevissimum, dilute rufo-testaceum, nitidum. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos dimidio brevior, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominulis, externe rotundatis, transversim convexus, laevissimus, dilute rufo-testaceus. Scutellum piceum. Elytra thorace sesqui longiora, subtiliter crebre punctata, basi prope scutellum nigricantia. Abdomen crebrius punctatum, nigrum, nitidum, segmentis 4 primis margine apicali obscure testaceis, quinto fere toto testaceo, sexto nigro. Pectus mesothoracis rufo-testaceum, metathoracis nigrum. Pedes dilute testacei, coxis omnibus concoloribus, posticis basi nigris.

Mas tarsis anticis fortius, femina leviter dilatatis.

Obs. Differt a praecedente praecipue statura sesqui maiore, abdome magis nigro, elytris longioribus et basi nigricantibus. A *T. chrysomelinii* facile distinguitur capite rufo-testaceo,

* 4. *T. saginatus*: *Niger, nitidus, thorace, elytris pedibusque rufis, antennis brevioribus, latiusculis, compressis, ferrugineis*. — *Long. 2 lin.*

Grav. Mon. 6. 11. — Mannerh. Brachelytr. 59. 1. — Er. Col. March. I. 393. 9.

Habitat in Germania.

T. chrysomelino duplo maior, praecipue latior. Antennae capite thoraceque breviores, crassiusculae, apicem versus sensim incrassatae, ab articulo quarto inde sensim magis compressae, ferrugineae. Caput convexum, laevissimum, nigro-piceum, nitidum, subtus oreque rufis. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus postice haud prominulis, rotundatis, transversim convexus, laevissimus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum piceum. Elytra thorace paulo longiora, subtiliter crebrius punctulata, testaceo-rufa, basi prope scutellum fuscescantia. Abdomen subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine summo postico obscure testaceo. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei, coxis anterioribus concoloribus.

Mas tarsis anterioribus levissime dilatatis, femina simplicibus.

* 5. *T. erythropterus*: *Niger, nitidus, elytris pedibusque rufis, antennis brevioribus, crassis, ferrugineis*. — *Long. 1½ lin.*

Oxyporus erythropterus Panz. *Faun. Germ. 27. 21.*

Habitat in Germania meridionali, Dom. Dr. Waltl.

Habitu omnino *T. saginati*, at minor, *T. hypnorum* perparum maior. Antennae capite thoraceque breviores, crassiusculae, apicem versus incrassatae, ab articulo quarto inde sensim fortius compressae, ferrugineae. Caput laevissimum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleoptera latitudine parum excedens, latitudine baseos paulo brevior, antrorsum minus fortiter angustatus, lateribus minus rotundatis, basi utrinque leviter sinuatus, angulis posterioribus retrorsum modice prominentibus, late rotundatis, fortiter convexus, laevissimus, niger, nitidus, margine summo basali lateralique rufescente. Scutellum nigrum. Elytra thorace parum longiora, subtiliter punctata, saturate rufa, nitida, basi et circa scutellum tenui spatio nigricantia. Abdomen nigrum, nitidum, parcus subtiliter punctatum, segmentis singulis margine summo postico rufescente. Pectus nigrum. Pedes rufi, coxis anticis piceis, brevisculi fortiusculique, tarsis brevioribus, subcompressis.

Mas tarsis anticis vix dilatatis. Femina latet.

Obs. *T. saginato* antennarum structura affinis, differt autem thorace scutelloque nigris, thorace angulis posterioribus prominentibus, elytris distinctius punctatis. A. *T. hypnorum* antennarum structura satis distinctus.

* 6. *T. hypnorum*: *Niger, thoracis margine testaceo, pedibus elytrisque rufis, his macula marginali nigra*. — *Long. 1½ lin.*

Er. Col. March. I. 394. 11.

Staph. hypnorum Fab. *Syst. Ent. 266. 13. Spec. Ins. I. 336. 16. Mant. Ins. I. 221. 23. — Goeze Ent. Beitr. I. 724. 7. — Marsh. Ent. Britt. 525. 79.*

Oxyporus hypnorum Fab. *Ent. Syst. I. II. 535. 22. Syst. El. II. 607. 22. — Panz. Ent. Germ. 361. 17.*

Staphyl. nitidulus Fab. *Spec. Ins. I. 337. 17. Mant. Ins. I. 221. 24. — Oliv. Ent. III. 42. 34. 48. t. 3. f. 28. — Marsh. Ent. Britt. 520. 64.*

Oxyporus minutus Fab. *Ent. Syst. I. II. 535. 20. Syst. El. II. 607. 20.*

Oxyporus marginatus Panz. *Ent. Germ. 359. 4. Faun. Germ. 27. 17.*

Tachyporus marginatus Grav. *Mier. 127. 5. Mon. 7. 13. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 6. 5. — Gyll. Ins. Suec. II. 237. 2. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 57. 2. Ins. Lappon. 55. 3. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 290. 2. — Mannerh. Brachelytr. 59. 3. — Guér. Iconogr. t. 10. f. 9. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 514. 1. — Ru de Brachelytr. Hal. 24. 2.*

Staph. Blattinus Schrank *Enum. Ins. Aust. 236. 447. Faun. Boic. I. 446. 878.*

Staph. conicus De Vill. *Ent. I. 425. 72.*

Staph. martialis Schrank *Enum. Ins. Aust. 237. 450.*

Staph. dispar var. β Payk. *Mon. Staph. 78. 54. Faun. Suec. III. 424. 69.*

Staph. chrysomelinus var. 1 Walk. *Faun. Paris. I. 272. 19.*

Habitat in Europa.

Statura omnino *T. chrysomelini*. Antennae capitinis thoracisque longitudine vel paulo longiores, graciliores, apicem versus parum crassiores, testaceae, apice subfuscatae. Caput laevissimum, nigrum, ore testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus postice haud prominentibus, obtusis, externe rotundatis, fortiter convexus, niger, nitidus, margine basali angusto lateralique basin versus sensim latiore testaceis. Scutellum nigrum. Elytra thorace paulo longiora, subtiliter punctata, rufa, macula parva triangulari circa scutellum maculaque oblonga laterali nigra, tenuissime pubescentia. Abdomen crebrius subtiliter punctatum, nigrum, segmentis singulis margine apicali ferrugineo. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis picei.

Mas tarsis anticis leviter, femina vix dilatatis.

* 7. *T. anticus*: *Niger, nitidus, thorace elytris pedibusque rufo-testaceis, thorace disco nigro*. — *Long. 1½ lin.*

Habitat in Aegypto, Dom. Prof. Ehrenberg.

T. hypnorum paulo minor et gracilior. Antennae capitinis thoracisque prope longitudine, apicem versus haud incrassatae, testaceae, apice fuscescentes. Caput convexum, laevissimum, nigrum, nitidum, palpis testaceis. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus haud prominulis, rotundatis, leviter transversim convexus, laevissimus, nitidus, testaceus, disco anteriore late nigro, seu niger, margine laterali et basali lato, anteriore angusto testaceo. Scutellum piceum. Elytra thorace sesqui prope longiora, subtiliter punctata, rufo-testacea, immaculata, nitida. Abdomen subtiliter punctatum, nigrum, segmentis singulis margine postico, quinti latiore, ferrugineo. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus.

Obs. *T. hypnorum* simillimus, distinctus autem statura minore, minus convexa, thorace coleopteris haud latiore, elytris constanter immaculatis, coxis anticis testaceis etc. A. *T. brunneo* differt statura duplo maiore, antennis apicem versus haud incrassatis etc.

* 8. *T. chrysomelinus*: *Niger, nitidus, antennarum basi, pedibus, thorace elytrisque testaceo-rufis, his thorace paulo longioribus, crebre subtiliter punctatis, circa scutellum et margine laterali nigris*. — *Long. 1½ lin.*

Grav. Micr. 128. 7. Mon. 7. 12. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 7. 7. t. 79. f. 9. Gen. Crust. et Ins. I. 300. 1. — Gyll. Ins. Suec. II. 236. 1. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 289. 1. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 57. 1. Ins. Lappon. 54. 1. — Manne. h. Brachelytr. 59. 2. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 515. 2. — Runde Brachelytr. Hal. 24. 1. — Er. Col. March. I. 393. 10.

Staph. chrysomelinus Linn. *Faun. Suec. n* 555. *Syst. Nat. I. II.* 685. 21. — *Fab. Syst. Ent.* 267. 17. *Spec. Ins.* 337. 21. *Mant. Ins. I.* 221. 28. — *Schrank Enn. Ins. Austr.* 236. 448. *Faun. Boic. I.* 616. 789. — *Ström. Act. Nidros. III.* 405. 28. — *Müll. Prod.* 98. 1105. — *Goeze Ent. Beitr. I.* 720. 21. — *De Vill. Ent. I.* 417. 21. — *Walk. Faun. Paris. I.* 272. 19. — *Fourc. Ent. Paris.* 169. 18. — *Rossi Faun. Etr. I.* 250. 616. (*Ed. Hellw.* 309. 616. var. 1. a.) — *Oliv. Ent. III.* 42. 33. 47. t. 3. f. 22. — *Marsh. Ent. Britt.* 519. 42.

Oxyporus chrysomelinus Fab. *Ent. Syst. I. II.* 534. 15. *Syst. El. II.* 606. 14. — *Panz. Faun. Germ. 9.* 14. *Ent. Germ.* 360. 12. — *Cederh. Faun. Ingr.* 120. 371.

Oxyporus melanocephalus Fab. *Ent. Syst. I. II.* 534. 16. *Syst. El. II.* 607. 16.

Staph. merdarius Marsh. *Ent. Britt.* 521. 68.

Oxyporus merdarius Panz. *Ent. Germ.* 360. 8. *Faun. Germ.* 27. 18.

Staph. chrysomelinus var. α Payk. *Mon. Staph.* 57. 74.

Staph. dispar var. α Payk. *Faun. Suec. III.* 423. 69.

Le Staph. couleur de paille Geoffr. *Hist. Ins. I.* 368. 18.

Habitat in Europa.

Statura et magnitudo T. obtusi. Antennae capitis thoracisque longitudine, graciles, apice vix incrassatae, articulis 5 — 10 sensim paulo brevioribus at parum crassioribus, subobconicis, ultimo his paulo crassiore, ovato, apice abrupte acuminato, articulis tribus primis dilute testaceis, reliquis rufo-fuscentibus. Caput mediocre, leviter convexum, laevissimum, nitidum, nigrum, ore testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos tertia fere parte brevior, basi truncatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominulis, obtusis, externe fortius rotundatis, transversim convexus, laevissimus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum nigrum. Elytra thorace tertia fere parte longiora, leviter conyexa, crebrius subtiliter punctata, glabra, nitida, rufo-testacea, spatio parvo communi triangulari circa scutellum, et margine laterali, postice abbreviato, nigris. Abdomen crebrius subtiliter punctatum, glabrum, lateribus et apice pilosellum, nigrum, segmentis singulis margine posteriore late rufo-testaceo, ultimo piceo-testaceo. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus.

Mas tarsis anticis modice, femina perparum dilatatis.

* 9. *T. solutus*: *Niger, nitidus, ore, antennis, pedibus, thorace elytrisque rufo-testaceis, his thorace paulo longioribus, circa scutellum infuscatis.* — *Long. 1 $\frac{2}{3}$ lin.*

Tachyporus saginatus Boisd. et Lacord. *Faun. Ent. Paris. I.* 515. 13.

Habitat in Europa..

Statura et summa affinitas T. chrysomelini, et maximis eius individuis magnitudine aequalis. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apicem versus distinctius incrassatae, articulis ultimis sex evidenter crassioribus, crassitie autem haud brevioribus, leviter obconicis, excepto ultimo oblongo-ovato, apice acuminato. Caput mediocre, leviter convexum, laevissimum, nitidum, nigrum, ore magis minusve testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, lati-

tudine baseos tertia fere parte brevior, basi truncatus, angulis posterioribus obtusis, externe subrotundatis, sat fortiter transversim convexus, laevissimus, nitidus, rufo-testaceus. Scutellum nigrum. Elytra thorace tertia fere parte longiora, leviter convexa, sat crebre subtiliter punctata, glabra, rufo-testacea, nitida, basi spatio communi triangulari nigricante. Abdomen sat crebre subtiliter punctatum, glabrum, lateribus et apice nigro-pilosellum, nigrum, nitidum, segmentis 4 primis margine tenui posteriore testaceo. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus.

Mas tarsis anticis modice, femina leviter dilatatis.

Obs. 1. Differt a T. chrysomelino antennis extrorsum crassioribus, totis testaceis, elytris margine lateraliter concoloribus, ano nigro, a T. saginato statura minore, minus lata, et antennarum structura.

2. *Tachypori chrysomelini* var. b Gyll. Sahlb. Zett. vix ad hanc speciem referenda, quae speciei genuinae magnitudine inferior fertur. *Oxyporus merdarius* Panz. pariter potius T. chrysomelum quam hanc speciem exhibet videtur, hac enim minor est, et antennae apicem versus fuscescunt.

* 10. *T. tersus*: *Niger, nitidus, antennarum basi, pedibus thorace elytrisque rufo-testaceis, his thorace sesqui longioribus, parce obsoleteque punctatis, margine laterali et cirea scutellum nigris.* — *Long. 1 $\frac{1}{2}$ lin.*

Habitat in Germania, Kirstein.

T. chrysomelino similis, at minor, angustior et minus convexus, statura omnino T. pusilli. Antennae capitis thoracisque longitudine, apicem versus perparum incrassatae, articulis 5 — 10 sensim paululum brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo praecedente paulo crassiore, ovato, apice abrupte acuminato, fuscae, articulis 4 primis testaceis. Caput mediocre, leviter convexum, laevissimum, politum, nigrum, ore concolor, oris partibus inferioribus testaceis. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio fere brevior, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus rotundatis, transversim convexus, laevissimus, nitidus, rufo-testaceus. Elytra thorace sesqui longiora, leviter convexa, parce subtiliter obsoleteque punctata, glabra, nitida, rufo-testacea, spatio parvo communi triangulari circa scutellum, et margine laterali tenuiore, summo apice abbreviato, nigris. Abdomen parcus subtiliter punctatum, glabrum, lateribus et apice parce nigro-pilosellum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine apicali obscure testaceis. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Obs. Affinis certe T. chrysomelino, at distinctus statura minore, angustiore, minus convexa, thorace breviore, coleopteris haud breviore, his parce obsoleteque punctatis, fere laevigatis, et ore testaceo.

* 11. *T. arduus*: *Niger, nitidus, ore, antennarum basi, pedibus, thorace elytrisque rufo-testaceis, his thorace paulo longioribus, parcus punctatis, circa scutellum et margine laterali nigris.* — *Long. 1 $\frac{1}{2}$ lin.*

Habitat in Pennsylvania, Dom. Zimmermann.

T. chrysomelino minor et angustior, statura omnino T. scituli. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulis 5 — 10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo praecedente paulo crassiore, subovato, apice abrupte acuminato, rufo-fuscae,

articulis 4 primis testaceis. Caput mediocre, convexum, laevissimum, nitidum, nigrum, ore testaceo. Thorax coleopteris vix latior, latitudine baseos tertia fere parte brevior, basi truncatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominulis, rotundatis, transversim convexus, laevissimus, nitidus, rufo-testaceus. Scutellum nigrum. Elytra thorace tertia fere parte longiora; leviter convexa, parcus et minus subtiliter punctata, subtiliter tenuiterque pubescentia, rufo-testacea, nitida, spatio parvo communi triangulari circa scutellum, et vitta marginali abbreviata, nonnunquam obsoleta, nigricantibus. Abdomen crebrius minus subtiliter punctatum, subtilissime tenuissimeque pubescens, lateribus et apice longius nigro-pilosellum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine posteriore, anterioribus 4 angustiore, quinto latiore rufo-testaceis, ultimo apice saepius piceo. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Variat elytris spatio inter maculam scutellarem et marginalem magis minusve infuscato.

Obs. Ab Europaeis omnino distinctus, differt a sequentibus ore testaceo, a praecedentibus statura minore, elytris pubescentibus, minus subtiliter punctatis.

* 12. *T. humerosus*: *Niger, nitidus, antennarum basi, pedibus, thorace elytrisque rufo-testaceis, his thorace longioribus, crebrius subtiliter punctatis, pubescentibus, lateribus et macula scutellari nigris.* — Long. $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ lin.

Tachyporus ruficollis var. (humerosus Knoch) Grav. Mon. p. 8.

Tachyporus lateralis Grav. Micr. 127. 4. Mon. 7. 14. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 6. 4. (forte)*

Tachyporus ruficollis Runde Brachelytr. Hal. 25. 4.

Habitat in Germania.

T. chrysomelino dimidio vel duplo minor, brevior et convexior. Antennae capitum thoracisque longitudine, tenuiores, apicem versus vix incrassatae, articulis 4 — 10 sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, subobconicis, ultimo praecedente duplo prope longiore, subovato, apice abrupte acuminato, fuscae, basi testacea. Palpi testacei. Caput magnum, convexum, laevissimum, nitidum, nigrum, ore concolore. Thorax coleopteris vix latior, latitudine baseos tertia fere parte brevior, antrorsum leviter angustatus, basi truncatus, angulis posterioribus rotundatis, sat fortiter transversim convexus, laevissimus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum nigrum. Elytra thorace tertia parte longiora, sat convexa, crebrius subtiliter punctata, densius subtiliter pubescentia, nitida, rufa, spatio minuto communi triangulari circa scutellum, margineque basali et lateral, hoc apice abbreviato, nigris, spatio interiacente saepius magis minusve infuscato, limbo apicali magis rufo-testaceo. Abdomen crebrius subtiliusque punctatum, subtilissime tenuiter pubescens, lateribus et apice nigro-pilosellum, nigrum, nitidum, segmentis 4 primis margine posteriore testaceo. Pectus nigrum. Pedes testacei, coxis anterioribus concoloribus.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Obs. *T. chrysomelino* similis, distinguitur autem corpore minore, convexiore, elytris pubescentibus et ore concolore, *T. ruficollis* magis affinis, differt autem an-

tennis longioribus, praeter basin fuscis, thorace breviore, antrorsum evidenter angustato, elytris longioribus, et tarsis anticis maris leviter dilatatis.

* 13. *T. ruficollis*: *Niger, nitidus, thorace pedibusque rufis, elytris thoracis longitudine, piceis, apice rufescens.* — Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Grav. Micr. 128. 6. Mon. 7. 16. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 7. 6.

Staph. chrysomelinus var. 1. α. β Rossi Faun. Etr. Ed. Hellw. I. 309. 616.

Habitat in Germania.

Antennae capitum thoracisque prope longitudine, tenues, apicem versus vix incrassatae, articulis 5—10 sensim paululum brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo praecedente perparum maiore, subobconico, apice abrupte acuminato, totae testacea. Palpi testacei. Caput magnum, convexum, laevissimum, nigrum, nitidum, ore concolore. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos paulo brevior, antrorsum parum angustatus, basi truncatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominentibus, rotundatis, fortiter convexus, laevissimus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum piceum, Elytra thorace vix longiora, convexa, subtiliter punctata, subtilissime tenuiter pubescentia, iam nigro-, iam fusco-picea, nitida, margine apicali rufescens. Abdomen crebre subtiliter punctatum, subtiliter tenuiterque pubescens, lateribus et apice parce nigro-pilosellum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine summo postico testaceo. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei, coxis anterioribus concoloribus.

Mas tarsis anticis fortiter dilatatis, femina simplicibus.

Variat elytris rufo-piceis vel omnino rufis.

Obs. Omnino distinctus statura brevi, convexa, capite magno, antennis brevibus tenuibusque, totis testacea, thorace longiore et antrorsum perparum angustato. Var. ad calcem memorata *T. humeroso* similis, notis autem modo laudatis distinguenda. *T. ruficollis* Gyll. ad *T. transversalem* referendus.

* 14. *T. pusillus*: *Niger, nitidus, thoracis margine elytrisque fuscis, his thorace sesqui longioribus, macula marginali nigra.* — Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Grav. Mon. 9. 18. — Gyll. Ins. Suec. II. 241. 6. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 59. 6. Ins. Lappon. 55. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 291. 6. — Mannerh. Brachel. 60. 8. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 516. 6. — Runde Brachelytr. Hal. 25. 5. — Er. Col. March. I. 394. 12.

Habitat in Europa.

Antennae capitum thoracisque longitudine, apicem versus parum crassiores, fuscae, basi testacea. Palpi picei, articulis duobus primis flavo-testaceis. Caput mediocre, leviter convexum, laevissimum, nigrum, nitidum, ore concolore. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus haud prominentibus, obtusis, externe rotundatis, modice convexus, laevissimus, niger, nitidus, margine basali angustiore lateralique lato fusco-testaceo. Scutellum nigrum. Elytra thorace sesqui longiora, crebre subtiliter punctata, fusca, margine laterali nigra. Pectus et abdomen nigra, nitida, confertim subtiliter punctata. Pedes testacei, coxis anticis piceis.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Obs. *Tachyporo hypnorum* colore, licet obscuriore, affinis, differt autem statura minore, minus convexa, thoraceque coleopteris haud latiore.

*15. *T. scitulus*: *Niger, nitidus, thoracis margine laterali elytrorumque apicali rufo-piceis, antennarum basi pedibusque rufis, elytris thorace paulo longioribus*. — *Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Er. Col. March. I. 395. 13.

Tachyporus pusillus var. Grav. Mon. 9. 18.

Tachyporus pusillus var. b Gyll. Ins. Suec. II. 241. 6. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 59. 6. Ins. Lappon. 55. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 291. 6. — Mannerh. Brachelytr. 60. 8.

Habitat in Europa.

Statura T. pusilli, at paulo convexior, nitidus. Antennae capititis thoracisque fere longitudine, apicem versus parum incrassatae, fuscae, basi testaceae. Caput medioere, convexum, laevissimum, nigrum, ore concolore, oris partibus piceo-testaceis. Thorax coleopteris parum latior, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus haud prominulis, obtusis, externe rotundatis, modice transversim convexus, margine lateral i latiore summoque basali piceo-rufescens. Elytra thorace paulo longiora, subtilissime punctulata, tenuiter subtiliterque pubescentia, margine apicali piceo-rufescente. Abdomen crebre subtiliter punctatum, segmentis 2—5 saepius tenuiter rufo-marginatis. Pedes rufo-testacei, coxis anticis picescentibus.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Variat thoracis margine laterali et basali elytrorumque apicali laete rufo-testaceis.

Obs. T. pusillo similis, differt corpore paulo convextiore, elytrorum colore, et punctura parciora et subtiliore.

*16. *T. nanus*: *Niger, nitidus, ore, antennarum basi, elytrorum apice pedibusque rufis, thoracis margine piceo, elytris thorace longioribus, distinctius punctatis*. — *Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Habitat in Pennsylvania, Dom. Zimmermann.

Statura et summa affinitas praecedentis. Niger, nitidus. Antennae capititis thoracisque prope longitudine, graciles, apice paulo crassiores, piceo-rufae, basi testaceae. Caput mediocre, convexum, laevissimum, ore testaceo. Thorax coleopteris paululum latior, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus haud prominentibus, rotundatis, modice convexus, laevissimus, margine basali lateralique tenuiore piceo-rufescens. Elytra thorace tertia parte longiora, crebre minus subtiliter punctata, parce pubescentia, apice (tertia elytri parte) laete rufa. Abdomen parce subtiliter punctatum, segmentis singulis margine postico rufescens. Pedes rufo-testacei, coxis anticis femoribusque picescentibus.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis. Femina latet.

Obs. A. T. scitulus distinctus antennis brevioribus, dilutiobris, ore testaceo, elytris distinctius punctatis, apice latius rufis, etc.

*17. *T. transversalis*: *Niger, nitidus, thorace elytrisque rufis, antice dimidiato-nigris, pedibus testaceis*. — *Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Grav. Mon. 8. 17. — Er. Col. March. I. 395. 14.

T. ruficollis Gyll. Ins. Suec. II. 240. 5. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 58. 5. Ins. Lappon. 55. 6. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 291. 5. — Mannerh. Brachelytr. 59. 7. *T. dispar* var. ♂ Payk. Mon. Staph. 78. 54. Faun. Suec. III. 424. 69.

Habitat in Germania.

Statura T. pusilli. Antennae capititis thoracisque longitudine, apicem versus parum crassiores, ferrugineae, medio fuscescentes. Palpi testacei, articulo tertio fusco. Caput minusculum, leviter convexum, laevissimum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, modice convexus, angulis posterioribus haud prominentibus, rotundatis, satis convexus, laevissimus, testaceo-rufus, antice plerumque dimidiato-nigricans, nitidus. Scutellum nigrum. Elytra thorace paulo longiora, crebre subtiliter punctata, parce subtiliterque pubescentia, nitida, antice nigra, pone medium testaceo-rufa. Abdomen crebre subtiliter punctatum, nigrum, segmentis singulis margine postico late rufo. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei, coxis anticis concoloribus.

Mas tarsis anticis vix dilatatis, femina simplicibus.

*18. *T. brunneus*: *Rufo-testaceus, capite, thoracis disco pectoreque piceis, elytris thorace sesqui longioribus*. — *Long. 1 $\frac{1}{4}$ lin.*

Er. Col. March. I. 395. 15.

Oxyporus brunneus Fab. Ent. Syst. I. II. 535. 19. Syst. El. II. 607. 19. — Panz. Ent. Germ. 361. 15.

Staphyl nitidulus Oliv. Ent. III. 42. 34. 48 t. 3. f. 28.

Tachyporus nitidulus Grav. Micr. 126. 2. Mon. 11. 20. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 6. 2. — Gyll. Ins. Suec. II. 242. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 292. 7. — Mannerh. Brachelytr. 60. 9. — Botsd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 517. 7. — Runde Brachelytr. Ital. 25. 6.

Var.: *Totus testaceus*.

Tachyporus abdominalis Grav. Micr. 127. 3. Mon. 7. 15. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X. 6. 3.

Tachyporus scutellaris Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 517. 8.

Habitat in Europa; in Aegypto, Dom. Prof. Ehrenberg; in America septentrionali, Dom. Zimmermann.

Praecedentibus minor, angustior et minus convexus. Antennae capititis thoracisque longitudine, apice vix crassiores, totae testaceae. Caput minusculum, leviter convexum, laevissimum, piceum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, basi truncatus, angulis posterioribus haud prominentibus, obtusis, externe rotundatis, leviter convexus, laevissimus, testaceus, nitidus, disco piceo. Scutellum piceo-testaceum. Elytra thorace sesqui longiora, crebre subtilius punctata, tenuiter subtiliterque pubescentia, testacea, nitida. Abdomen crebre minus subtiliter punctatum, fusco-testaceum, segmentis singulis apice dilutiobris. Pectus piceum. Pedes flavo-testacei.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, femina simplicibus.

Variat capite, thoracis disco pectoreque testaceis concoloribus.

Species mihi invisa e.

19. *T. nigricornis*: *Nigro-piceus, nitidus, antennarum articulo ultimo, thoracis lateribus pedibusque posticis rufo-testaceis, elytris rufis, re-gione scutelli nigris.*

Gyll. Ins. Suec. IV. 469. 1 — 2.

Habitat in Vestrogothia.

T. chrysomelino et affinibus magnitudine, statura et partium formatione simillimus, colore antennarum et pedum anteriorum a reliquis praecipue distinctus. Caput nigrum, nitidissimum, glabrum, laeve, ore palpisque etiam nigris, pubescentibus. Antennae paulo breviores et validiores quam in affinibus, extrorsum crassiores, nigrae, articulo ultimo solo testaceo. Thorax amplius, nigro-brunneus, lateribus rufescens. Scutellum nigrum. Elytra rufo-testacea, circa scutellum nigricantia, et iuxta humerum litura fusca notata. Abdomen nigro-piceum, segmentorum marginibus dilutioribus. Corpus sub-tus nigro-piceum. Pedes quatuor anteriores nigro-picei, postici et tarsi ante-riores testacei. (Gyll.)

20. *T. obscurellus*: *Convexus, nitidus, laevis, glaber, niger, antennarum basi, thorace pedibusque anterioribus rufo-testaceis, elytris fuscis.* — Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Zetterst. Ins. Lappon. 54. 2.

Habitat in Lapponia Umensi rarius.

Similis *T. chrysomelino*, marginato, etc., colore ab illis tantum differt. Caput nigrum. Antennae fuscae, articulo primo testaceo. Thorax rufus. Elytra obscura s. fusco-rufa, margine summo apicali pallido. Abdomen nigrum. Pedes obscure rufo-testacei, femoribus posticis nigricantibus s. fuscis, tibialis eiusdem paris testaceis, tarsis pallidis. (Zetterst.)

Obs. Colore corporis cum *T. ruficollis* Gr. convenire videtur, at antennam et pedum posticorum colore differt.

21. *T. nigriceps*: *Latus, subconvexus, pallidus, capite nigro, ano infuscato.* Mannerh. *Brachelytr. 59. 5.*

Habitat in Fennia: ad Wilnäs semel captus.

T. abdominali duplo minor, capite nigro, postice transversim profun-dius impresso, et thorace elytris parum latiore diversus. (Mannerh.)

Obs. Species perquam dubia, forte castiganda.

Habrocerus Er.

Er. Col. March. I. p. 400.

Antennae 11-articulatae, capillares.

Palpi maxillares articulo quarto acuminato.

Ligula biloba, lobis truncatis.

Elytra pectore longiora.

Tarsi 5-articulati.

Corpus oblongum, leviter convexum, alatum. Caput thoraci insertum, rotundatum, convexum, deflexum, oculis mediocribus, rotundatis, modice pro-

minulis. Labrum subquadratum, apice leviter sinuatum. Mandibulae minu-tae. Maxillae (t. IV. f. 4. b.) mala interiore rhomboidea, externe coriacea, interne membranæ, apice breviter barbata, mala exteriore interne coriacea, externe et apice dilatato-rotundato barbata, membranæ. Palpi maxillares elongati, articulo primo minuto, secundo tertioque longitudine subaequalibus, hoc apicem versus sensim incrassato, quarto huic fere aequali, elongato-conico, acuminato. Labium (t. IV. f. 4. a.) mento transverso, ligula lata, truncata, medio incisa, membranæ, paraglossis ligulæ connatis, eique aequa-libus, non nisi linea ciliata indicatis. Palpi labiales ligulam vix superantes, articulo primo sat magno, cylindrico, secundo tertioque minutis, subaequa-libus, hoc apice truncato. Antennæ (t. IV. f. 4. c.) 11-articulatae, articu-lis duobus primis crassiunculis, reliquis tenuibus, verticillato-pilosellis. Tho-rax transversus, basi coleopterorum latitudine, antrorsum leviter angustatus, transversim convexus, basi truncatus, apice pro receptione capitis emarginatus, lateribus leviter rotundatis, angulis posterioribus obtusis, subrotunda-tis. Scutellum minutum, triangulare. Elytra thorace paulo longiora, angulo apicali exteriori oblique truncata. Abdomen marginatum, apicem versus sensim angustatum, apice depresso, segmentis sexto septimoque occultis. Mesosternum antice carinatum. Pedes breviusculi, coxis intermediis approx-imatis, posticis triangularibus, trochanteribus posticis maiusculis, tibiis omnibus subtilissime spinulosis, tarsis 5-articulatis, tenuibus, posterioribus articulo primo elongato, sequentibus tribus sensim longitudine decrescentibus, anticis in utroque sexu simplicibus.

Observationes.

1. Habitus corporis omnino Tachypori, at minus convexus. Caput et tho-rax laevissima glaberrimaque, hic margine parce pilosello, elytra punctulata, gla-bra, margine parce pilosello, abdomen subtiliter tenuiterque pubescens, lateribus et apice longius pilosellum.

2. Quodammodo intermedium videtur hoc genus inter Tachyporum et Ta-chinum, palporum maxillarium articulus tertius apice acutus ut in Tachyporo, at elongatus, et basi tertio crassitie aequalis, ut in Tachino; ab utroque praeterea notis pluribus discedit, praecipue antennarum abdominisque structura nec non coxis po-sticis triangularibus. Antennarum figura insolita cum Trichophyo convenit.

3. Mas abdominis segmento quinto inferiore apice leviter emarginato, sexto paululum eminulo, femina segmento quinto apice truncato, sexto omnino occulto distinguuntur.

- * 1. *H. capillaricornis*: *Nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque te-staceis.* — Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Er. Col. March. I. 401. 1.

Tachyporus capillaricornis Grav. Mon. 10. 19.

Habitat in Germania, in silvis, sub foliis deciduis, in Gallia, Mus. Dom. Dr. Aubé, in Sardinia, Dom. Prof. Gené.

Piceus vel nigro-piceus, nitidus, ore, antennis pedibusque testaceis, capite, thorace scutelloque glaberrimis, thorace apice punctis quatuor trans-versim positis, sat distinctis notato. Elytra obsolete parceque punctata, glabra. Abdomen confertim subtiliter punctatum, subtiliter pubescens, pi-losellum.

Tachinus Grav.*Tachinus Fam. I. Grav. Micr. I. p. 135.**Antennae 11-articulatae, filiformes.**Palpi maxillares filiformes.**Ligula biloba.**Elytra pectore longiora.**Tarsi 5-articulati.*

Corpus oblongum, magis minusve convexum, plerumque alatum. Caput thoraci insertum, fronte convexiuscula, antice angustata, oculis medicoribus rotundatis, leviter prominulis. Labrum transversum, apice leviter sinuatum. Mandibulae trigonae, obtusiusculae, intus membrana tenui, subtiliter ciliata fimbriatae. Maxillae (t. IV. f. 5. b.) malis basi subcorneis, apice membranis, interiore apice oblique truncato, exteriore rotundato barbatis, hac interiori aut aequali aut eam leviter superante. Palpi maxillares modice elongati, filiformes, articulo primo minuto, brevi, secundo tertio paulo longiore, quarto tertio vel paulo longiore, vel subaequali, apice acuminato. Labium (t. IV. f. 5. a.) mento transverso, ligula lata, medio incisa, lobis oblique introrsum truncatis, membranea, paraglossis ligulae omnino connatis eamque haud excedentibus, interne subtiliter ciliatis. Palpi labiales filiformes, articulo primo secundo paulo longiore, tertio praecedentibus haud tenuiore, primo longitudine aequali, apice subacuminato. Antennae filiformes, apice saepius leniter sensimque subincassatae, articulo ultimo ovato. Thorax transversus, basi coleopterorum latitudine, vel iis paulo latior, antrorsum angustatus, apice pro receptione capitis emarginatus, lateribus rotundatus, basi vel truncata vel utrinque leviter sinuata, coleopteris arcte applicata, angulis posterioribus saepe postice prominentibus, anterioribus acutiusculis. Scutellum rotundatum. Elytra sat magna. Abdomen marginatum, apicem versus sensim attenuatum. Pedes breviusculi, coxis posticis parallelolipedidis, ad femorum basin scutiformi-elevatis, tibiis omnibus spinulosis, tarsis 5-articulis, minus elongatis, articulis 4 primis longitudine sensim decessentibus.

Fam. I.*Mesosternum carinatum.**Tarsi antici in utroque sexu simplices.*

Statura Tachyptori, corpus saepius convexius, posterius attenuatum, antice obtuse rotundatum. Palpi maxillares articulo ultimo magis acuminato, nonnunquam conico, penultimo saepius haud longiore. Femora valida, compressa.

Mas abdominis segmento sexto superiore apice quadrifido, lacinis spiniformibus, intermediis longioribus, inferiore fisso, quinto inferiore pleurisque integro.

Femina segmento sexto superiore et inferiore apice quadrifidis, lacinis spiniformibus, aequalibus.

Observationes.

1. Corpus minutum, convexum, posterius valde attenuatum, capite, thorace elytrisque glaberrimus, abdome saepius tenuissime subtilissimeque pubescente, la-

teribus et apice parce pilosello. Scutellum magnum. Elytra convexa, lateribus subtiliter marginata, secundum marginem saepius longitudinaliter impressa, angulo apicali exteriore obtuso.

2. Habitus omnino Tachyptori, notas autem distinctivas praebent abdominis segmentum sextum alter constructum, mesosternum carinatum, tarsi antici in utroque sexu simplices, posteriores haud elongati, tibia breviores.

3. A Fam. altera haecce notis supra laudatis discedit, reliqui characteres sat exacte congruent, oris etiam structura, qua nonnisi palpis maxillaribus paululum magis acuminatis differt. Generi igitur peculiari condendo characteres aegre sufficient.

* 1. *T. silphoides*: *Niger, nitidus, thoracis limbo, elytrorum vitta submarginali, sutura apiceque pedibusque flavis*. — *Long. 1½ lin.*

Gyll. Ins. Suec. II. 267. 14. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 303. 13. — Mannerh. Brachelytr. 62. 13. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 513. 11. — Runde Brachelytr. Hal. 26. 6. — Er. Col. March. I. 396. 1.

Staphyl. silphoides Linn. *Syst. Nat. I. II. 684. 11. — Goeze Ent. Beitr. I. 719. 10. — De Vill. Ent. I. 414. 11. — Marsh. Ent. Britt. 521. 66.*

Oxyporus suturalis Panz. *Faun. Germ. 18. 20. Ent. Germ. 360. 7.*
Tachinus suturalis Grav. *Micr. 144. 15. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 397. 15.*

Tachyporus suturalis Grav. *Mon. 13. 22.*

Tachinus marginalis Grav. *Micr. 192. 4.*

Tachyporus marginalis Grav. *Mon. 13. 23.*

Tachyporus limbatus Grav. *Mon. 12. 21. (forte)*

Staph. dispar var. ζ Payk. *Mon. Staph. 79. 54.*

Staph. dispar var. ε Payk. *Faun. Suec. III. 424. 69.*

Habitat in Europa et in America septentrionali.

Statura omnino Tachyptori ruficollis, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apice haud crassiores, articulis 4 — 10 subobconicus, crassitie longioribus, ultimo oblongo, apice acuminato, ferrugineae, basi flavo-testaceae. Palpi testacei. Caput magnum, convexum, laevissimum. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine dimidio fere brevior, antrorsum parum angustatus, lateribus leviter rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, subrectis, sinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, subrectis, externe rotundatis, convexus, laevissimus, limbo laterali lato margineque tenui basali et apicali flavo-testaceus. Elytra thorace paulo longiora, modice convexa, angulo apicali exteriore oblique truncata, dense subtilissime punctulata, margine suturali et apicali vittaque submarginali, iam ante flavedinem abrupta, iam cum illa confluenta, flavo-testaceis. Abdomen dense subtiliter punctulatum, densius subtilissime pubescent, lateribus et apice nigro-pilo-testacei. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes sellum, subtus apice testaceum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes testacei.

Obs. 1. Elytra signaturis flavis iam angustioribus iam latioribus, ita ut nonnunquam evadant flavo-testacea, macula oblonga submarginali alteraque discoidali nigra, utraque cum nigridine baseos cohaerente.

2. *T. marginalis* Americanus cum *T. silphoides* Europaeo exacte convenit. *Tachyp. limbatus* Grav., quem solis palpis acuminatis differre afferet Grav., neque Tachyptori, neque speciem peculiarem esse mihi persuasum, quamvis a Dejeanio ipso idem Latreilliana collectionis specimen sub genere illo enumeratur.

3. Mas abdominis segmento inferiore quinto apice emarginato a reliquis huius sectionis speciebus discedit.

- * 2. *T. pictus*: *Niger, nitidus, pedibus, ano, thoracis limbo elytrisque flavis, his macula rotundata media nigra.* — *Long. 1½ lin.*

Habitat in Madagascar, Dom. Goudot.

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apice vix crassiores, articulis 3—10 subobconicis, crassitie longioribus, ultimo elongato, cylindrico, apice obtuse acuminato, nigrae, articulis duobus primis flavis. Palpi flavi, apice picei. Caput sat magnum, convexum, laevissimum, nigrum, nitidum. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine dimidio fere brevior, antrorsum parum angustatus, lateribus modice rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum parum prominentibus, rotundatis, modice transversim convexus, laevissimus, nitidissimus, niger, margine anteriore et posteriore tenui limboque lateralii lato flavis. Scutellum laeve, nigrum. Elytra thorace paulo longiora, modice convexa, angulo apicali exteriore oblique truncata, parcus subtilissime punctulata, nitida, flava, macula magna ovali media nigra, margine lateralii medio infuscata. Abdomen crebre subtiliter punctatum, densius subtilissime pubescens, lateribus et apice parce nigro-pilosellum, nigrum, apice lato testaceo. Pectus nigrum, mesosterno subtiliter carinato. Pedes flavi.

Obs. Differt constanter a praecedente praecipue elytrorum macula media antrorsum haud elongata, basi nigredine nulla tincta, margine lateralii medio solummodo infuscato, ano superne et inferne testaceo, elytris parcus punctulatis, thoracis angulis posterioribus paulo magis rotundatis. Sexus differentia omnino ut in illo.

- * 3. *T. piceus*: *Leviter convexus, piceus, nitidus, capite, thorace elytrisque laevissimis, antennarum basi pedibusque testaceis, thoracis margine elytrorumque limbo apicali rufescens, his thorace paulo longioribus.* — *Long. 1 lin.*

Habitat in ins. Puerto Rico, Dom. Moritz.

Sequenti affinis, leviter convexus, piceus, nitidus. Antennae capitis thoracisque fere longitudine, apice crassiores, articulis 2 et 3 elongatis, longitudine subaequalibus, 5—10 praecedentibus distinete crassioribus, aequalibus, transversis, ultimo subgloboso, nigro-piceae, articulis 4 primis dilute testaceis. Caput parum convexum, laevissimum, oris partibus testaceis. Thorax basi coleopterorum basi haud latior, latitudine baseos duplo brevior, basi utrinque late leviterque sinuatus, angulis posterioribus retrorsum parum prominulis, acutiusculis, externe rotundatis, modice convexus, laevissimus, piceus, margine basali lateralique dilutiore. Elytra thorace vix sesqui longiora, apicem versus sensim angustata, angulo apicali exteriore oblique truncata, secundum marginem lateralem vix impressa, laevissima, apice lato (ad dimidiad fere elytri partem usque) margineque lateralii testaceo-rufis. Abdomen confertim subtiliter punctulatum, dense subtiliter pubescens, apice piceum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei.

- * 4. *T. cinctellus*: *Convexusculus, nigro-piceus, nitidus, capite, thorace elytrisque laevissimis, antennarum basi apiceque pedibusque testaceis, thoracis elytrorumque margine lateralii apicalique piceis, his thorace plus sesqui longioribus.* — *Long. 1 lin.*

Habitat in Brasilia, Dom. Thorey.

Corpus parvum, convexusculum, piceo-nigrum, nitidum. Antennae

capitis thoracisque longitudine, apicem versus sensim subincrassatae, articulis 2 et 3 leviter elongatis, sequentibus sensim paulo brevioribus et paululum crassioribus, subobconicis, ultimo breviter ovato, apice abrupte acuminato, fusco-nigrae, articulis 4 primis ultimoque testaceis. Caput laevissimum, ore rufo-piceo. Thorax basi coleopterorum basi haud latior, latitudine baseos duplo brevior, antrorsum fortius angustatus, lateribus rotundatis, basi bisinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, latis, rotundatis, convexus, laevissimus, margine lateralii basalique indeterminate piceo-rufescens. Elytra thorace plus sesqui longiora, apicem versus sensim angustata, angulo apicali exteriore oblique truncata, secundum marginem lateralem leviter impressa, laevissima, apice (ad tertiam elytri partem usque) margineque tenui lateralii indeterminate piceo-rufis. Abdomen densius subtilissime pubescens, subtus apice piceum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei.

- * 5. *T. pulchellus*: *Leviter convexus, nigro-piceus, nitidus, capite thorace elytrisque laevissimis, pedibus, thoracis limbo, elytris postice margineque lateralii piceo-rufis, antennis basi testaceis.* — *Long. 1 lin.*

Var.: *Thorace elytrisque testaceis, illis disco his basi piceis.*

Habitat in Puerto Rico et in Columbia, Dom. Moritz.

Praecedentibus simillimus, modice convexus, nigro-piceus, nitidus. Antennae capitis thoracisque prope longitudine, apice paulo crassiores, articulis 2 et 3 elongatis, aequalibus, sequentibus sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo ovato, apice subacuminato, nigro-piceae, basi testaceae. Palpi rufo-testacei. Caput leviter convexum, laevissimum, ore dilutiore. Thorax basi coleopterorum basi haud latior, latitudine baseos duplo brevior, antrorsum fortiter angustatus, lateribus rotundatus, basi leviter bisinuatus, angulis posterioribus retrorsum parum prominentibus, rotundatis, modice convexus, limbo basali lateralique iam tenuiore iam latiore piceo-rufi. Elytra thorace sesqui longiora, apicem versus sensim angustata, angulo apicali exteriore oblique truncata, secundum marginem lateralem vix impressa, laevissima, apice lato (ad dimidiad fere elytri partem usque) margineque lateralii testaceo-rufis. Abdomen confertim subtiliter punctulatum, dense subtiliter pubescens, apice piceum. Mesosternum subtiliter at acute carinatum. Pedes testacei.

Variat thorace elytrisque testaceis, illo disco, his basi piceis, vel interdum totus testaceus, capite, thoracis disco elytrorumque basi paulo saturationibus.

- * 6. *T. nitidulus*: *Leviter convexus, nigro-piceus, nitidus, capite, thorace elytrisque laevissimis, capite, thorace, pedibus antennisque testaceis, elytris abdomineque apice rufescens.* — *Long. ¾ lin.*

Habitat in Puerto-Rico, Dom. Moritz.

Habitu omnino praecedentium, at paulo minor. Corpus leviter convexum. Antennae capitis thoracisque prope longitudine, apice paulo crassiores, articulis 2 et 3 elongatis, aequalibus, sequentibus sensim paulo brevioribus et crassioribus, penultimis crassitie sua brevioribus, ultimo breviter acuminato, testaceae, apice fuscae. Caput parum convexum, rufo-testa-

ceum, laevissimum. Thorax basi coleopterorum basi haud latior, latitudine baseos duplo brevior, antrorum fortiter angustatus, lateribus rotundatus, basi vix sinuatus, angulis posterioribus vix prominentibus rotundatis, leviter convexus, laevissimus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum nigro-piceum. Elytra thorace plus sesqui longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore obtuso, secundum marginem lateralem leviter impressa, laevissima, nitida, obscure fusco-picea, basi fere nigra, margine laterali apicalique indeterminate testaceo-rufescens. Abdomen subtiliter punctulatum, parce subtilissime pubescens, nigro-piceum, apice late testaceo-rufum. Pectus nigrum, mesosterno subtiliter carinato. Pedes rufo-testacei.

* 7. *T. convexus*: Convexus, piceo-niger, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris parce subtilissime punctatis, antennarum basi pedibusque rufis. — Long. 2 lin.

Habitat in Brasilia, Dom. Moritz.

Corpus convexus, nigro-piceum, nitidum. Antennae capite thoraceque paulo breviores, apice parum crassiores, articulis 2 et 3 leviter elongatis, sequentibus sensim paululum brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo ovato, fuscae, articulis tribus primis rufo-testaceis. Caput laevissimum fronte convexiuscula, ore rufo, palpis testaceis. Thorax basi coleopterorum basi latitudine aequalis, latitudine baseos duplo brevior, basi utrinque sinuatus, antrorum valde angustatus, lateribus fortiter rotundatus, angulis posterioribus postice leviter prominentibus, acutiusculis, acumine rotundato, valde convexus, laevissimus, margine basali lateralique summo piceo-rufescens. Elytra thorace sesqui prope longiora, apicem versus sensim leviter angustata, valde convexa, angulo apicali exteriore obtusiusculo, secundum marginem lateralem haud impressa, convexa, minus dense subtilissime punctata. Abdomen subtiliter punctulatum, parce subfilissime pubescens, piceum, apice segmentorumque singulorum margine postico rufescens. Mesosternum fortiter acuminatum, valde prominens. Pedes rufi.

* 8. *T. elatus*: Convexus, piceo-niger, nitidus, capite thoraceque laevissimis, hoc lateribus castaneo, elytris parce subtilissime punctatis, ore, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis. — Long. 2 lin.

Habitat Novae Valenciae in Columbia, Dom. Moritz.

Statura et summa similitudo praecedentis, fortius convexus, piceo-niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo breviores, tenuiores, apice vix incrassatae, articulo tertio secundo paulo longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus et paululum crassioribus, subobconicis, ultimo subovato, apice abrupte acuminato, nigrae, articulis tribus primis testaceis. Caput laevissimum, fronte parum convexa, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum basi haud, latitudine baseos duplo fere brevior, antrorum valde angustatus, lateribus fortiter rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, acutis, sat convexus, laevissimus, nitidus, dorso piceo-niger, margine lateralique indeterminate castaneo. Elytra thorace tertia fere parte longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore rotundato, secundum marginem lateralem haud impressa, valde convexa, parcus subtiliter punctata. Abdomen crebre

subtilius punctulatum, parce subtilissime pubescens, segmentis singulis rufo-marginatis. Mesosternum acute carinatum. Pedes rufi.

Obs. T convexo simillimus, at non adeo convexus et antennis in utroque sexu longioribus tenuioribusque, mesosterno minus prominenter carinato distinctus.

* 9. *T. hepaticus*: Convexus, piceo-castaneus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris vase subtilissime punctatis, antennis basi rufis, apice ferrugineis. — Long. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in Columbia, Dom. Moritz.

T. convexo dimidio minor et paulo minus convexus, piceo-castaneus, nitidus. Antennae capitis thoracisque fere longitudine, apice leviter crassiores, articulo tertio secundo paululum longiore et tenuiore, 4—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo oblongo, praecedentibus ambobus prope longiore, subcylindrico, apice abrupte acuminato, fuscae, articulis tribus primis rufo-testaceis, ultimo ferrugineo. Palpi rufo-testacei. Caput vix convexum, laevissimum, nigrum, ore rufo-piceo. Thorax basi coleopterorum basi vix latior, latitudine duplo brevior, antrorum fortiter angustatus, lateribus modice rotundatus, basi leviter sinuatus, angulis posterioribus retrorsum prominentibus, acutiusculis, acumine extrorsum rotundato, modice convexus, laevissimus. Elytra thorace vix tercia parte longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore obtuso, subrotundato, modice convexa, minus dense subtilissime punctata. Abdomen subtiliter punctulatum, omnium subtilissime parce pubescens. Mesosternum fortiter acuteque carinatum, modice prominens. Pedes rufo-testacei.

* 10. *T. brunneus*: Convexus, piceus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris vase subtilissime punctatis, antennarum basi pedibusque rufis. — Long. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in Columbia, Dom. Moritz.

Praecedenti affinis, at dimidio minor et paulo magis convexus. Antennae capite thoraceque breviores, tenuiores, apice leviter crassiores, articulo tertio secundo tenuiore at vix breviore, sequentibus sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo subovato, apice abrupte acuminato, fuscae, articulis tribus primis rufo-testaceis. Palpi rufo-testacei. Caput leviter convexum, laevissimum, nigro-piceum, ore rufo-piceo. Thorax basi coleopterorum basi paulo latior, latitudine vix duplo brevior, antrorum fortiter angustatus, lateribus fortius rotundatis, basi utrinque leviter sinuatus, posterioribus retrorsum leviter prominentibus, acutis, externe rotundatis, sat convexus, laevissimus, nitidus, saturate piceo-castaneus, dorso indeterminate piceo-nigro. Scutellum nigro-piceum, nitidum. Elytra thorace tercia fere parte longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore obtuso, secundum marginem lateralem vix impressa, convexa, minus confertim subtilissime punctata, saturate fusco-picea, nitida, margine lateralique apicalique summo castaneo. Abdomen subtiliter punctulatum, vix perspicie pubescens, piceum, nitidum, subtus apice late rufo-piceum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes testaceo-rufi.

Obs. Differt a praecedente statura minore, magis convexa, thorace paulo longiore, convexiore, antennis tenuioribus, apice haud ferrugineis, mesosterno subtiliter carinato, haud prominente.

* 11. *T. terminalis*: *Convexus, nigro-piceus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris crebre subtiliter punctatis, pedibus antennisque rufis, his apice ferrugineis.* — *Long. 1½ lin.*

Habitat in ins. Puerto Rico, Dom. Moritz.

Statura omnino praecedentis. Antennae capitum thoracisque prope longitudine, apice leviter crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore et tenuiore, sequentibus sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, ultimo praecedentibus ambobus longitudine subaequali, oblongo-ovato, apice abrupte acuminato, piceo-rufae, articulis tribus primis rufo-testaceis, ultimo flavo-testaceo. Palpi rufo-testacei. Caput leviter convexum, laevissimum, piceo-nigrum, nitidum, ore piceo-sabrufo. Thorax basi coleopterorum basi paulo latior, latitudine duplo fere brevior, antrorsum fortiter angustatus, lateribus modice rotundatus, basi utrinque sinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, acutiusculis, externe rotundatis, convexus, laevissimus, nigro-piceus, marginibus dilutioribus. Scutellum nigro-piceum. Elytra thorace tertia fere parte longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore obtuso, secundum marginem lateralem obsolete impressa, convexa, densius subtiliter punctata, nigro-picea, nitida, marginibus dilutioribus, parce subtilissime brevissimeque pubescens. Abdomen parcus subtiliter punctulatum, piceum, subtus apicem versus rufescens. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes testaceo-rufi.

Obs. Praecedentibus admodum affinis, elytris autem crebrius minusque subtiliter punctatis distinctus.

* 12. *T. apicalis*: *Convexusculus, nigro-piceus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris subtilissime punctatis, pedibus antennarumque basi testaceis, his articulo apicali flavo.* — *Long. 1 lin.*

Habitat in ins. Puerto Rico, Dom. Moritz.

Statura omnino *T. picei* et vix paululum maior, praecedente plus diuidio minor, modice convexus, piceo-niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo breviores, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulo tertio secundo tenuiore et paulo longiore, sequentibus sensim brevioribus et paulo crassioribus, penultimus transversis, ultimo breviter ovato, apice acuminato, nigrae, articulis 4 primis testaceis, ultimo flavo. Caput maiuscum, fronte parum convexa, ore dilute testaceo. Thorax basi coleopteris vix latior, latitudine triplo prope brevior, antrorsum fortius angustatus, lateribus leviter rotundatis, basi truncatus, angulis posterioribus haud prominulis, acumine summo rotundatis, laevissimus, margine summo laterali brunneo. Elytra thorace duplo prope longiora, apicem versus sensim angustata, angulis posterioribus obtusiusculis, secundum marginem lateralem haud impressa, omnium subtilissime punctulata. Abdomen parce omnium subtilissime punctulatum, vix pubescens, apice rufescens. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes dilute testacei.

Obs. Differt a praecedente statura multo minore, elytris omnium subtilissime, vix perspicue punctulatis etc. a *T. piceo* capite maiore, antennarum articulo ultimo flavo, elytris subtilissime punctulatis.

* 13. *T. humilis*: *Parum convexus, nigro-piceus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris subtilissime punctulatis, ore testaceo, antennarum basi pedibusque rufis.* — *Long. 1½ lin.*

Habitat in Brasilia, Dom. Prof. Germar.

Corpus leviter convexum, nigro-piceum, nitidum. Antennae capitum thoracisque longitudine, crassiusculae, apice sensim crassiores, articulo tertio secundo evidenter longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, ultimo oblongo, praecedentibus ambobus longitudine aequali, apice sat fortiter acuminato, fuscae, articulis tribus primis rufis. Caput parum convexum, laevissimum, ore testaceo. Thorax basi coleopteris parum latior, latitudine plus duplo brevior, antrorsum fortiter angustatus, lateribus modice rotundatus, basi utrinque vix sinuatus, angulis posterioribus retrorsum haud prominulis, acumine summo rotundatis, leviter transversim convexus, laevissimus, nigro-piceus, marginibus dilutioribus. Elytra thorace duplo prope longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore obtusiusculo, secundum marginem lateralem canaliculata, subtilissime punctulata. Abdomen subtilissime punctulatum, vage tenuissime subtilissimeque pubescens. Pedes testaceo-rufi.

Obs. Distinctus a praecedentibus statura minus convexa thoraceque breviore, basi vix sinuato, angulis posterioribus postice haud prominentibus.

14. *T. brevicollis*: *Subdepressus, nigro-piceus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris omnium subtilissime punctulatis, abdomine evidenter punctato, antennarum basi pedibusque testaceis.* — *Long. 1½ lin.*

Habitat Novae Valenciae in Columbia, Dom. Moritz.

Statura et summa affinitas praecedentis, perparum convexus, nigro-piceus, nitidus. Antennae capitum thoracisque prope longitudine, apicem versus leviter incrassatae, articulo tertio secundo paululum longiore, 4 — 10 sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, ultimo ovato, apice abrupte acuminato, nigrae, articulis tribus primis testaceis. Oris partes testaceae. Caput laevissimum, fronte parum convexa. Thorax basi coleopteris parum latior, latitudine baseos triplo fere brevior, antrorsum fortiter angustatus, lateribus leviter rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis posterioribus retrorsum prominentibus, externe rotundatis, leviter transversim convexus, laevissimus, nigro-piceus, marginibus rufescens. Elytra thorace plus sesqui longiora, apicem versus sensim leviter attenuata, angulo apicali exteriore obtusiusculo, secundum marginem lateralem canaliculata, subtilissime parcus punctulata. Abdomen crebre distinque licet sat subtiliter punctulatum, tenuissime subtilissimeque pubescens, apice piceo-testaceum. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei.

Obs. *T. humili* proximus, abdome autem crebre evidenter punctato satis differt.

* 15. *T. depresso*: *Subdepressus, niger, nitidus, capite, thorace elytrisque confertim subtiliter punctatis, his piceo-castaneis, antennarum basi pedibusque testaceis.* — *Long. 1¾ lin.*

Habitat in Columbia, Dom. Moritz.

Corpus parum convexum, nigrum, nitidum. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apice vix crassiores, articulo secundo tertioque aequalibus,

sequentibus sensim paulo brevioribus, at vix crassioribus, ultimo oblongo-ovato, apice abrupte acuminato, fusco-nigrae, articulo primo toto, secundo tertioque basi testaceis. Palpi testacei. Caput parum convexum, subtilissime punctulatum. Thorax basi coleopterorum basi vix latior, latitudine plus duplo brevior, antrorum fortiter angustatus, lateribus leviter rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus, angulis posterioribus retrorsum modice prominentibus, acutiusculis, externe rotundatis, parum convexus vel subdepressus, confertim subtiliter punctulatus, margine postico piceo-pellucente. Elytra thorace sesqui longiora, apicem versus sensim subangustata, angulo apicali exteriore oblique truncato, subdepressa, secundum marginem lateralem longitudinaliter leviter impressa, confertim subtiliter punctulata, piceo-castanea, nitida, lateribus nigra. Abdomen crebre subtiliter punctatum, tenuissime subtilissimeque pubescens, segmentis ultimis duobus apice piceo-castaneis. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei.

* 16. *T. melanarius*: *Parum convexus, niger, nitidus, antennarum basi pedibusque rufo-piceis, capite thoraceque subtilissime punctulatis, elytris confertim subtiliter punctatis*. — *Long. 1 lin.*

Habitat in Bengala, Dom. Hope.

T. gibbula minor et multo minus convexus, fere subdepressus, niger, nitidus. Antennae capitidis thoracisque prope longitudine, apice vix crassiores, articulo secundo tertioque aequalibus, obconicis, sequentibus inter se subaequalibus, leviter compressis, ultimo paulo maiore, subovato, compresso, apice abrupte acuminato, nigricantes, basi piceae. Caput parum convexum, subtilissime punctulatum, oris partibus piceis. Thorax basi coleopterorum basi latitudine aequalis, apice duplo angustior, latitudine baseos duplo brevior, lateribus sat fortiter rotundatus, basi leviter bisinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, acutis, leviter transversim convexus, subtilissime punctulatus, margine baseos summo rufescente. Scutellum subtiliter punctulatum. Elytra thorace plus sesqui longiora, apicem versus sensim subangustata, angulo apicali exteriore oblique truncato, parum convexa, nigra, nitida, confertim subtiliter punctata, secundum marginem lateralem canaliculata, margine apicali summo piceo-rufescente. Abdomen crebre subtiliter punctulatum, segmentis anterioribus apice piceo-marginatis, subtus apice rufo-piceum. Pedes rufo-picei.

* 17. *T. gibbulus*: *Convexus, piceo-niger, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris confertim subtiliter punctatis, ore antennis pedibusque rufis*. — *Long. 1½ lin.*

Habitat in America septentrionali, Dom. Zimmermann. Nomine Tachypori gibbuli etiam a Com. Dejean communicatus.

Corpus convexum, nigrum, nitidum. Antennae capitidis thoracisque prope longitudine, apice sensim crassiores, articulo tertio secundo tenuiore et prope breviore, 3—5 obconicis, sensim brevioribus et crassioribus, 6—10 sensim magis transversis, ultimo breviter ovato, apice acuminato, totae rufae. Caput leviter convexum, laevissimum, ore cum palpis rufo-testaceo. Thorax basi coleopterorum basi parum latior, latitudine duplo brevior, antrorum fortiter angustatus, lateribus fortiter rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus,

angulis posterioribus retrorsum modice prominentibus, acutiusculis, externe rotundatis, fortins convexus, laevissimus, margine postico lateralique piceo-pellucente. Elytra thorace sesqui longiora, apicem versus sensim subangustata, angulo apicali exteriore subrecto, secundum marginem lateralem longitudinaliter modice impressa, crebrius subtiliter punctata, margine laterali et apicali indeterminate rufo-piceis. Abdomen subtilissime punctulatum, vix pubescens, segmentis singulis margine apicali piceo. Pedes testaceo-rufi.

* 18. *T. rutilus*: *Leviter convexus, rufus, nitidus, capite thoraceque laevissimis, elytris parcis subtiliter punctatis*. — *Long. 1½ lin.*

Habitat in Americae ins. Puerto Rico et St. Thomae, in Columbia, Dom. Moritz.

Statura omnino *T. gibbuli*, totus testaceo-rufus, nitidus. Antennae capitidis thoracisque prope longitudine, apicem versus leniter crassiores, articulo tertio secundo tenuiore et paulo breviore, 4—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo crassiore, subovato, apice abrupte acuminato, testaceo, medio fuscescentes. Caput laevissimum. Thorax basi coleopteris paulo latior, latitudine duplo brevior, antrorum fortiter angustatus, lateribus modice rotundatus, utrinque leviter sinuatus, angulis posterioribus retrorsum leviter prominentibus, rotundatis, satis convexus, laevissimus. Elytra thorace sesqui longiora, apicem versus sensim leviter angustata, angulo apicali exteriore obtusinculo, secundum marginem lateralem medio impressa, parcis subtiliter obsoleteque punctata. Abdomen subtiliter punctulatum, tenuissime subtilissimeque pubescens. Mesosternum subtiliter carinatum. Pedes rufo-testacei.

Fam. II.

Mesosternum simplex.

Tarsi antici maris dilatati.

Corpus plerumque maius, magis oblongum et minus convexum. Palpi maxillares articulo ultimo subcylindrico, apice acuminato, saepius penultimo duplo longiore. Mesosternum simplex. Tarsi posteriores articulis duabus primis subaequalibus.

Mas tarsis anticis articulis 3 primis dilatatis, abdominis segmento superiore sexto apice 4-dentato, inferiore incisione profunda bifido, lobis acuminatis, saepius compressis, septimo conspicuo, quinto inferiore apice magis minusve emarginato.

Femina tarsis anticis simplicibus, abdominis segmento sexto superiore vel trifido vel quadrifido, laciinis lateralibus profundius divisis, inferiore apice 6-fido, laciinis intermediis duabus obtusioribus, apice setulis rigidis fulvis ciliatis, reliquis acuminatis, lateralibus brevioribus, nisi segmento fortiter exerto observandis, intermediis 4 longitudine subaequalibus.

Observationes.

1. Caput, thorax et elytra magis minusve subtiliter, saepius subtilissime punctata, interstutiis nonnunquam omnium subtilissime alutaceis, glaberrima, abdomen omnium subtilissime tenuissimeque pubescens, pube omnium brevissima, apice vix unquam pilosellum. Scutellum mediocre. Elytra lateribus subtiliter marginata, angulo apicali exteriore subrotundata.

2. Dom. Prof. Gravenhorst primo secundum palporum structuram *Tachinum a Tachyporo* distinxit, dein corporis habitum magis respiciens, *Boletobium et Mycetoporum* sub hoc nomine coniunxit, quod auctores recentiores generi nostri restituerunt. Habitu generali, coxarum posticarum et ligulae figura magis ad *Tachyporum* accedit, palporum autem et tarsorum structura facile distinguitur.

3. Victor plerisque in fimo. Europae et Americae septentrionalis regionibus temperatis et frigidis huius sectiones species propriae videntur, intra tropos etiam in Europa australi vix obviae.

* 19. *T. rufipes*: Convexus, piceo-niger, nitidus, antennarum basi pedibusque rufis, elytris thorace sesqui longioribus, puncto humerali margineque apicali picescentibus. — Long. 3 lin.

Er. Col. March I. 397. 2.

Staphyl rufipes Degeer. Ins. IV. 24. 11. t. 1. f. 14. — Fab. Syst. Ent. 267. 17. Spec. Ins. I. 337. 22. Mant. Ins. 222. 31. — Payk. Mon. Staph. 75. 53. Faun. Suec. III. 418. 65. — Walk. Faun. Paris. I. 273. 20.

Staph. rufipes Schrank Fauna Boica I. 644. 874. (forte)

Oxy porous rufipes Fab. Ent. Syst. I. II. 235. 21. Syst. El. II. 607. 21. — Cederh. Faun. Ingr. 121. 372. — Panz. Ent. Germ. 361. 16.

Oxy porous rufipes Panz. Faun. Germ. 27. 20. (male)

Tachinus pullus Grav. Micr. 140. 6. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 395. 6. — Gyll. Ins. Suec. II. 262. 10. IV. 472. 10. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 62. 4. Ins. Lappon. 57. 4. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 299. 8. — Mannerh. Brachelytr. 61. 8.

Tachyporus pullus Grav. Mon. 16. 30.

Tachinus signatus Grav. Micr. 139. 5. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 395. 5. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 508. 3.

Tachyporus signatus Grav. Mon. 17. 32.

Var. a: Thoracis limbo laterali elytrisque castaneo-testaceis, his dorso subinfuscatis. (Minus maturus.)

Tachinus laticollis Gyll. Ins. Suec. IV. 471. 5—6. — Sahlb. Ins. Fenn. 297. 4. — Mannerh. Brachelytr. 61. 5. (forte.)

Var. b: Rufo-testaceus, capite thoracisque disco fusco-piceis. (Immaturus.)

Tachinus pallens Gyll. Ins. Suec. II. 259. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 298. 6.

Habitat in Europa.

Piceo-niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo longiores, gracieles, apice vix crassiores, articulo tertio secundo paululum longiore, 5—10 elongato-obconicis, subaequalibus, ultimo oblongo-ovato, subacuminato, apice compresso, nigri-picei, articulo primo rufo-testaceo, sequentibus tribus rufo-piceis. Palpi rufo-picei. Caput convexum, omnium subtilissime punctulatum, ore concolore. Thorax coleopteris latior, latitudine baseos quarta parte brevior, antrosum modice angustatus, apice profundius emarginatus, lateribus fortiter rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus modice prominentibus posterioribusque obtusis, subrotundatis, convexus, omnium subtilissime punctulatus, niger, nitidus, margine summo lateralique saepe piceo. Scutellum parce punctatum, nigrum. Elytra thorace vix sesqui longiora, confertissime subtilissimeque alutaceo-strigosa, subtiliter vase punctulata, nigro-picea, puncto humerali margineque summo apicali dilutioribus. Abdomen distinctius licet subtiliter crebrius punctatum, pube brevissima subtilissimaque

adspersum, nigrum, segmentis singulis margine summo apicali rufo-piceo. Pedes rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus acutis, fere spiniformibus, intermediis magis prominentibus, segmentis inferioribus 3—5 subimpressis, quinto apice leviter triangulariter emarginato, margine intra sinum spongioso, sexto bifido, laciinis vix elongatis, compressis, leviter curvatis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto trifido, laciinis interme- diis longioribus, spiniformibus, intermedio lato apice lanceolato-acuminato.

Obs. *T. pallens* Gyllenh. secundum exemplum a Dom. Schüppel communica- tum, ab autore ipso missum, ad *T. humerale* quidem pertineat, licet specimi- nibus genuinis minor, descriptio Gyllenhalii autem potius huic speciei adaptanda mihi videtur, praecipue ob caput et thoracem multo subtilius punctata.

* 20. *T. flavigipes*: Piceo-niger, pedibus elytrisque brunneo-ferrugineis, his thorace sesqui longioribus, dorso plerumque infuscatis, antennis basi nigricantibus. — Long. 3 lin.

Er. Col. March. I. 398. 3.

Oxy porous flavigipes Fab. Syst. Ent. 268. 3. Spec. Ins. I. 339. 5. Mant. Ins. I. 222. 6. Ent. Syst. I. II. 534. 14. Syst. El. II. 606. 13. — Panz. Ent. Germ. 360. 11. *Staphyl rufipes* Marsh. Ent. Britt. 518. 60.

Tachinus rufipes Grav. Micr. 137. 4. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 294. 4. Gen. Crust. et Ins. I. 299. 1. — Gyll. Ins. Suec. II. 260. 9. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 62. 3. Ins. Lappon. 57. 3. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 298. 7. — Mannerh. Brachelytr. 61. 7. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 507. 2. — Runde Brachelytr. Hal. 26. 3.

Tachyporus rufipes Grav. Mon. 17. 15.

Var. Thoracis limbo laterali latiore castaneo-testaceo.

Tachinus castaneus Grav. Micr. 140. 7. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 395. 7.

Tachyporus fimetarius var. Grav. Mon. p. 15.

Tachyporus rufipes? Grav. Mon. p. 18.

Tachinus dubius Gyll. Ins. Suec. II. 258. 6. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 298. 5. — Mannerh. Brachelytr. 61. 6. — Runde Brachelytr. Hal. 25. 2.

Habitat in Europa.

Statura fere *T. rufipes*, at minus convexus. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice paulo crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 subobconicis, sensim paululum brevioribus, penultimis crassitie subbrevioribus, ultimo breviter ovato, apice compresso, piceae, basi nigricantes. Palpi nigro-picei. Caput confertim subtiliter punctulatum, nigrum, ore concolore. Thorax coleopteris vix latior, latitudine baseos tertia parte brevior, antrosum leviter angustatus, apice late et parum profunde emarginatus, basi truncatus, angulis anterioribus leviter prominentibus posterioribusque rotundatis, parum convexus, confertim subtiliter punctatus, nitidus, niger, limbo tenui basali lateralique testaceo. Scutellum piceum, subtiliter punctulatum. Elytra thorace plus sesqui longiora, confertim subtiliter punctata, castaneo-testacea, dorso magis minusve infuscato, praecipue in femina. Abdomen minus confertim subtiliter punctatum, pube brevissima subtilissima que adspersum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine summo apicali

piceo-testaceo. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei, femoribus basi non-nunquam picescentibus.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus acutiusculis, intermediis multo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice leviter emarginato, margine intra sinum spongioso, sexto profunde inciso, lacinii triangularibus, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto trifido, lacinii longitidine aequalibus, lateralibus spiniformibus, intermedia latiore, sensim angustata, acute acuminata.

Variat thoracis limbo laterali latius testaceo, elytris dorso haud aut parum infuscatis. Feminae semper obscuriores.

Obs. I. Differt a T. rufipede antennis basi nigricantibus, statura minus convexa, capite, thorace elytrisque distinctius punctatis.

2. *Tachinus intricatus* Sahlb. Ins. Fenn. I. 300. 9. absque dubio ad hanc speciem pertinet: elytrorum sculptura „punctis in lineolas confuse intricatas aliquatenus ordinatis” certe fortuita.

* 21. *T. frigidus*: *Niger, nitidus, antennarum basi, palpis, pedibus thoracisque limbo laterali rufo-ferrugineis, elytris thorace sesqui longioribus, piceis, puncto humerali marginaque apicali ferrugineis.* — Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in ins. Unalaschka, Dom. v. Chamisso.

Niger, nitidus. Antennae capitum thoracisque longitidine, apicem versus sensim leviter incrassatae, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo ovali, acuminato, apice compresso, fuscae, basi rufae, articulo primo dilutiore. Palpi toti rufo-testacei. Caput subtiliter punctatum. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, antrorsum leviter angustatus, apice profundius emarginatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus leviter prominentibus posterioribusque subrotundatis, modice convexus, confertim subtiliter punctatus, margine postico lateralique latiore testaceo. Scutellum subtilissime punctulatum, nigrum. Elytra thorace sesqui longiora, dense subtilius punctata, vel nigro-vel rufo-picea, puncto humerali marginaque apicali ferrugineis. Abdomen distinctius punctatum, pube parca subtilissima brevissimaque adspersum, ano subtus rufo-piceo. Pedes testacei.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus acutiusculis, intermediis fortiter prominentibus; segmentis inferioribus 3—5 subimpressis, quinto apice leviter emarginato, margine intra sinum spongioso, sexto bifido, lacinii minus elongatis, compressis, modice curvatis, acuminatis.

Femina latet.

Obs. Affinis *T. pallipedi*, *rufipedi* et *flavipedi*, ab hoc antennis basi rufis, ab illis statura minus convexa et capite thoraceque crebre evidentius punctatis distinctus.

* 22. *T. humeralis*: *Niger, nitidus, antennarum basi, pedibus thoracisque limbo rufo-ferrugineis, elytris thorace plus sesqui longioribus, rufo-ferrugineis, dorso magis minusve fuscescentibus.* — Long. $3\frac{1}{3}$ lin.

Grav. Micr. 130. 3. var. 2. 3. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 394. 3.

— Zetterst. Faun. Lappon. I. 62. 2. Ins. Lappon. 56. 2. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 296. 3. — Mannerh. Brachelytr. 61. 4. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 507. 1. — Runde Brachelytr. Hal. 25. 1.

Tachyporus humeralis Grav. Mon. 19. 36.

Tachinus humeralis var. b Gyll. Ins. Suec. II. 257. 5.

Staphyl. cinctus Marsh. Ent. Britt. 519. 61.

Habitat in Europa.

T. rufipede maior, latrior et minus convexus. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apice parum crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 aequalibus, obconicis, ultimo fusiformi, nigro-fuscae, basi rufae. Palpi rufi. Caput crebre subtiliter punctatum, nigrum, nitidum. Thorax coleopteris vix latrior, latitudine baseos dimidio brevior, antrorsum modice angustatus, apice minus profunde emarginatus, lateribus rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis anterioribus leviter prominentibus posterioribusque subrotundatis, leviter convexus, crebre subtiliter punctatus, nitidus, disco nigro, limbo antico posticoque angustioribus lateralique latiore rufo-ferrugineis. Elytra thorace duplo prope longiora, confertim subtiliter punctata, nitidula, ferruginea, dorso magis minusve infuscata. Abdomen crebre distinctius punctatum, pube subtilissima brevissimaque parcus adspersum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine postico piceo. Pectus nigrum, nitidum. Pedes dilute rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus omnibus obtusis, subrotundatis, intermediis magis prominentibus; segmento inferiore quinto medio late impresso, apice emarginato, margine intra sinum retuso et spongioso, sexto bifido, lacinii modice elongatis, compressis, acuminatis, parum curvatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto trifido, lacinii lateralibus paulo longioribus, spiniformibus, intermedia lata, apice triangulariter acuminata.

* 23 *T. picipes*: *Piceo-niger, nitidus, ore antennarumque basi rufis, pedibus piceis, elytris thorace sesqui longioribus.* — Long. $3\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in America septentrionali, Dom. Zimmermann.

Habitu omnino *T. rufipedis*, at duplo maior, *T. fimbriati* minoribus individuis aequalis, piceo-niger, nitidus, capite, thorace, scutello elytrisque omnium confertissime subtilissimeque alutaceo-strigosis. Antennae capite thoraceque paulo breviores, crassiusculae, articulo tertio secundo duplo prope longiore, 5—10 crassioribus, crassitie aequalibus, sensim paulo brevioribus, penultimis fere transversis, ultimo ovato, apice compresso, nigrae, articulis 4 primis rufis, ultimo ferrugineo. Caput subtilissime punctulatum, ore rufo. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos tertia parte brevior, antrorsum modice angustatus, apice minus profunde emarginatus, lateribus modice rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus, angulis anterioribus leviter prominentibus, subrotundatis, posterioribus subrectis, modice convexus, minus confertim subtilissime punctulatus, margines versus nonnunquam picescens. Scutellum piceum, laeve. Elytra thorace plus sesqui longiora, vase subtiliter punctata. Abdomen crebre subtiliter punctatum. Pedes picei, antici rufescentes, posteriores nigricantes.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus lateribus obtusiusculis, intermediis parum magis prominentibus, acutis; segmento inferiore quinto late at parum profunde triangulariter impresso, apice emarginato et utrinque obtuse bidentato, sexto bifido, laciñis modice elongatis, gracilioribus, compressis, leviter curvatis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto quadrifido, laciñis longitudine aequalibus, acuminatis, intermediis vix ad segmenti medium usque divisis.

Variat immaturus corpore testaceo, capite obscuriore.

* 24. *T. memnonius*: *Nigro-piceus, opacus, ore, antennarum basi pedibusque rufis, thorax limbo elytrorumque puncto humerali rufo-piceis, his thorace plus sesqui longioribus*. — Long. 3 lin.

Tachinus memnonius Grav. Micr. 192. 3. (Mus.)

Tachyporus memnonius Grav. Mon. 17. 31.

Tachinus batychrous Grav. Micr. 191. 1. (Fem.)

Tachyporus batychrous Grav. Mon. 20. 37.

Habitat in America septentrionali.

Statura omnino T. flavipedis, nigro- aut fusco-piceus, opacus, capite, thorace, scutello elytrisque omnium confertissime subtilissimeque alutaceo-strigosis. Antennae capitum thoracisque prope longitudine, extrorsum paululum crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 longitudine subaequalibus, at sensim paululum crassioribus, obconicis, ultimo subovato, apice acuminato, fuscae, articulis 4 primis rufis. Caput impunctatum, nigrum, ore late rufo. Thorax coleopteris vix latior, latitudine baseos dimidio brevior, antrorsum modice angustatus, apice leviter emarginatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus leviter prominentibus, rotundatis, posterioribus obtusis, subrotundatis, parum convexus, parce obsoleteque subtilissime punctatus, margine omni piceo-rufescente. Elytra thorace duplo prope longiora, subtilissime vase punctata, opaca, macula maiore minoreve humerali, saepe obsoleta, marginaque summo apicali rufo-piceis. Abdomen distinctius crebre punctatum, parce subtilissime brevissimeque pubescens, segmentis singulis margine postico piceo-rufescente. Pedes testaceo-rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto acute quadridentato, dentibus intermediis longioribus et magis prominentibus; segmento inferiore quinto late triangulariter impresso, impressione spongiosa, apice late profundius emarginato, intra sinum utrinque setis rigidis densis vel contiguis, deorsum curvatis, ciliato, sexto bifido, laciñis elongatis, validis, compressis, curvatis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto trifido, laciñis laterali bus paulo longioribus, linearibus, intermedia latiore, canaliculata, apice bifida, laciñis valde acuminatis.

* 25. *T. fimbriatus*: *Niger, nitidus, pedibus piceis, ore antennarumque basi rufis, elytris substrato-punctatis, castaneis, apice nigro-marginalis*. — Long. 4 lin.

Grav. Micr. 191. 2. — Mannerh. Brachelytr. 60. 1.

Tachyporus fimbriatus Grav. Mon. 17. 34.

Habitat in America septentrionali.

Habitu omnino T. humeralis, at duplo maior, niger, nitidus. Antennae capitum thoracisque prope longitudine, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, 5—10 aequalibus, subobconicis, crassitie haud brevioribus, ultimo subovato, apice compresso, nigricantes, articulis 4 primis rufis, ultimo apice ferrugineo. Caput subtiliter punctulatum, interstitiis confertissime subtiliter alutaceis, ore rufo, mandibulis piceis. Thorax coleoptera latitudine vix superans, latitudine baseos tercia parte brevior, antrorsum leviter angustatus, basi leviter emarginatus, lateribus modice rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus, angulis anterioribus parum antrorsum prominentibus posterioribusque obtusis, modice convexus, confertissime subtilissimeque alutaceus, vase subtilissime obsoleteque punctulatus. Elytra thorace sesqui longiora, subtilissime confertissimeque alutacea, distincte subseriatim punctata, dilute castanea, nitida, margine apicali nigricante. Abdomen crebre distinctius punctatum. Pedes rufo-picei, femoribus obscurioribus.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus omnibus acutis, intermediis magis prominentibus segmento inferiore quinto apice profundius emarginato, sexto bifido, laciñis longioribus, validis, compressis, parum curvatis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto trifido, laciñis laterali bus spiniformibus, intermedia his breviore, apice acute emarginata, bicuspi.

Variat minus maturus thoracis margine laterali rufescente, elytris apice concoloribus, vel totus dilute castaneus, fronte nigricante.

* 26. *T. subterraneus*: *Niger, nitidus, antennarum basi elytrorumque macula humerali oblonga rufo-testaceis, pedibus piceis*. — Long. 3 lin.

Grav. Micr. 135. 1. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 393. 1. — Gyll. Ins. Suec. II. 252. 2. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 295. 1. — Mannerh. Brachelytr. 60. 2. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 510. 6.

Staph. subterraneus Linn. Faun. Suec. n. 849. Syst. Nat. I. II. 684. 12. — Müll. Prodr. 98. 1111. — Goeze Ent. Beitr. I. 719. 12. — De Vill. Ent. I. 414. 12. — Payk. Mon. Staph. 73. 52. Faun. Suec. III. 420. 66. — Marsh. Ent. Britt. 518. 59.

Oxyporus subterraneus Fab. Ent. Syst. I. II. 532. 4. Syst. El. II. 605. 4.

Tachyporus subterraneus Grav. Mon. 21. 40.

Var. Thoracis lateribus elytrisque rufo-testaceis, his sutura marginaque apicali nigris.

Oxyporus marginatus Fab. Ent. Syst. I. II. 532. 6. Syst. El. II. 605. 6.

Tachinus marginatus Gyll. Ins. Suec. II. 255. 4.

Tachyporus bicolor Grav. Mon. 17. 33.

Tachinus biplagiatus Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 511. 7.

Staphyl. latus Marsh. Ent. Britt. 524. 76.

Habitat in Europa.

Corpus parum convexum, nigrum, nitidum. Antennae capitum thoracisque longitudine, articulo secundo tertioque subaequalibus, 5—10 subobconicis, inter se aequalibus, ultimo oblongo-ovato, cinereo-pubescentes, nigricantes, articulis 4 primis rufo-testaceis, glabris. Palpi rufo-picei. Caput crebre subtiliter punctulatum, ore concolore. Thorax basi coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, antrorsum leviter angustatus,

apice profundius emarginatus, angulis anterioribus subrotundatis, lateribus rotundatus, basi recte truncatus, angulis posterioribus obtusiusculis, leviter convexus, subtilissime alutaceus, crebre subtiliter punctulatus, margine laterali saepe rufescente. Elytra thorace duplo longiora, subtilissime alutacea, subtiliter punctulata, macula magna oblonga, prope marginem exteriorem ab humero ultra medium descendente, satis determinata, rufo-testacea. Abdomen crebre profundius punctulatum, segmentis singulis margine apicali rufo-piceis. Pedes iam rufo-, iam fusco-picei.

Mas abdominis segmento superiore sexto apice quadridentato, dentibus omnibus obtusis, intermediis magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice emarginato, utrinque spina valida, apice bifida, lacinia interiore muricata, armato, intra sinum late impresso, sexto bifido, lacinii validis, compressis, deorsum curvatis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto apice quadrisido, laciniis lateralibus validis, linearibus, intermediis his multo brevioribus et tenuioribus, spiniformibus.

Variat elytrorum macula dilatata: nonnunquam elytra tota rufo-testacea, sutura margineque laterali exceptis.

* 27. *T. bipustulatus*: *Nigro-piceus, antennis, pedibus, thoracis limbo maculaque transversali baseos elytrorum rufis.* — *Long. 3 lin.*

Grav. Micr. 135. 2. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 394. 2.* — *Gyll. Ins. Suec. II. 254. 3.* — *Mannerh. Brachelytr. 61. 3.*

Oxyporus bipustulatus Fab. Ent. Syst. I. II. 533. 9. Syst. El. II. 606. 9. — *Panz. Faun. Germ. 16. 21. Ent. Germ. 369. 5.* — *Cederh. Faun. Ingr. 120. 370.*

Tachyporus bipustulatus Grav. Mon. 21. 39.
Staph. subterraneus var. *Payk. Faun. Suec. III. 420. 66. not.*

Habitat in Europa.

Corpus modice convexum, nigro-piceum, nitidum. Antennae capite thoraceque breviores, extrorsum crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, articulis 5 — 10 sensim paululum brevioribus, ultimo ovato, compresso, totae rufae. Palpi rufi. Caput subtilissime punctulatum, fronte utrinque leviter impressa, nigrum, ore concolore. Thorax basi coleoptera latitudine vix superans, latitudine baseos paulo brevior, apice emarginatus, lateribus rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis anterioribus antrorsum leviter prominentibus posterioribusque rotundatis, modice convexus, omnium subtilissime confertissimeque alutaceus, crebre subtilissime punctulatus, nigro-piceus, limbo omni indeterminate rufescente. Elytra thorace plus sesqui longiora, confertissime subtilissimeque alutacea, crebre subtiliter punctata, nigro-picea, macula magna basali transversa indeterminata rufa. Abdomen distinctius crebreque punctatum, pube subtili brevissima cinerea adspersum, segmentis omnibus margine postico rufo-piceis. Pedes rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus acutiusculis, intermediis multo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice late profundi emarginato, sexto bifido, laciniis breviusculis, validis, compressis, leviter curvatis, acutiusculis.

Femina abdominis segmento superiore sexto quadrisido, laciniis late-

ralibus validioribus, linearibus, intermediis his parum brevioribus, tenuibus, spiniformibus, acutis, inter se ad segmenti medium usque divisis.

Obs. *Oxyporum bipustulatum* Fab. potius ad *Conurum bipustulatum* quam ad hanc speciem pertinere autumat Gyllenhal. (Ins. Suec. II. p. 225.) Equidem autem insectum modo descriptum sub hoc nomine in collectione Fabriciana vidi, quare hoc synonymum indubie attuli.

* 28. *T. pallipes*: *Niger, nitidus, antennarum basi, pedibus thoracisque limbo laterali rufo-ferrugineis, elytris thorace paulo longioribus, nigro-piceis, puncto humerali margineque apicali rufescentibus.* — *Long. 3 lin.*

Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 508. 4.

Tachyporus pallipes Grav. Mon. 20. 38.

Tachinus humeralis var. 1 *Grav. Micr. 130. 3.*

Tachinus humeralis var. a *Gyll. Ins. Suec. II. 256. 5.*

Habitat Lutetiae et in Hercyniae, Austriae Uralensibusque montibus.

Statura omnino *T. rufipedis*, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apice paulo crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5 — 10 subobconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo subovato, articulo primo rufo-testaceo, reliquis piceis. Palpi picei, basi testacei. Caput omnium subtilissime punctulatum, ore concolore. Thorax coleopteris vix latior, latitudine baseos tercia parte brevior, antrorsum leviter angustatus, apice late emarginatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus leviter prominentibus posterioribusque rotundatis, convexus, omnium subtilissime punctatus, margine anteriore posterioreque tenui obscurius, laterali latiore distinctoque testaceis. Scutellum parvum, laeve, nigro-piceum. Elytra thorace sesqui longiora, subtiliter punctulata, nigro-picea, nitida, puncto humerali margineque apicali dilutioribus, rufo-piceis. Abdomen distinctius licet subtiliter punctatum, pube brevissima subtilissimaque adspersum. Pedes rufo-testacei.

Mas abdominis segmento superiore sexto acute quadridentato, dentibus intermediis multo magis prominentibus; segmentis inferioribus 3 — 5 medio leviter impressis, quinto apice late at minus profunde emarginato, sexto bifido, laciniis minus elongatis, parum curvatis, apice compressis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto quadrisido, laciniis acuminatis, spiniformibus, intermediis acutissimis, ad segmenti medium usque divisis.

Variat elytrorum macula basali transversali indeterminata testacea, pedibus pallidioribus, et minus maturus elytris ferrugineis, dorso posterius infuscato.

Obs. 1. Ab affinibus facile distinguitur femina segmento abdominis subquadrisido.

2. A Gyllenhalio cum *T. humeralis* mare confusus, quod ex eius descriptione patet: exemplum etiam femineum *T. pallipennis* pro *T. humeralis* mare a Schönherro missum in collectione Dom. Prof. Germar exstat.

* 29. *T. axillaris*: *Piceo-niger, nitidus, antennarum basi, pedibus thoracisque limbo rufo-testaceis, elytris thorace sesqui longioribus, macula humerali summoque margine apicali rufis.* — *Long. 2³/4 lin.*

Habitat in America septentrionali, Dom. Zimmermann.

Statura omnino *T. flavidipes*, at paulo minor, piceo-niger, nitidus. Antennae capite thoracisque fere longiores, apice paulo crassiores, articulo secundo sesqui longiore, 5—10 crassioribus, subobconicis, inter se subaequalibus, ultimo oblongo-ovato, compresso, nigrae, articulis duobus primis rufis. Palpi nigro-picei. Caput omnium subtilissime punctulatum, ore concolore. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos dimidio brevior, antrorsum leviter angustatus, apice leviter emarginatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus parum prominentibus posterioribusque rotundatis, leviter convexus, omnium subtilissime alutaceus, crebre subtilissime punctatus, margine basali apicalique tenui lateralique latiore castaneo-testaceo. Scutellum piceum. Elytra thorace sesqui longiora, omnium subtilissime alutacea, crebre subtiliter punctata, nigro-vel brunneopicea, macula humerali indeterminata, saepius per totam basin extensa, margineque summo apicali rufis. Abdomen crebre subtilius punctatum, segmentis singulis margine postico rufo. Pedes rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus lateribus acutiusculis, intermediis valde prominentibus, acutis, prope spiniformibus; segmento inferiore quarto leviter triangulariter impresso, quinto apice profundi emarginato, secundum totam longitudinem late et parum profunde impresso, sexto bifido, laciinis longioribus validioribusque, leviter curvatis, acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto quadrisido, laciinis omnibus aequalibus, spiniformibus.

*30. *T. basalis*: *Niger, nitidus, antennarum basi pedibusque rufis, elytris thorace paulo longioribus, basi rufis.* — Long. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in montibus Uralensibus, Dom. Prof. Eversmann.

Statura fere *T. marginelli* et maioribus eius individuis aequalis, niger, nitidus. Antennae capitis thoracisque longitudine, extrorsum crassiores, articulis 2 et 3 aequalibus, 5—10 leviter obconicis, sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo crassiunculo, ovato, piceae, articulis 4 primis rufo-testaceis. Palpi rufo-picei. Caput laeve, parce omnium subtilissime punctulatum, ore concolore. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine dimidio brevior, apice leviter emarginatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus leviter prominentibus, obtusiusculis, posterioribus rotundatis, leviter convexus, parcus obsolete subtiliterque punctatus. Scutellum piceum. Elytra thorace longiora, fortius crebre punctata, nitida, fusco-picea, basi indeterminate castaneo-rufa. Abdomen parce subtiliter punctatum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine apicali rufo-piceo. Pedes dilute rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus omnibus acutiusculis, intermediis multo magis productis, approximatis; segmento inferiore quinto late leviter emarginato, sexto profunde inciso, laciinis acuminatis, externe unidentatis.

Femina latet.

*31. *T. marginellus*: *Nigro-piceus, nitidus, antennarum basi, pedibus, thoracisque limbo castaneo-testaceis, elytris thorace sesqui longioribus, nigro-piceis, vitta intramarginali margineque apicali dilutioribus.* — Long. 1 $\frac{1}{2}$ — 2 lin.

Grav. Micr. 143. 14. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins.* IX. 397. 14. — *Gyll. Ins. Suec.* II. 265. 12. — *Zetterst. Faun. Lappon.* I. 63. 6. *Ins. Lappon.* 57. 6. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 301. 11. — *Mannerh. Brachelytr.* 62. 11. — *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 512. 9. — *Runde Brachelytr.* Hal. 26. 5. — *Er. Col. March.* I. 399. 5.

Staphyl. marginellus Fab. *Spec. Ins.* I. 337. 20. *Mant. Ins.* I. 221. 27. — *Oxyporus marginellus* Fab. *Ent. Syst.* I. II. 536. 23. *Syst. El.* II. 607. 23. — *Panz. Faun. Germ.* 9. 13. *Ent. Germ.* 361. 18.

Tachyporus marginellus Grav. Mon. 13. 27. — *Tachinus laticollis* Grav. Micr. 141. 10. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins.* IX. 396. 10. — *Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris.* I. 509. 5.

Tachyporus laticollis Grav. Mon. 15. 29.

Staphylin. laevigatus Marsh. *Ent. Britt.* 519. 62.

Tachinus intermedius Mannerh. *Brachelytr.* 62. 9.

Staphyl. rufipes var. β Payk. *Mon. Staph.* 76. 53.

Staphyl. rufipes var. 2 Payk. *Faun. Suec.* III. 419. 65.

Staphyl. rufipes var. 1 Walk. *Faun. Paris.* I. 273. 20.

Staphyl. marginatus Fourcier. *Ent. Par.* I. 169. 18.

Le Staph. à étuis bordés de jaune Geaffr. *Hist. Ins.* I. 168. 19.

Var. Testaceus, capite thoracisque disco fuscis (immaturus).

Tachinus immaturus Grav. Micr. 142. 12. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins.* IX. 396. 12.

Tachyporus immaturus Grav. 13. 25.

Habitat in Europa.

Habitu omnino *rufo-piceus*, at triplo fere minor. Antennae capite thoracisque paulo longiores, apice parum crassiores, articulo tertio secundo perparum longiore, 5—10 subobconicis, sensim paulo brevioribus, ultimo oblongo, subovato, nigro-piceae, basi rufae, articulo primo rufo-testaceo. Palpi picei. Caput subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, ore concolore. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos tercia parte brevior, antrorsum modice angustatus, apice profundius emarginatus, lateribus fortius rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus modice prominentibus posterioribusque obtusis, convexus, dense subtiliter punctatus, niger, nitidus, limbo lateral i latiore posticoque tenui testacei. Scutellum nigrum, subtilissime punctulatum. Elytra thorace sesqui longiora, dense minus subtiliter punctata, obscure brunneo-picea, vitta intramarginali, interdum obsoleta, margineque apicali testacei. Abdomen minus dense subtiliter punctatum, pubescentia grisea adpersum, piceo-nigrum, nitidum, segmentis singulis margine postico rufo-piceo. Pedes rufo-testacei.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus omnibus valde acutis, intermediis paulo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice profunde sinuato, margine intra sinum late spongioso, sexto profundo inciso, laciinis triangularibus, apice fortiter acuminatis seu mucronatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto quadrisido, laciinis omnibus spiniformibus, acuminatis, intermediis paulo brevioribus tenuioribusque.

Obs. Oxy. marginellus Panz., a Gravenhorstio ad T. humerale relatus, ob magnitudinem minorem potius ad hanc speciem pertinere videtur, et quidem ad individua obscuriora, elytrorum vitta intramarginali obsoleta. T. laticollis nonnisi statura paulo maiore, thorace lateribus magis rotundato eiusque limbo lateralí minus determinato a T. marginello genuino differt.

*32. *T. fimetarius*: *Niger, nitidus, pedibus, thoracis limbo elytrisque castaneo-testaceis, his dorso plerumque infuscatis, antennis nigris.* — *Long. 2 lin.*

Grav. Micr. 141. 9. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 396. 9. — Gyll. Ins. Suec. II. 263. 11. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 63. 5. Ins. Lappon. 57. 5. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 300. 10. — Mannerh. Brachelytr. 62. 10. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 511. 8. — Runde Brachelytr. Hal. 26. 4. — Er. Col. March. I. 398. 4.

Tachyporus fimetarius Grav. Mon. 14. 28.

Tachinus sordidus Grav. Micr. 141. 8. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 395. 8.*

Staphyl. fuscipes Panz. Ent. Germ. 356. 28. *Faun. Germ. 27. 12.*

Spec. intermed. inter T. laticolle et fimetarium: *Grav. Mon. p. 15.*

Habitat in Europa.

Habitu omnino T. flavipedis, at duplo minor. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice vix crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 elongato-obconicis, subaequalibus, ultimo elongato, fusiformi, acuminato, totae nigrae. Palpi nigro-picei. Caput laeve, nigrum, nitidum, ore concolore. Thorax coleopterorum latitudine, latitudine baseos quarta fere parte brevior, antrorum modice angustatus, apice leviter emarginatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus parum prominentibus posterioribusque rotundatis, leviter transversim convexus, laevis, niger, nitidus, limbo antico posticoque tenuibus lateralique latoe castaneo-testaceis. Scutellum piceum, laeve. Elytra thorace plus sesqui longiora, parce subtiliter punctulata, castaneo-testacea, nitidula, dorso magis minusve infuscata. Abdomen nigrum, nitidum, parcius subtiliter punctulatum, pube parca brevissima subtilissimaque adspersum. Pectus nigrum, nitidum. Pedes testacei.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus longitudinali subaequalibus, acutis, lateralibus fere spiniformibus; segmento inferiore quinto apice medio profunde sinuato, sinu utrinque denticulo acuto terminato, sexto profunde inciso, lacinii triangularibus, fortiter acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto apice quadrifido, lacinii subaequalibus, fortiter acuminatis.

Obs. T. flavipedi habitu et colore similis, differt autem statura duplo minore, capite thoracisque impunctatis, abdominisque in utroque sexu structura. — *T. castaneus* Grav. secundum specimina typica ad T. flavipedem pertinet.

*33. *T. collaris*: *Dense punctatus, nigro-piceus, antennis, pedibus thoracisque rufis, hoc disco plerumque infuscato.* — *Long. 1½—1¾ lin.*

Grav. Micr. 133. 13. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 397. 13. — Gyll. Ins. Suec. II. 266. 13. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 302. 12. — Mannerh. Brachelytr. 62. 12. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 512. 10. — Er. Col. March. I. 400. 6.

Tachyporus collaris Grav. Mon. 13. 24.

Var. Pallidus, immaturus.

Tachinus corticinus Grav. Micr. 131. 11. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 396. 11.*

Tachyporus corticinus Grav. Mon. 13. 16.

Tachinus flavellus Zetterst. Faun. Lappon. I. 64. 7. Ins. Lappon. I. 57. 7. (forte) Habitat in Europa.

Statura fere T. marginelli. Antennae capite thoracisque paulo longiores, apice paulo crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 obconicis, longitudine subaequalibus, at sensim paulo crassioribus, ultimo oblongo, apice acuminato et subcompresso, rufae, apicem versus obscuriores. Palpi picei. Caput crebre subtiliter punctatum, nigrum, nitidum, ore concolore. Thorax coleopteris paulo latior, latitudine baseos dimidio brevior, antrorum modice angustatus, apice profundius emarginatus, lateribus rotundatus, basi utrinque subsinuatus, angulis anterioribus modice prominentibus, rotundatis, posterioribus subrectis, externe rotundatis, convexus, dense subtilius punctatus, piceo-rufus, disco saepius infuscato. Scutellum piceum. Elytra thorace sesqui longiora, dense minus subtiliter punctata, iam fuscoiam rufo-picea, nitida. Abdomen parcius subtiliter punctatum, pube subtilissima brevissimaque adspersum, nigrum, nitidum, segmentis singulis marginé postico piceo. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus breviusculis, intermediis multo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice fortiter triangulariter exciso, sexto inciso, lacinii triangularibus, apice acuminatis, fere mucronatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto apice quadrifido, lacinii subaequalibus, acuminatis.

*34. *T. elongatus*: *Elongatus, nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque rufis, elytris subtiliter substriato-punctatis, margine apicali rufescente.* — *Long. 3½ lin.*

Gyll. Ins. Suec. II. 251. 1. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 61. 1. Ins. Lappon. 56. 1.

Habitat in Suecia, Dom. Schüppel, in Helvetia, Dom. Guyot, in Una-laschka, Dom. Chamisso.

Statura elongata, linearis, fere subcylindrica a congeneribus discedens, piceo-niger, subnitidus. Antennae capitis thoracisque longitudine, crassiusculae, articulo tertio secundo sesqui longiore, 5—10 sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, ultimo subovato, apice abrupte compresso, totae rufae. Palpi rufi. Caput omnium subtilissime parce punctulatum. Thorax coleopteris vix latior, latitudine baseos quarta parte brevior, antrorum parum angustatus, apice profundius emarginatus, lateribus leviter rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus modice prominentibus, acutiusculis, acume rotundato, posterioribus rotundatis, transversim convexus, omnium subtilissime parce punctulatus. Elytra thorace vix sesqui longiora, subseriatim subtilius punctata, nigro-picea, margine apicali rufescente. Abdomen parallelum, subtiliter punctatum, versus latera tenuiter griseo-pubescentis, segmentis piceo-marginatis. Pedes rufi.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus minutis, intermediis paulo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice late profundeque emarginato, sexto bifido, lacinii validis, elongatis, compres-sis, fortius deorsum curvatis, apice acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto apice quadrifido, laci-niis subaequalibus, acuminatis.

Variat thorace elytrisque rufo-piceis.

*35. *T. discoideus*: *Nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque rufis, elytris fortius punctatis, rufis, margine omni piceo.* — *Long. 1 $\frac{1}{3}$ lin.*

Habitat in Austria.

Antennae capitii thoracisque fere longitudine, validiusculae, apicem versus leviter incrassatae, articulo 2 et 3 subaequalibus, 5—10 longitudine subaequalibus at sensim paulo crassioribus, ultimo oblongo-ovato, apice acuminato, totae rufo-testaceae. Caput parvum, parcus subtiliter punctatum, nigro-piceum, nitidum, ore rufo-testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, latitudine baseos quarta fere parte brevior, antrorum leviter angustatus, apice profundius emarginatus, lateribus leviter rotundatus, basi truncatus, angulis anterioribus modece prominentibus, leviter deflexis posterioribusque obtusis subrotundatis, parum convexus, parce vaseque subtiliter punctatus, iam nigro- iam rufo-piceus, nitidus. Scutellum laeve, piceum. Elytra thorace sesqui prope longiora, crebre fortiusque punctata, punctis hinc inde subseriatis, nitida, disco laete rufo, limbo omni piceo. Abdomen minus subtiliter punctulatum, nigro-piceum, segmentis singulis margine apicali rufo-piceo. Pectus nigrum, nitidum. Pedes rufo-testacei.

Mas abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus minutis, intermediis fortius prominentibus; segmento inferiore quinto apice leviter triangulariter emarginato, sexto profunde inciso, lobis triangularibus, apice acuminatis.

Femina abdominis segmento superiore sexto apice quadrifido, laci-niis subaequalibus, acuminatis.

Species mihi invisa:

36. *T. rufipennis*: *Niger, nitidus, glaber, antennis basi rufo-piceis, elytris profunde punctatis, rufis, apice nigro-marginatis, tarsis ferrugineis.*

Gyll. Ins. Suec. II. 259. 8.

Habitat in Suecia stercoreatis rarius.

Statura omnino *T. humeralis*, sed adhuc paulo maior, et vere distinctus. Caput rotundatum, nigrum, nitidissimum, subtiliter punctulatum, linea tenui angulata inter antenas impressum; os et palpi nigro-picei. Antennae thorace paulo longiores, nigro-fuscae, basi rufo-piceae. Thorax latus, transversus, fere ut in *T. humerali*, antice tamen profundius emarginatus, supra valde convexus, subtilissime punctulatus, totus niger, nitidissimus. Scutellum triangulare, rufo-piceum, subtiliter punctulatum. Elytra thorace multo angustiora, sed fere duplo longiora, apice truncata, angulis ut in prioribus, supra convexa, crebre et sat profunde vase punctata, saturate rufa, nitida, margine postico late nigra, nigredine iuxta marginem lateralem altius adscendente, sutura etiam anguste nigra. Abdomen pone elytra illarum longitudine, convexum, totum nigrum, nitidum, crebre punctatum; anus secundum sexum ut in *T. rufipede* armatus. Corpus totum subtus nigrum, nitidum,

profunde punctatum. Pedes elongati, nigri, nitidi, spinulis tibiarum tar-sisque ferrugineis. (Gyll.)

Trichophyus Er.

Er. Col. March. I. p. 402.

Trichophya Mannerh. *Brachelytr.* p. 73.

Antennae 11-articulatae, capillares.

Palpi maxillares filiformes.

Ligula apice emarginata, paraglossis distinctioribus, ligula duplo brevioribus.

Elytra pectori longitudine aequalia.

Tarsi 5-articulati.

Corpus oblongum, subdepressum, alatum. Caput deflexum, thorace mi-nus et angustius, subtriangulare, oculis parvis, rotundatis, prominulis. Labrum transversum, apice rotundatum. Mandibulae muticæ, margine interno limbo membraneo fimbriato. Maxillæ (t. IV. f. 8. b.) mala utraque leviter elongata, lineari, membranacea, longitudine altera alteri subaequali, exteriore apice barbata, interiore apice leviter uncinata, dein spinulis tribus minutis armata, margine interiore medio barbato. Palpi maxillares sat elongati, articulo secundo elongato, tertio quartoque singulis hoc paulo brevioribus, inter se subaequalibus, quarto apice acuminato. Labium (t. IV. f. 8. a.) mento transverso, ligula angustata, prominula, apice emarginata, paraglossis ligulae connatis, et eadem brevioribus. Palpi labiales biarticulati, articulo secundo parvo, acuminato. Antennæ longitudine dimidi corporis, articulo primo secundoque crassiusculis, primo clavato, secundo subgloboso, sequen-tibus valde tenuibus, sensim angustioribus, pilis longis verticillatis undique adspersis.*). Thorax coleopterorum prope latitudine, antrorum haud an-gustatus, parum convexus. Scutellum triangulare. Elytra pectus haud excedentia. Abdomen apicem versus subangustatum. Pedes breves, intermedii basi approximati, coxae posticae triangulares, tibiae pubescentes, tarsi omnes 5-articulati, antici articulis 4 primis leviter dilatatis, posteriores articulo primo leviter elongato.

Observationes.

1. Genus admodum distinctum, statura autem minus convexa, thorace minus amplio, capite magis exerto, huic tribui quodammodo alienum videtur. Aleocharis adscribi nequit, antennæ enim infra oculos sub capitii margine laterali insertæ, pal-porum maxillarum articulus ultimus haud subulatus, et tarsi antici dilatati. Quibus notis cum Tachyporinæ congruit: oris autem structura in Trichophyo singularis, Aleocharorum genera postrema in animum revocans. Palpi labiales perbreves bi-ariculati mihi videntur.

2. Antennarum structura singulari cum Habrocerô satit quidem convenit, reliquis autem characteribus omnibus discedit.

3. Sexus differentia latet.

4. Victus sub arborum emortuarum cortice, sec. Gyll. Specimen nostrum in foro lignario volitans captum est.

5. Nomen generis, huic tribui adscripti, aliquantum mutavi, quoniam omnia Tachyporinorum nomina masculina sunt.

*) Antennæ in nostro specimine mutilatae, quare earum descriptionem secun-dum Gyllenhalium supplevi.

1. *T. pilicornis*: *Niger, punctatus, pubescens, elytris fuscis, pedibus fusco-testaceis*. — *Long. 1½ lin.*

Er. Col. March. I. 403. 1.

Trichophya pilicornis Mannerh. *Brachelytr. 73. 1.*

Aleochara pilicornis Gyll. *Ins. Suec. II. 417. 39.*

Habitat in Germania, Suecia.

Caput crebrius punctatum, nigrum, nitidum, ore fusco, oris partibus antennarumque articulis primis rufo-testaceis. Thorax latitudine plus sesqui brevior, lateribus rotundatus, basin versus non minus quam antrorum angustior, basi leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, apice leviter emarginatus, supra parum convexus, lateribus basique planiusculis, confertim punctatus, tenuiter griseo-pubescentia, fusco-niger, nitidus. Elytra thorace sesqui longiora, apice oblique introrsum truncata, dense punctata, tenuius pubescentia, fusca, opaca. Abdomen pectusque dense punctata, tenuiter pubescentia, nigra, ano fusco. Pedes testacei.

Boletobius Leach.

Mannerh. *Brachelytr. p. 64.*

Megacronus Steph. *Illustr. V. p. 165 et Boletobius ibid. p. 171.*

Bryocaris Boisd. et Lacord. *Faun. Ent. Paris. I. p. 502 et Boletobius ibid. p. 497.*

Antennae 11-articulatae, filiformes.

Palpi maxillares filiformes.

Ligula apice emarginata.

Elytra pectori subaequalia.

Tarsi 5-articulati.

Corpus elongatum, utrinque attenuatum et deorsum curvatum, alatum. Caput thoraci immissum, deflexum, aliis breviuseculum, aliis oblongum vel elongatum, oculis mediocribus, ovalibus, vix prominulis. Labrum aliis transversum, aliis (capite elongato) quadratum, apice truncatum. Mandibulæ minores, apice falcatæ, acutæ, interne basi membrana fimbriatae. Maxillæ (t. IV. f. 6. b.) malis coriaceis, interiore interne, exteriore apice ciliatis. Palpi maxillares leviter elongati, articulo primo minuto obconico, secundo tertio vel subaequalibus, vel secundo paulo longiore, apicem versus leviter incrassatis, quarto praecedenti aequali vel eodem paulo longiore, plurimis cylindrico, apice obtuse acuminato. Labium (t. IV. f. 6. a.) mento transverso, parte membranacea ante palporum basin elongata, ligula rotunda, medio incisa, membranea, paraglossis ligulae multo brevioribus, eique connatis et nonnisi linea ciliata distingendis. Palpi labiales articulis duobus primis subaequalibus, tertio paulo longiore, apice obtuse acuminato. Antennæ utrinque infra oculos insertæ, filiformes, apicem versus plerumque leniter incrassatae. Thorax basi fere coleopterorum latitudine, apicem versus angustatus, latitudine parum brevior, lateribus rotundatus, basi truncatus, apice pro receptione capitis emarginatus, lateribus, praecipue anterius, deflexis. Scutellum triangulare. Elytra apice truncata. Abdomen apicem versus sensim attenuatum, deorsum curvatum. Mesosternum haud carinatum. Pedes graciliores, coxis intermediis valde approximatis, posticis amplis, parallelipedis, scutatis, femoribus saepius apice obsolete setosis,

tibiis omnibus spinulosis, spinis terminalibus validioribus, tarsis 5-articulatis, elongatis, gracilioribus, posterioribus articulo primo elongato, sequentibus sensim decrementibus, ultimo iterum longiore.

Observationes.

1. Corpore graciliore, incurvo, elytris coxas posticas vix superantibus, his parallelipedis, amplis, ut in *Mordellis* scutatis, pedibus etiam ut in hac familia constructis a praecedentibus discedens, summa affinitate cum genere sequenteungit.

2. Caput laevissimum; thorax laevissimus, ad margines punctis paucis, interdum etiam dorso punctorum pari impressus; scutellum laeve; elytra plerisque punctorum seriebus tribus ordinariis notata, intima striae leviter exaratae suturali, extima striae tenui marginali impositis, intermedia discoidali; abdomine punctato.

3. *Megacronus* Steph. nonnisi capite minus elongato et antennis minus gracilibus, *Bryocaris* Boisd. et Lacord. nonnisi tarsis anticis in mare dilatatis distinguuntur. Distinctio illa omnino arbitraria, haec temeraria; tarsi enim dilatati simplices vix unquam in tota Staphylinorum familia characterem genericum praebent, speciebus inter se maxime affinis saepius hac nota discrepantibus.

4. Sexus differentia varia, apud singulas species notanda.

5. Victus in silvis, in boletis et sub muscis et foliis deciduis.

* 1. *B. analis*: *Niger, nitidus, pedibus cum coxis anticis, antennis articulis 4 primis ultimoque testaceis, ano elytrisque rufis*. — *Long. 2½ — 3 lin.*

Mannerh. *Brachelytr. 64. 3. — Runde Brachelytr. Ital. 26. 1. — Er. Col. March. I. 403. 1.*

Staphyl. analis Payk. Mon. Staph. 47. 34. Faun. Suec. III. 394. 34. — Walk. Faun. Paris. I. 272. 17. — Oliv. Ent. III. 42. 28. 38. t. 3. f. 24. — Marsh. Ent. Britt. 522. 70.

Tachinus analis Grav. Mon. 148. 20. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 399. 20. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 303. 14. — Zetterst. Ins. Lappon. 58. 8.

Tachinus analis var. 2 Grav. Mon. 31. 16.

Tachinus analis var. b Gyll. Ins. Suec. IV. 472. 13.

Staph. analis Schrank Faun. Boica. I. 649. 890. (forte)

Var. Thorace elytris anoque testaceo-rufis.

Staph. analis var. β Payk. Mon. Staph. 47. 34. Faun. Suec. III. 395. 34.

Tachinus merdarius Gyll. Ins. Suec. II. 270. 16. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 304. 15.

Habitat in Europa.

Niger, nitidus. Antennæ capite thoraceque paulo longiores, apicem versus sensim leniterque subincrassatae, articulo tertio secundo sesqui longiore, 5 — 10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, fuscae, articulis 4 primis ultimoque testaceis, hoc maris oblongo, cylindrico, apice obtuse rotundato, praecedente plus duplo maiore, feminae ovato, praecedente sesqui maiore. Caput parvum, laevissimum, ore late testaceo. Thorax coleopterorum prope latitudine, latitudine baseos parum brevior, lateribus rotundatus, antice paulo magis quam postice angustatus, basi leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusissimis, fere rotundatis, satis convexus, laevissimus. Scutellum laevissimum. Elytra thorace tertia parte longiora, rufa, nitida, seriebus tribus ordinariis punctorum remotorum. Abdomen parce punctatum, parceque longius pubescens, segmento ultimo penultimoque rufis, hoc basi nigro. Pedes testacei, antici coxis concoloribus.

Mas tarsis anticis leviter dilatatis, abdominis segmento inferiore sexto apice medio leviter triangulariter producto, antennarum articulo ultimo praecedentibus tribus coniunctis subaequali.

Femina tarsis anticis simplicibus, abdominis segmento inferiore sexto apice rotundato, antennarum articulo ultimo praecedentibus ambobus vix aequali.

Obs. *Tach. merdarius* Gyll. nonnisi thorace rufo differt, quare vix pro specie peculiari rite habendus: differentiae a Gyllenhalio notatae ad sequentem speciem spectant. Specimina Suecica dedit Dom. Schüppel.

* 2. *B. cingulatus*: *Niger, nitidus, antennis articulis 3 primis ultimisque duobus pedibusque testaceis, his coxis anticis nigris, ano elytrisque rufis. — Long. 3 — 3½ lin.*

Mannerh. Brachelytr. 64. 2. — Er. Col. March. I. 404. 2.

Tachinus analis var. 1 et 3 Grav. Mon. 31. 16.

Tachinus analis Gyll. Ins. Suec. II. 269. 15.

Bryocharis analis Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 502. 1.

Oxyporus bicolor Rossi Faun. Etr. I. 253. 625. (Ed. Hellw. I. 314. 626.) forte.

Habitat in Europa.

Statura et summa affinitas praecedentis, at plerumque paulo maior et vere distinctus. Corpus nigrum, nitidum. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apicem versus vix incrassatae, articulo tertio secundo duplo prope longiore, 5—10 sensim paulo brevioribus at perparum crassioribus, articulis duobus primis testaceis, tertio rufo-testaceo, vel ferrugineo, 4—9 nigris, feminae penultimo ferrugineo, ultimo hoc paulo maiore, ovato, subacuminato, testaceo, maris ultimis duobus sulphureis, ultimo elongato, praecedentibus duobus longiore. Caput minutum, laevissimum, nigrum, ore late testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, ibique longitudine paulo latior, apice basi duplo fere angustior, lateribus et basi leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, leniter convexus, laevissimus. Elytra thorace tertia parte longiora, rufa, nitida, punctorum seriebus tribus ut in praecedente omnino. Abdomen parce punctatum, parceque longius pubescens, ano piloso, segmento sexto toto quintoque apice lato rufis, septimo, quando conspicitur, nigro-piceo. Pedes rufo-testacei, coxis omnibus nigris.

Mas tarsis anticis fortius dilatatis, abdominis segmento inferiore sexto canaliculato, apice leviter producto, antennis articulo ultimo praecedentibus ambobus paulo longiore.

Femina tarsis anticis simplicibus, abdominis segmento inferiore sexto apice rotundato, antennis articulo ultimo praecedentibus ambobus breviore.

Variat 1, antennis articulis 3 et 10 piceis, ultimo solo flavo. Specimen Austriacum dedit Dom. Schüppel.

2, antennis articulis ultimis tribus flavis. Specimen in Germania septentrionali lectum communicavit Dom. Schüppel.

Obs. 1. Distinguendus a praecedente praeter antennarum colorem articulo earum ultimo apice acuminato neque obtuso, thorace minus convexo, postice multo latiore, angulis posterioribus minus obtusis, coxis anticis nigris, tarsis anticis maris fortius dilatatis.

2. *Oxyp. bicolor* Rossi ob magnitudinem ultra 3 lin. potius ad hanc quam ad praecedentem speciem pertinere videtur.

* 3. *B. inclinans*: *Rufo-testaceus, nitidus, capite, pectore abdomineque nigris, hoc segmentis singulis piceo-marginatis, elytris crebre punctatis. — Long. 3½ lin.*

Er. Col. March. I. 405. 3.

Tachinus inclinans Grav. Mon. 33. 20.

Habitat in Germania.

Antennae capite thoraceque longiores, apice haud incrassatae, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus, ultimo praecedente paulo longiore, acuminato, testaceae, medio fuscescentes. Caput laevissimum, nigrum, nitidum, ore late testaceo. Thorax posterius coleopteris paululum latior, latitudine summa paulo brevior, apice duplo quam basi angustior, lateribus leviter rotundatis, basi subsinuatus, angulis posterioribus obtusis, leviter convexus, dorso ante medium punctorum pari impressus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum laeve, rufo-testaceum. Elytra thorace sesqui longiora crebre punctata, parcus ferrugineo-pubescentia, rufo-testacea, nitida. Abdomen parce punctatum, parceque pubescens, nigrum, nitidum, segmentis margine apicali piceis, ultimo penultimoque dimidio piceis. Pectus nigrum, nitidum. Pedes testacei, coxis anterioribus coloribus.

Mas tarsis anticis articulis duobus primis fortiter dilatatis, tibiis intermediiis spinis apicalibus fortioribus, tarsis intermediiis articulo primo compresso-dilatato, abdominis segmento inferiore quinto apice leviter inciso.

Femina tarsis anterioribus simplicibus, abdominis segmento inferiore quinto integro.

* 4. *B. formosus*: *Rufo-testaceus, nitidus, capite abdomineque nigris, hoc ano rufo, antennis fuscis, basi testaceis, elytris vase punctatis. — Long. 2½ lin.*

Mannerh. Brachelytr. 64. 1.

Tachinus formosus Grav. Mon. 32. 19.

Megacronus formosus Steph. Illustr. Bt. E. V. t. 26. f. 5.

Tachinus merdarius Grav. Micr. 149. 21. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX.* 399. 21.

Habitat in Germania.

Corpus gracilis, rufo-testaceum, nitidum. Antennae capite thoraceque multo longiores, apice haud crassiores, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus, ultimo praecedente paulo longiore, acuminato, fuscae, articulis duobus primis ultimoque testaceis. Caput laevissimum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax posterius coleopteris paulo latior, latitudine baseos paulo brevior, apice duplo prope angustior, lateribus leviter rotundatus, basi subtrisinuatus, angulis posterioribus subrectis, convexus, dorso ante medium punctorum pari impressus. Scutellum laeve. Elytra thorace haud longiora, parcus fortiusque vase punctata, puncto quoque pilo brevi reclinato instructo. Abdomen parce sat fortiter punctatum, parce lengius pubescens, nigrum, nitidum, segmento quinto dimidio sextoque toto testaceo-rufis. Pectus cum pedibus testaceum.

Obs. *Tachin. merdarius* Grav., secundum specimen typicum coll. Hoffmanns-

eggianae a Staph. merdario Fab. et Oliv omnino distinctus, cum T. formoso postea descripto omnino convenit.

5. **B. obscurus:** *Nigro-piceus, nitidus, antennis testaceis, pedibus anque rufo-piceis, elytris vase punctatis.* — **Long.** 2 lin.

Habitat in ins. Puerto-Rico, Dom. Moritz.

Statura angusta B. formosi, nigro-piceus, nitidus. Antennae capite thoraceque multo breviores, apicem versus sensim modice incrassatae, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus et parum crassioribus, penultimis crassitie brevioribus, ultimo breviter subovato, compresso, totae testaceae. Palpi flavi, maxillares articulo ultimo conico, penultimo haud longiore. Caput breve, laevissimum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, latitudine baseos vix brevior, antrorum angustatus, apice plus dimidio quam basi angustior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus subrectis, convexus, dorso ante medium punctorum pari impressus. Scutellum laeve. Elytra thorace sesqui longiora, crebre fortius vase punctata, stria suturali impressa, tenuiter pubescentia. Abdomen parcius punctatum, longius pubescens, apice segmentorumque singulorum marginibus rufo-piceis. Pedes rufo-testacei.

6. **B. seriatus:** *Nigro-piceus, nitidus, antennarum basi pedibusque testaceis, elytris crebre seriatim punctatis.* — **Long.** 2 lin.

Habitat Novae Valenciae in Columbia, Dom. Moritz.

Statura omnino B. striati, at minor, nigro-piceus, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo breviores, apicem versus sensim sat fortiter incrassatae, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus et crassioribus, penultimis transversis, ultimo subovato, apice acuminato, nigrae, articulis duobus primis testaceis. Caput breviusculum, laevissimum, ore flavo-testaceo. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, latitudine baseos paulo brevior, antrorum angustatus, apice dimidio quam basi angustior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus subrectis, convexus, marginibus summis brunneis. Elytra thorace sesqui longiora, dorso punctorum sat fortium seriebus pluribus (sex) striaque suturali impressa, parce pubescentia. Abdomen parcius punctatum, longius pubescens, segmentis singulis castaneo-marginatis. Pedes testacei.

* 7. **B. cernuus:** *Niger, nitidus, antennarum basi pedibusque testaceis, elytris rufis, punctorum seriebus obsoletioribus, interstitiis obsoletissime punctulatis.* — **Long.** 2 — 2½ lin.

Mannerh. Brachelytr. 64. 4. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 500. 5. — Er. Col. March. I. 406. 4.

Tachinus cernuus Grav. Mon. 31. 18. — Gyll. Ins. Suec. II. 271. 17. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 304. 16. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 64. 8. Ins. Lappon. 58. 2.

Var. Thorace elytrisque rufis.

Staph. merdarius Oliv. Ent. III. 42. 29. 39. t. 5. f. 45.

Boletobius merdarius Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 501. 6.

Habitat in Europa.

Statura omnino B. striati. Antennae capitum thoracisque prope longi-

tudine, tenuiores, apice parum incrassatae, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, sequentibus sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo ovato, praecedente sesqui longiore, apice subcompresso, acuminato, pilosellae, fuscae, articulis tribus primis testaceis, ultimo interdum obscure testaceo. Palpi maxillares articulo quarto praecedente paulo breviore, conico. Caput breviusculum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, latitudine baseos paulo brevior, apice plus dimidio quam basi angustior, lateribus praecipue antice deflexis, leviter rotundatus, basi subtruncatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, margine punctis singulis, dorso ante apicem punctorum pari impressus, nitidus, iam nigerrimus, iam piceo-rufescens, iam testaceo-rufus. Scutellum piceum, nitidum, laevissimum. Elytra thorace tercia parte longiora, rufa vel testaceo-rufa, nitida, punctorum sat remotorum subtilium seriebus tribus, prima ad suturam, secunda in medio dorso, tercia ad marginem lateralem, interstitiis punctis distantibus seriatis subtilibus obsoletisque impressis. Abdomen vase fortius punctulatum, longius griseo-pubescent, nigrum, nitidum, segmentis 4 primis margine postico, quinto apice, sexto toto rufis. Pectus nigrum, nitidum. Pedes rufo-testacei, coxis anterioribus iam concoloribus, iam nigro-piceis, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

* 8. **B. rufus:** *Rufo-testaceus, nitidus, abdominis segmentis anterioribus basi fuscescentibus, antennis fuscis, basi testaceis, elytris punctorum seriebus obsoletioribus, interstitiis subtiliter subserialim punctatis.* — **Long.** 2½ lin.

Er. Col. March. I. 407. 5.

Var. Capite pectoreque nigro-piceis.

Habitat in Germania.

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae capitum thoracisque prope longitudine, apicem versus fortius incrassatae, articulo tertio secundo sesqui longiore, 4—7 sensim brevioribus et crassioribus, 7—10 subaequalibus, longitudine paulo crassioribus, ultimo praecedente sesqui longiore, breviter subovato, apice compresso, obtuse rotundato, fuscae, articulis quatuor primis rufo-testaceis. Palpi maxillares articulo tertio modice incrassato, quarto hoc dimidio prope breviore et duplo tenuiore, valde acuminato. Caput minutum, triangulare, saturate rufo-testaceum, nitidum, ore dilutiore, vertice nonnunquam fuscescente. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, apice duplo angustior, latitudine baseos tercia parte prope brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus subrotundatis, laevissimus vel interdum subtiliter obsoletissimeque vase punctulatus, apice prope marginem anteriorem punctorum pari impressus, saturate rufo-testaceus, nitidus. Scutellum concolor, laevissimum, nitidum. Elytra thorace sesqui longiora, punctorum maiorum seriebus tribus, interstitiis parcius subtiliter obsoleteque subserialim punctatis, rufo-testacea, nitida. Abdomen supra vase profundi punctatum, subtus crebre fortiter profundeque punctatum, parce fulvo-pubescent, piceo-testaceum seu castaneum, nitidum, segmentis singulis margine apicali rufescente. Pectus saturate rufo-testaceum. Pedes testacei.

Variat nonnunquam capite pectoreque nigro-piceis.

Obs. Differt a praecedente praeter colorem antennis apicem versus magis incrassatis, thorace lateribus minus rotundato, punctorum pari apici propiore, elytris in interstitiis distinctius punctulatis. Palporum maxillarium articulo quarto brevioro conicoque anceps quasi inter Boletobium et Mycetoporum.

* 9. **B. bicolor:** *Niger, nitidus, capite, thorace, scutello, pedibus elytrisque rufis, his angulo exteriore apicis nigro.* — *Long. 2½ — 3½ lin.*

Tachinus bicolor Grav. Mon. 28. 9.

Habitat in Hercynia, Borussia.

B. anali robustior et saepe duplo maior. Antennae vix capitum thoracisque longitudine, apice paulo crassiores, articulo tertio secundo plus sesqui longiore, 5 — 10 modice compressis, subtriangularibus, latitudine apicis vix brevioribus, inter se aequalibus, ultimo oblongo, praecedente plus duplo longiore, compresso, apice rotundato, fusco-nigrac, articulis 4 primis testaceis, ultimo apice summo ferrugineo. Caput oblongum, testaceo-rufum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, latitudine summa non brevior, apice paulo angustior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis subrotundatis, leniter convexus, laevissimus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum laevissimum, testaceo-rufum, nitidum. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis sat distinctis, serie dorsali quaque striae leviter exaratae imposita, testaceo-rufa, nitida, angulo apicali exteriore a medio margine laterali usque ad suturae apicem nigerrimo. Abdomen crebrius punctatum, parcus nigro-pubescent, nigrum, nitidum. Pectus nigrum, nitidum, mesosterno rufo-testaceo. Pedes testacei, coxis anterioribus concoloribus, femoribus apice fortius spinulosis, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento inferiore quinto ante apicem carinula parva longitudinali dentiformi instructo.

Femina abdominis segmento inferiore quinto mutico.

* 10. **B. axillaris:** *Piceus, nitidus, antennarum basi apiceque pedibusque anticus testaceis, capite elytrisque nigris, his vitta longitudinali marginaque apicali testaceis.* — *Long. 3 lin.*

Tachinus axillaris Grav. Mon. 29. 11.

Habitat in America septentrionali.

Statura omnino praecedentis. Antennae capitum thoracisque longitudine, apice parum crassiores, articulo tertio secundo sesqui longiore, 5 — 10 crassioribus, modice compressis, subtriangularibus, 6 — 10 latitudine apicis paulo brevioribus, aequalibus, ultimo praecedente duplo longiore et paulo angustiore, oblongo, compresso, nigrae, articulis duabus primis ultimoque testaceis. Caput oblongum, nigrum, nitidum, labro palpisque testaceis. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, apice dimidio angustior, latitudine baseos paulo brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, nigro-piceus, nitidus. Scutellum nigrum, nitidum. Elytra thorace sesqui fere longiora, serie dorsali punctis fere sex satis distantibus composita, nigra, nitida, margine apicali vittaque longitudinali, ab angulo humerali apicis medium petente, marginem apicalem haud attingente,

testaceis. Abdomen supra parcus, subtus crebrius fortiusque punctatum, piceum, nitidum, segmentis singulis margine apicali dilutiore. Pedes anticus cum coxis testacei, posteriores picei, femoribus piceo-testaceis.

Mas abdominis segmento inferiore quinto ante apicem carinula longitudinali dentiformi instructo.

Femina latet.

* 11. **B. niger:** *Niger, nitidus, antennarum articulo primo testaceo, abdominis segmento quinto apice rufo, elytris punctorum seriebus obsoletioribus.* — *Long. 4½ — 6 lin.*

Tachinus niger Grav. Micr. 193. 5. Mon. 30. 12.

Var. Abdominis segmento quinto apice concolore.

Habitat in America septentrionali.

Magnus, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo breviores, articulis 3 primis teretibus, 2 et 3 subobconicis, hoc praecedente sesqui longiore, sequentibus latioribus, modice compressis, triangularibus, 5 — 10 latitudine apicis paulo brevioribus, aequalibus, ultimo paulo angustiore, oblongo-ovato, nigrae, articulo primo testaceo, secundo piceo, ultimo apice ferrugineo. Caput oblongum, clypeo pallido, labro palpisque piceis. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, latitudine baseos haud brevior, apice dimidio angustior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus. Scutellum laevissimum. Elytra thorace parum longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis earum obsoletis, inter se sat remotis. Abdomen segmentis anterioribus parcus, posterioribus crebrius punctatum. Pedes nigro-picei, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdomine apice concolore, segmento inferiore sexto tricarinato, carina intermedia apice, lateralibus basi abbreviatis, apice inter carinas laterales emarginato.

Femina abdominis segmento quinto apice late sanguineo, sexto simplice.

Obs. Utriusque sexus non nisi unicum specimen vidi, nescio igitur an differentia coloris in abdominis apice semper cum differentia sexus conveniat.

* 12. **B. striatus:** *Nigro-piceus, nitidus, pedibus segmentorumque abdominis marginibus rufis, elytris rufis, angulo apicali exteriore nigro.* — *Long. 2 — 2½ lin.*

Mannerh. Brachelytr. 64. 6. — Boisd. et Laeord. Faun. Ent. Paris. I. 500. 4. — Runde Brachelytr. Hal. 26. 3.

Staphyl. striatus Oliv. Ent. III. 42. 28. 37. t. 5. f. 47.

Tachinus striatus Grav. Micr. 146. 17. Mon. 27. 6. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX.* 398. 17. — *Gyll. Ins. Suec. II.* 272. 18. — *Sahlb. Ins. Fenn. I.* 304. 17.

Staphyl. angularis Payk. Faun. Suec. III. 395. 35.

Staphyl. analis var. γ Payk. Mon. Staph. 48. 34.

Habitat in Europa.

Antennae capite thoraceque breviores, fortius incrassatae, articulo secundo tertioque aequalibus, 5 — 10 crassis, transversis, ultimo praecedente sesqui longiore, compresso, ovato, fuscae, articulis 4 primis rufo-testaceis, ultimo testaceo. Caput oblongum, nigro-piceum, nitidum, ore rufo-testaceo.

Thorax basi coleopterorum prope latitudine, apice dimidio angustior, latitudine baseos paulo brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus omnino rotundatis, laevissimus, nigro-piceus, nitidus, margine summo piceo-rubo. Scutellum laevissimum, rufo-piceum, nitidum. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis sat remotis, rufa, nitida, macula magna transversa apicali, exterius plerumque lato nigro-picea, margine apicali ipso summo rufo. Abdomen fortius punctatum, longius pubescens, nigro-piceum, nitidum, segmentis 4 primis margine postico, quinto apice, sexto toto rufis. Pectus nigro-piceum, nitidum. Pedes testacei, coxis anticis concoloribus, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice sub-bisinuato.

Femina abdominis segmento inferiore sexto apice rotundato.

* 13. *B. dimidiatus*: *Niger, nitidus, elytrorum basi pedibusque rufis. — Long. 2½ lin.*

Habitat in America septentrionali.

Statura omnino praecedentis, niger, nitidus. Antennae capite thorace que multo breviores, apicem versus fortiter incrassatae, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 crassis, sensim paulo crassioribus, transversis, ultimo angustiore, breviter subovato, apice subacuminato, nigrae, articulis tribus primis rufo-testaceis, ultimo ferrugineo. Caput oblongum, laevissimum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, apice duplo prope angustior, latitudine baseos parum brevior, basi, lateribus angulisque posterioribus rotundatis, laevissimus. Elytra thoraci longitudine, serie dorsali punctis sat distinctis sex composita, nitida, nigra, basi prope ad medium usque rufa. Abdomen crebrius fortiusque punctatum, griseo-pubescentis, segmentis singulis margine apicali rufo-piceo. Pedes rufi, coxis anticis picescentibus.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice sub-bisinuato.

Femina abdominis segmento inferiore sexto apice rotundato.

* 14. *B. atricapillus*: *Rufus, nitidus, capite, pectore, ano elytrisque nigris, his lunula basali margineque apicali albidis. — Long. 2½—3 lin.*

Mannerh. Brachelytr. 64. 7. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 497. 1. — Runde Brachelytr. Hal. 27. 5. — Er. Col. March. I. 408. 6.

Staph. atricapillus Fab. Syst. Ent. 267. 15. Spec. Ins. I. 337. 19. Mant. Ins. I. 221. 26. Ent. Syst. I. II. 527. 40. Syst. El. II. 599. 49. — Goeze Ent. Beitr. I. 724. 9. — Payk. Mon. Staph. 49. 35. Faun. Suec. III. 414. 60. — Oliv. Ent. III. 42. 29. 40. t. 4 f. 39. — Panz. Ent. Germ. 456. 30. — Schrank Fauna Boica I. 645. 877. — Marsh. Ent. Britt. 522. 71.

Tachinus atricapillus Grav. Mier. 148. 19. Mon. 30. 14. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 399. 19. — Gyll. Ins. Suec. II. 273. 19. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 305. 18. — Guér. Iconogr. Ins. t. 10. f. 8.

Oxydorus lunulatus Fab. Syst. Ent. 268. 2. Spec. Ins. I. 338. 2. Mant. Ins. I. 222. 2. Ent. Syst. I. II. 532. 3. Syst. El. II. 605. 3. (forte) — Panz. Ent. Germ. 359. 3. Faun. Germ. 22. 15.

Tachinus lunulatus Zetterst. Faun. Lappon. I. 65. 9. Ins. Lappon. 58. 10.

Habitat in Europae boletis.

Antennae capitum thoracisque prope longitudine, apice crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 sensim paululum brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo oblongo-ovato, praecedentibus ambobus longitudine aequali, fuscae, articulis 4 primis ultimoque testaceis. Caput valde elongatum, angustatum, nigrum, nitidum, ore flavo. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, latitudine baseos parum brevior, apice plus dimidio quam basi angustior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, apice punctorum pari notatus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum nigrum, nitidum. Elytra thorace paulo longiora, punctorum remotorum seriebus tribus ordinariis, nigra, nitidissima, macula lunata humerali margineque apicali albidis. Abdomen parce punctatum, rufum, nitidum, segmentis ultimis duobus nigris, penultimo apice albido. Pectus nigrum. Pedes flavi, coxis anticis concoloribus, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice truncato.

Femina abdominis segmento inferiore sexto apice rotundato.

Obs. 1. Ox. lunulatus Fabricii ob „abdomen apice nigrum, annulo albo” ad hanc speciem referendus videtur: in hac enim annulus albus in segmenti penulti marginis apicali situs conspicuus, in sequente specie tenuissimus neque nisi oculo armato observandus. Staph. atricapilli nomine signata in Museo Fabriciano Boletocarya lunulata exstat.

2. Dom. Prof. Zetterstedt speciem hanc pro vero Staph. lunulato Lin. habet, praecipue quod frequentius obvius sit, descriptio Linneana autem aegre ab hoc insecto desumpta.

* 15. *B. speciosus*: *Rufus, nitidus, capite, pectore, ano elytrisque nigris, his basi margineque apicali inaequaliter testaceis, stria dorsali multi-punctata. — Long. 4 lin.*

Habitat in Hungariae montibus, Dom. Schüppel.

Habitu omnino praecedentis, at plus duplo maior. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice parum crassiores, subcompressae, articulo tertio secundo sesqui prope longiore, 5—10 subobconicis, sensim paululum brevioribus at vix crassioribus, ultimo praecedente parum longiore, ovato, compresso, nigrae, articulis 4 primis ultimoque testaceis. Caput fortiter elongatum, angustum, nigerrimum, nitidum, ore testaceo. Thorax coleopterorum basi paululum angustior, apice duplo prope quam basi angustior, latitudine baseos vix brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum testaceum. Elytra thorace tertia fere parte longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis seriei intermediae numerosis (circiter 10), nitidissima, nigra, fascia basali, postice profunde sinuata, margineque inaequali apicali testaceis. Abdomen segmentis 4 primis parce punctatis, nigro-pilosellis, rufis, nitidis, reliquis crebre punctatis, nigerrimis, nitidis, quinto margine apicali tenuissimo albo. Pectus nigerrimum. Pedes pallidi, coxis anticis concoloribus, posterioribus nigris, posticis margine postico albido.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice leviter emarginato.

Femina latet.

* 16. *B. lunulatus*: *Rufus, nitidus, capite, pectore, uno, elytrisque nigris, his basi tota margineque apicali testaceis, serie dorsali parumpunctata.*
— *Long. 2½ lin.*

Mannerh. Brachelytr. 64. 6. — Runde Brachelytr. Hal. 27. 4. — Er. Col. March. I. 408. 7.

Staphyl. lupulatus Linn. *Faun. Suec. n. 845. Syst. Nat. I. II. 684. 7. — Müll. Faun. Frid. 23. 225. Prodr. 98. 1104. — Goeze Ent. Beitr. I. 718. 7. — De Vill. Ent. I. 413. 7. — Payk. Mon. Staph. 58. 41. Faun. Suec. III. 415. 61. — Marsh. Ent. Britt. 523. 72.*

Oxyporus lunulatus Cederh. *Faun. Ingr. 120. 369.*

Tachinus lunulatus Grav. *Micr. 147. 18. Mon. 30. 13. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 398. 18. — Gyll. Ins. Suec. II. 274. 20. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 305. 19.*

Tachinus atricapillus Zetterst. *Faun. Lappon. I. 65. 10. Ins. Lappon. 58. 11.*

Habitat in Europa.

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice leviter crassiores, articulo tertio secundo sesqui longiore, 6—10 sensim paululum brevioribus et crassioribus, subobconicis, ultimo ovato, praecedente sesqui longiore, compresso, apice abrupte acuminato, fuscae, articulis 4 primis ultimoque testaceis. Caput modice elongatum, nigrum, nitidum, ore flavo. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, apice dimidio quam basi angustior, latitudine baseos vix brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum testaceum, nitidum. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis seriei intermediae paucis, distantibus, nigra, nitidissima, fascia basali integra, elytri quadrantem fere occupante, margineque apicali testaceis. Abdomen parce punctatum, rufum, nitidum, segmentis ultimis duobus nigris, penultimo margine apicali tenuissimo albo. Pectus nigrum. Pedes flavi, coxis anterioribus concoloribus, tarsis anticeis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice truncato.

Femina abdominis segmento inferiore sexto apice subacuminato.

* 17. *B. cinctus*: *Rufus, nitidus, capite, pectore, uno elytrisque nigris, his basi, sutura margineque apicali testaceis.* — *Long. 2½ lin.*

Tachinus cinctus Grav. *Micr. 193. 6. Mon. 30. 15.*

Tachinus atricaudatus Say *Journ. of the Acad. of natur. scienc. of Philadelph. III. p. 158.*

Habitat in America septentrionali.

Statura et summa affinitas praecedentium. Antennae capitis thoracisque longitudine, apice leniter crassiores, subcompressae, articulo tertio secundo sesqui longiore, 5—10 subobconicis, sensim paulo crassioribus et paululum brevioribus, ultimo praecedente sesqui longiore, ovato, apice acuminato, fuscae, articulis 4 primis ultimoque testaceis. Caput elongatum, angustum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, ante plus dimidio quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, testaceo-rufus, nitidus. Scutellum rufo-testaceum, nitidum. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus ordinariis tribus, punctis seriei interme-

diae paucis, distantibus, nitidissima, nigra, basi tota, sutura basi leviter dilatata, margineque apicali testaceis. Abdomen parce punctatum, nitidum, segmentis quatuor primis rufis, ultimis duobus nigris, penultimo apice testaceo. Pectus nigrum. Pedes flavi, coxis anterioribus concoloribus, posticis nigris, margine postico testaceo.

* 18. *B. trimaculatus*: *Niger, nitidus, thorace elytrisque testaceis, illo disco, his angulo exteriore late nigris, antennis pedibusque testaceis, elytrorum serie dorsali multipunctata.* — *Long. 2½ lin.*

Mannerh. Brachelytr. 65. 9. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 498. 2.

Oxyporus trimaculatus Fab. *Ent. Syst. I. II. 533. 7. Syst. El. II. 605. 7.*

Staphyl. trimaculatus Payk. *Faun. Suec. III. 422. 68.*

Tachinus trimaculatus Gyll. *Ins. Suec. II. 275. 21. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 306. 20. — Zetterst. Ins. Lappon. 58. 12.*

Staphyl. littoreus Payk. *Mon. Staph. 80. 55.*

Habitat in Suecia, Fennia, Dom. Schüppel.

Sequentibus affinis, at maior, *B. cernuo aequalis*, medio tamen latior, et apicem utrumque versus magis angustatus. Antennae capitis thoracisque prope longitudine, apice parum crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 leviter oboconicis, subaequalibus, ultimo elongato-subovato, apice acuminato, testaceae, medio magis minusve fuscescentes. Caput breviusculum, laevissimum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopteris distincte angustior, apicem versus leviter angustatus, apice dimidio quam basi angustior, latitudine baseos parum brevior, basi et lateribus parum rotundatus, angulis posterioribus obtusis subrotundatis, laevissimum, nitidus, rufo-testaceus, disco longitudinali basin versus angustato nigro. Scutellum laevissimum, nigrum. Elytra thorace sesqui longiora, luteo-testacea, nitida, angulo posteriore exteriore a suturae apice inde usque ad lateris medium margineque toto inflexo nigerrimo, stria dorsali ordinaria circiter 12-punctata. Abdomen breviusculum, sparsim fortius punctatum, pubes longiore depressa grisea parcius vestitum, nigrum, nitidum, segmentis singulis margine apicali piceo-testaceo. Pectus nigerrimum. Pedes testacei, coxis anterioribus concoloribus, posticis nigris, margine posteriore albido, tarsis antiois in utroque sexu simplicibus.

Obs. Differt a *B. trinotato* et *pygmaeo* elytrorum stria dorsali multipunctata, a *B. exoleto* statura multo maiore et duplo latiore ut et colore.

* 19. *B. trinotatus*: *Testaceus, nitidus, capite, elytrorum macula scutellari aliaque postica nigris, antennis fuscis, basi testaceis, elytris serie dorsali multipunctata.* — *Long. 2 lin.*

Er. Col. March. I. 309. 8.

Staph. bimaculatus Schrank *Faun. Boic. I. 644. 872. (forte)*

Habitat in Germania.

Antennae capitis thoracisque longitudine, apice leviter crassiores, articulis 2 et 3 longitudine aequalibus, 4—10 subobconicis, sensim paululum brevioribus et crassioribus, ultimo ovato, apice acuminato, pilosae, fuscae, articulis 4 primis dilute testaceis. Caput oblongum, nigrum, nitidum, labro, palpis reliquisque oris partibus dilute testaceis. Thorax basi coleopteris

angustior, apice basi vix dimidio angustior, latitudine baseos parum brevior, basi et lateribus medio leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum testaceum. Elytra thorace plus sesqui longiora, flavo-testacea, nitida, macula communis circa scutellum aliaque sat magna intra angulum apicalem exteriorem rotundatis nigris, saepe minusve obsoletis, serie dorsali ordinaria punctis circiter 8—9 composita. Abdomen rufo-testaceum, segmentis singulis rarius basi piceis, nitidum, supra punctis rarissimis impressum, subtus crebrius fortiter punctatum. Pectus nigrum, nitidum. Pedes flavo-testacei, coxis anterioribus concoloribus, posticis nigris, margine postico testaceo, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento inferiore sexto longitudinaliter obsolete impresso.

Femina abdominis segmento inferiore sexto simplice.

* 20. *B. exoletus*: *Testaceus, nitidus, capite nigro, elytris macula apicali obsoleta fusca, antennis ante apicem fuscescentibus, elytris serie dorsali multipunctata*. — Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Er. Col. March. I. 409. 9.

Habitat in Germania, ipse, in Gallia, Dom. Dr. Aubé, in Sardinia, Dom. Prof. Gené.

Statura sequentis et maioribus eius individuis aequalis, at paulo angustior. Antennae capite thoraceque paulo longiores, apice leviter crassiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 leviter obconicis, aequalibus, ultimo ovato, apice acuminato, testaceae, ante apicem paulo obscuriores. Caput breviusculum, nigrum, nitidum, oris partibus testaceis. Thorax basi coleopterorum latitudine, apice dimidio fere angustior, latitudine baseos vix brevior, basi parum, lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, testaceus, nitidus. Scutellum testaceum. Elytra thorace plus sesqui longiora, thoracis basi haud latiora, testacea, nitida, apice macula transversa fusca obsoletiore, in angulo exteriore sita, notata, margine apicali summo plerumque testaceo, serie dorsali ordinaria punctis sat confertis, numero circiter 12—14 composita. Abdomen utrinque parce punctatum, testaceum, nitidum, segmentis singulis basi obscurioribus. Pectus piceum. Pedes flavi, coxis anterioribus concoloribus, posticis piceis, margine postico dilutiore, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice summo subemarginato.

Femina abdominis segmento inferiore sexto apice rotundato.

Variat thoracis disco piceo, elytrorum macula nigerrima, maiore, ultra elytri tertiam partem dilatata.

Obs. Praecedenti et sequenti admodum affinis, ab illo autem statura minore, angustiore, capite breviore etc., ab hoc elytrorum serie dorsali multipunctata distinguitur.

* 21. *B. pygmaeus*: *Piceo-testaceus, nitidus, capite elytrorumque macula angulari nigris, antennis fuscis, basi testaceis, elytrorum serie dorsali parumpunctata*. — Long. $1\frac{1}{3}$ — 2 lin.

Mannerh. Brachelytr. 65. 10. — *Botsd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I.* 499. 3. — *Er. Col. March. I.* 410. 10.

Oxyporus pygmaeus Fab. Spec. Ins. I. 339. 4. Mant. Ins. I. 222. 5. Ent. Syst. I. II. 534. 13. Syst. El. II. 606. 12. — Panz. Ent. Germ. 360. 10. Faun. Germ. 27. 19.

Tachinus pygmaeus Gyll. Ins. Suec. II. 277. 22. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 66. 11. Ins. Lappon. 58. 13. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 306. 21.

Oxyporus thoracicus Fab. Spec. Ins. I. 338. 3. Mant. Ins. I. 222. 4. Ent. Syst. I. II. 534. 12. Syst. El. II. 606. 12. Panz. Ent. Germ. 360. 9.

Tachinus melanocephalus Grav. Micr. 144. 16. Mon. 27. 7. — Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX. 398. 16.

Staphyl. melanocephalus Marsh. Ent. Britt. 523. 73. (forte)

Staphyl. trimaculatus var. β , γ Payk. Faun. Suec. III. 422. 68.

Boletobius merdarius Runde Brachelytr. Hal. 26. 2.

Staph. pallidus Rossi Faun. Etr. Mant. 99. 221. (Ed. Hellw. I. 444. 221.) forte.

Habitat in Europa.

Magnitudo variat, specimina maxima B. trinotato aequalia, pleraque autem duplo minoria et ultra. Antennae capite thoraceque breviores, apice crassiores, articulis 2 et 3 aequalibus, 5—10 subobconicis, sensim paulo crassioribus, ultimo compresso, breviter ovato, apice obtuso, fuscæ, articulis 5 primis testacis. Caput breviusculum, nigrum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopteris paulo angustior, apice duplo prope quam basi angustior, latitudine baseos paulo brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, laevissimus, testaceus, nitidus, disco magis minusve picecente. Scutellum piceo-testaceum. Elytra pallide testacea, nitida, macula magna rotundata intra angulum apicalem, rarius obsoleta, picea, nonnunquam etiam circa scutellum picecentia, serie dorsali ordinaria punctis sat distantibus, circiter 5—6 composita. Abdomen supra parcus, subtus crebrius sat fortiter punctatum, piceum, nitidum, apice segmentorumque singulorum margine postico rufo-testaceis, nonnunquam omnino rufo-testaceum. Pectus nigro-piceum. Pedes pallide testacei, coxis anterioribus plerumque concoloribus, rarius picecentibus, posticis nigro-piceis, margine postico testaceo, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus.

Mas abdominis segmento sexto inferiore medio obsolete tuberculato, pone tuberculum leviter longitudinaliter impresso.

Femina abdominis segmento inferiore sexto simplice.

Variat rarius thorace abdomeque omnino nigro-piceis, frequentius omnino testaceus, capite solo nigro.

Species mihi invisa.

22. *B. pulchellus*: *Rufo-testaceus, nitidus, capite, antennarum medio, pectore, elytrorum fascia postica anaque nigra*.

Mannerh. Brachelytr. 64. 8.

Habitat in Fennia, prope Aboam.

B. atricapillo similis, paulo tamen angustior et aliter coloratus. B. lunulato etiam affinis, sed quadruplo minor, nitidior et respectu magnitudinis angustior, antennarum articulo ultimo longiore toto pallido. (Mannerh.)

Mycetoporus Mannerh.

Mannerh. Brachelytr. p. 62.

Ischnosoma Steph. Illustr. V. p. 168.

Antennæ 11-articulatae, filiformes.

Palpi maxillares articulo ultimo subulato.

Ligula integra, apice rotundata.

Elytra pectori longitudine aequalia.

Tarsi 5-articulati.

Corpus elongatum, aut lineare aut utrinque attenuatum, utrinque deorsum curvatum, alatum. Caput thoraci immissum, deflexum, oculis rotundatis, parum prominulis. Labrum subquadratum, apice leviter emarginatum. Mandibulae parvae, apice incurvae, acutae, interne basi membrana ciliatae. Maxillae (t. IV. f. 7. b.) malis coriaceis, interiore interne, exteriorie apice barbatis. Palpi maxillares leviter elongati, articulo primo minuto, secundo tertioque inter se longitudine subaequalibus, subobconicis, tertio reliquis crassiore, quarto minuto, tenui, subulato. Labium (t. IV. f. 7. a.) mento transverso, parte membranacea ante palporum basin sat elongata, ligula rotundata, membranacea, paraglossis ligulae connatis, nonnisi linea ciliata distinguendis, eamque hand superantibus. Palpi labiales breviusculi, crassiusculi, articulo primo cylindrico, secundo breviore, subgloboso, tertio minuto, subulato. Antennae ante mandibularum basin insertae, filiformes, apicem versus magis minusve incrassatae. Thorax coleopterorum fere latitudine, antrorum angustatus, latitudine parum brevior, lateribus rotundatus, basi truncatus, antice pro receptione capitis leviter emarginatus, transversim convexus. Scutellum triangulare. Elytra apice truncata, angulo apicali exteriorie oblique truncata. Abdomen aut lineare aut apicem versus sensim attenuatum, deorsum curvatum. Pedes breviusculi, coxis intermediis valde approximatis, posticis amplis, parallelipedis, scutatis, tibiis omnibus spinuosis, tarsis 5-articulatis, posterioribus elongatis, gracilibus, articulo primo elongato, anticus crassiusculis, articulo primo reliquis paulo longiore, in utroque sexu simplicibus.

Observationes.

1. Genus praecedenti proximum, at ligula integra et palporum maxillarium articulo ultimo subulato sat distinctum.

2. Caput laevissimum, thorax laevissimus, margine punctis singulis, dorso saepius punctis nonnullis inter medium et latera sitis, apice semper punctis quatuor transversim positis, margine anteriori magis minusve approximatis impressus, scutellum laevissimum, elytra punctorum seriebus tribus ordinariis, una suturali, secunda dorsali, tertia marginali; abdomen parce fortiusque punctatum.

3. Mas plerumque antennis apice paulo crassioribus et abdominis segmento inferiore sexto minus rotundato, septimoque igitur conspicuo distinguendus.

4. Vinctus in silvis, sub muscis et foliis deciduis.

* 1. *M. splendens*: *Oblongus, niger, antennis brevioribus, subclavatis, thorace disco laevissimo, pedibus elytrisque rubris, his punctorum serie dorsali simple.* — Long. 2 lin.

Er. Col. March. I. 411. 1.

Staphyl. splendens Marsh. Ent. Britt. 524. 75.

Habitat in Germania.

Habitu fere Boletobii cernui, at paulo minor, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque paulo breviores, apicem versus fortius incrassatae, apice subcompressae, articulo tertio secundo paulo longiore, 4—6 obconicis, sensim crassioribus et paulo brevioribus, 7—10 transversis, ultimo breviter

ovato, pilosae, fuscae, articulis duobus primis testaceis. Palpi testacei. Caput breve, subrotundatum. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, apice dimidio angustior, latitudine baseos parum brevior, lateribus modice, basi leviter rotundatus, angulis posterioribus rotundatis, modice convexus, ad apicem punctis quatuor transversim positis impressus. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, interstitiis laevissimis, saturate rufa, nitida, margine lateralii nigro. Abdomen apicem versus leviter attenuatum, pilis brevibus depresso parce pubescens, segmentis singulis fortius punctatis, apice laevioribus, margine postico rufo-piceo. Pedes anteriores rufi, postici rufo-picei, femoribus nigricantibus.

* 2. *M. punctus*: *Oblongus, niger, pedibus antennisque testaceis, his ante apicem fuscescentibus, thorace rufo, disco utrinque punctis duabus, elytris rufis, lateribus nigris, intra seriem dorsalem punctis nonnullis impressis.* — Long. 2 lin.

Mannerh. Brachelytr. 63. 5. — Er. Col. March. I. 412. 2.

Tachyporus punctus Gyll. Ins. Suec. II. 248. 13. — Zetterst. Ins. Lapp. 56. 11.

Tachinus punctus Grav. Mon. 27. 5. (forte)

Habitat in Germania.

Statura omnino praecedentis, punctura vero *M. lepidi*. Antennae capite thoraceque parum breviores, apicem versus leviter incrassatae, articulo tertio secundo paulo longiore, 5—10 subcylindricis, sensim paululum brevioribus et crassioribus, penultimis crassitie parum brevioribus, ultimo ovato, apice subacuminato, testaceae, ante apicem flavo-testaceum fuscescentes. Caput breviusculum, nigro-piceum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum fere latitudine, apice duplo angustior, latitudine baseos paulo brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus subrotundatis, leviter convexus, dorso utrinque punctis duobus, a margine lateralii et a medio aequaliter remotis, apice punctis quatuor, transversim positis, notatus, rufus, nitidus. Scutellum piceum, nitidum. Elytra thorace sesqui prope longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis sat distantibus, et praetera interstitio interiore punctis nonnullis, saepius seriem dorsalem accessoriam constitutis impressa, rufa, nitida, margine lateralii nigro. Abdomen apicem versus sensim attenuatum, supra parce fortiter punctatum, parce griseo-pubescent, nigrum, segmentis singulis margine postico late rufo-piceo. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei.

Variat minus maturus testaceus, capite solo nigro-piceo.

* 3. *M. longulus*: *Elongatus, niger, nitidus, antennis filiformibus, thorace disco utrinque punto uno altero impresso, pedibus elytrisque rubris, his punctorum serie dorsali simple.* — Long. 2—2½ lin.

Mannerh. Brachelytr. 63. 4. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 503. 1. — Er. Col. March. I. 413. 3.

Habitat in Germania.

M. splendenti affinis, at magis elongatus, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque longitudine, apice parum incrassatae, articulo tertio secundo sesqui longiore, 5—10 sensim paulo brevioribus at parum crassioribus, omnibus, penultimis etiam, crassitie longioribus, ultimo oblongo-ovato, apice acuminato, fuscae, articulis duobus primis testaceis. Caput breve, apicem

versus angustum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, apice duplo prope angustior, latitudine baseos paulo brevior, basi, lateribus et angulis posterioribus rotundatis, leviter convexus, medio utrinque punctis duobus tribus, apice punctis quatuor, transversim positis, impressus. Elytra thorace sesqui prope longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis sat distantibus, interstitiis laevissimis, rufa, nitida, margine lateralii summoque basali nigra. Abdomen elongatum, apicem versus sensim attenuatum, densius griseo-pubescentis, segmentis singulis crebre fortiter punctatis, margine postico rufo-piceo. Pedes anteriores rufi, postici rufo-picei, femoribus nigricantibus.

* 4. *M. lepidus*: *Elongatus, linearis, piceus, pedibus testaceis, thorace disco utrinque punctis duobus, elytris prope seriem dorsalem punctis duobus impressis*. — Long. $1\frac{1}{2}$ — 2 lin.

Mannerh. Brachelytr. 63. 1. — Er. Col. March. I. 413. 4.

Tachinus lepidus Grav. Mon. 26. 4.

Tachyporus lepidus Gyll. Ins. Suec. II. 247. 12. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 59. 7. Ins. Lappon. 55. 9. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 294. 12.

Staphyl. punctato-striatus var. a — y Payk. Faun. Suec. III. 417. 64.

Staphyl. merdarius Schrank Faun. Boic. I. 647. 884.

Staph. merdarius Fab. Syst. Ent. 266. 14. Spec. Ins. I. 337. 18. Mant. Ins. I. 221. 25. Syst. El. II. 598. 46. — Goeze Ent. Beitr. I. 724. 8. (forte)

Oxyporus merdarius Fab. Ent. Syst. I. II. 533. 11. (forte)

Var. a: Nigro-piceus, elytris rufis.

Mycetoporus lepidus Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 504. 2.

Var. b: Nigro-piceus, elytris rufis, macula postica nigricante.

Mycetoporus bimaculatus Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 505. 3.

Var. c: Minor, nigro-piceus, antennarum basi pedibusque picescentibus.

Tachinus tristis Grav. Mon. 29. 10.

Habitat in Europa.

Elongatus, angustus, linearis, plerumque iam obscure piceus, iam castaneus, vel interdum testaceus, nitidus. Antennae capitis thoracisque longitudine, apicem versus parum incrassatae, articulo tertio secundo sesqui prope longiore, 5—10 sensim paululum crassioribus at vix brevioribus, penultimis longitudine paulo crassioribus, ultimo breviter ovato, subacuminato, piceae, basi testacei. Caput breve, rotundatum, nigro-piceum, ore testaceo. Thorax basi coleopteris paulo latior, apice duplo fere angustior, latitudine baseos vix brevior, basi et lateribus modice rotundatus, angulis posterioribus obtusis, subrotundatis, modice transversim convexus, dorso utrinque punctis duobus tribus, apice punctis quatuor, exterioribus in ipso margine, impressus. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, punctis modice distantibus, et prope seriem intermedium interne punctis duobus impressa, plerumque corpori concolora, rarius rufa, interdum macula nigra ante apicem notata. Abdomen elongatum, parallelum, fortius punctatum, parce griseo-pubescentis. Pedes testacei vel rufo-testacei.

Obs. 1. Magnitudine et colore instabilis, statura linearis, elongata faciliter cognoscitur.

2. *Staph. merdarius* Fab. secundum specimen in collectione auctoris conservatum, ad hanc speciem pertinet, cum autem ab eo Museum Banksianum citatum sit, non sine dubio descriptionem mancam allegavi.

3. *Staph. brunneus* Marsh. Ent. Britt. 524 74, secundum specimen auctoris ipsius a Dom. Stephens in hoc genere enumeratus, forte ad hanc speciem pertinet. Marsham descriptionem a Paykulo mutuavit, qui hoc nomine Omalium significavit, locus Marshamianus igitur neque apud hoc neque apud illud insectum citandus.

* 5. *M. Americanus*: *Oblongus, niger, nitidus, antennarum basi, thorace, elytris pedibusque rufo-testaceis, thorace dorso utrinque punctis duobus impresso, elytris punctorum serie dorsali simplice*. — Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in America septentrionali, Dom. Zimmermann.

Habitu omnino M. prouo, at sesqui fere maior. Antennae apicem versus incrassatae, articulo tertio secundo vix aequali, obconico, sequentibus sensim crassioribus, nigrae, basi rufo-testacei (articuli ultimi desunt). Caput parvum, breve, nigro-piceum, nitidum, ore rufo. Thorax basi coleopterorum fere latitudine, apice duplo angustior, latitudine baseos distincte brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, modice transversim convexus, dorso utrinque punctis duobus, a margine lateralii et a medio aequaliter distantibus, et paulo ante apicem punctis 4, exterioribus margini magis approximatis, impressus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum demersum, piceum. Elytra thorace paulo longiora, serie dorsali sat regulari, punctis crebrioribus, interstitiis punctis impressis nullis, rufo-testacea, nitida, circa scutellum picea, margine lateralii nigra. Abdomen apicem versus sensim attenuatum, crebrius fortiter punctatum, fulvo-pubescentis, nigro-piceum, segmentis singulis margine postico rufo-piceo. Pectus nigro-piceum. Pedes rufo-testacei, coxis anticis concoloribus.

Obs. M. prouo affinis at paulo maior et thoracis punctis discoidalibus lateralibus distinctus.

* 6. *M. pronus*: *Elongatus, rufo-testaceus, nitidus, pectore abdomineque nigricantibus, thorace disco laevissimo, elytris punctorum serie dorsali simplice*. — Long. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ lin.

Er. Col. March. I. 414. 5.

Habitat in Germania.

M. lepro minor minusque linearis. Antennae capite sesqui longiores, apicem versus fortiter incrassatae, articulo tertio secundo tenuiore nec longiore, obconico, sequentibus sensim crassioribus, 6—10 fortiter transversis, ultimo subgloboso, apice obtuso, rufo-testaceae, apice fuscescentes, vel fuscace, basi testacea. Caput breviusculum, rufo-testaceum, vertice interdum piceo. Thorax basi coleopterorum prope latitudine, apice duplo fere angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus et basi leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusiusculis, modice convexus, ante apicem punctis quatuor, transversim positis, sat distinctis, impressus, disco laevissimus, rufo-testaceus, nitidus. Elytra thorace parum longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, interstitiis laevissimis, rufo-testacea, nitida. Abdomen apicem versus leviter attenuatum, parce fortiter punctatum, parce griseo-pubescentis, nigro-piceum, nitidum, apice segmentorumque singulorum margine postico rufis. Pectus nigro-piceum. Pedes testacei.

Mas abdominis segmento inferiore sexto apice truncato, antennisque crassioribus cognoscitur.

Variat 1, Elytris circa scutellum et margine laterali nigricantibus. Genuinis plerumque paulo maior, colore saturiore, et antennis minus fortiter incrassatis, praecipue in feminis.

2, Capite, ore excepto, piceo. Elytra saepius ut in var. 1, nonnumquam pone medium macula discoidali fuscescente notata. Genuinis paulo minor.

Obs. Distinguitur corporis statura fere fusiformi, antennis crassis vel crassiusculis, elytrorum serie punctorum dorsali simplice et thoracis disco punctis lateribus nullis, punctis ad apicem impressis autem spatio quodam a margine anteriore remotis.

* 7. *M. nanus*: *Oblongus, niger, nitidus, antennarum basi pedibusque piceis, thorace disco laevissimo, elytris serie punctorum dorsali sesqui-altera*. — Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Er. Col. March. I. 415. 6.

Tachinus nanus Grav. Mon. 28. 8.

Habitat in Germania, Polonia.

Habitu praecedentis omnino, at paulo minor, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque breviores, apicem versus leviter incrassatae, articulo tertio secundo vix longiore, sequentibus sensim paululum crassioribus, penultimis vix transversis, ultimo breviter ovato, apice obtusiusculo, compresso, nigrae, basi piceae. Caput oblongum, ore cum palpis piceo. Thorax basi coleopterorum latitudine, apice duplo angustior, latitudine baseos haud brevior, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, modice convexus, apice punctis quatuor transversim positis impressus, disco laevissimo. Elytra thorace paulo longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, serie intermedia punctis crebrioribus composita, interne punctorum serie accessoria dimidia approximata quasi duplicata, margine apicali piceo. Abdomen apicem versus sensim angustatum, parce subtiliter punctatum, parce griseo-pubescent, segmentis singulis margine postico piceis. Pedes picei.

Variat. Thorace elytrisque piceis, rufo-piceis, vel testaceis: his caput piceum, ore testaceo, antennae testaceae, basi dilutiores, pedes testacei.

Obs. 1. Specimen thorace elytrisque rufo-testaceis pro *Tachini nani* typo benevole communicavit Dom. Prof. Gravenhorst, hoc synonymum igitur indubium, quamvis descriptio anceps videtur: thorax enim punctis 2 dorsibus impressus potius ad *M. lepidum* spectare videtur. Color etiam typi mihi communicati aegre cum descriptione convenient.

2. A praecedente differt statura paulo minore, antennis parum incrassatis, thoracis punctis ad apicem impressis margini anteriori approximatis, elytrorum seriebus crebre punctatis, intermedia quasi duplicata.

* 8. *M. lucidus*: *Oblongus, piceus, nitidus, thorace disco medio laevissimo, elytris dorso vage punctatis*. — Long. 2 lin.

Er. Col. March. I. 415. 7.

Habitat in Germania.

M. lepidum longitudine fere aequalis, at in elytris duplo latior, utrinque attenuatus, fusiformis. Antennae capite duplo longiores, apicem versus le-

viter incrassatae, articulo tertio secundo paulo longiore, sequentibus sensim paululum brevioribus et crassioribus, penultimis etiam autem vix transversis, ultimo breviter ovato, apice compresso, rufo-piceae, basi testaceae. Caput breviusculum, nigro-piceum, nitidum, ore testaceo. Thorax basi coleopterorum fere latitudine, apice duplo angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus modice, basi leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, leviter convexus, longe ante apicem punctis quatuor, transversim positis, impressus, disco laevissimus, rufo-piceus, nitidus, disco nonnunquam nigricante. Scutellum piceum. Elytra thorace sesqui longiora, striis tribus ordinariis subtiliter regulariterque punctatis, interstitio interiore vage punctato, picea, lucida. Abdomen apicem versus sensim attenuatum, nigro-piceum, nitidum, segmentis singulis margine postico rufo-piceo. Pectus nigro-piceum. Pedes rufo-testacei.

Variat minus maturus colore corporis rufo-testaceo.

Obs. Elytris dorso fere 4-seriatim punctatis et thoracis punctis 4 transversalibus medio inter medium et apicem sitis valde distinctus.

* 9. *M. splendidus*: *Elongatus, testaceus, vertice, elytrorum, basi, pectore abdomineque piceis, elytris serie punctorum dorsali simplice*. — Long. $1\frac{1}{2}$ — 2 lin.

Mannerh. Brachelytr. 63. 2. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 505. 4. — Er. Col. March. I. 416. 8.

Tachinus splendidus Grav. Mon. 24. 3.

Tachyporus splendidus Gyll. Ins. Suec. II. 249. 13. — Zetterst. Faun. Lappon. I. 60. 8. Ins. Lappon. I. 55. 10. — Sahlb. Ins. Fenn. I. 295. 13.

Habitat in Europa.

Antennae elongatae, capitis thoracisque longitudine, apice leviter incrassatae, articulo tertio secundo sesqui longiore, 4—10 subobconicis, longitudine subaequalibus et sensim perparum crassioribus, ultimo ovato, testaceae, articulo secundo sequentibusque nonnullis fuscis. Caput elongatum, rufo-testaceum, basi plerumque piceum. Thorax basi coleopterorum fere latitudine, apice dimidio angustior, latitudine baseos paulo brevior, lateribus modice, basi vix rotundatus, angulis posterioribus obtusis, vix rotundatis, leviter convexus, apice punctis quatuor transversim positis notatus, disco laevissimus, testaceus, nitidus. Scutellum piceum. Elytra thorace sesqui prope longiora, punctorum seriebus tribus ordinariis, serie intermedia punctis sat distantibus, testacea, basi plerumque picea. Abdomen apicem versus leviter attenuatum, parce punctatum, undique pilosellum, fuscum, apice segmentorumque singulorum margine lato testaceis. Pectus piceum. Pedes elongati testacei.

Mas abdominis segmento inferiore sexto profunde inciso, quinto margine dense piloso.

Femina abdominis segmento inferiore sexto integro, apice leviter rotundato, quinto simplice.

Variat 1, capite nigro-piceo, ore solo testaceo, elytris basi ultra medium piceis.

2, Corpore rufo-testaceo. Hic genuinis sesqui maior, ceterum autem nullo modo distinctus videtur.

Obs. *M. pallidulus* Mannerh. *Brachelytr.* 63. 3, „*M. splendido minor, angustior, elytrorum striis vix conspicuis et articulo antennarum ultimo breviore*“ vix satis ab hoc differe videtur, forte nonnisi sexu distinctus.

Tanygnathus Er.

Er. Col. March. I. p. 417.

Antennae 11-articulatae.

Palpi maxillares elongati, filiformes.

Elytra pectori longitudine aequalia.

Tarsi 4-articulati.

Corpus oblongum, utrinque attenuatum, alatum. Corpus thoraci immisum, deflexum, oblongum, oculis mediocribus, ovalibus, parum prominulis. Labrum amplum, apice leviter emarginatum, membranaceum. Mandibulae longae, tenues, falcatae, decussatae. Palpi maxillares valde elongati, tenues, articulo primo minuto, reliquis tribus inter se longitudine aequalibus, ultimo acuminato. Palpi labiales articulo primo secundo paulo breviore, hoc cylindrico, tertio hoc paulo breviore, tenui, acuminato. Antennae capite thoraceque longiores, subrefractae, filiformes, apicem versus haud incrassatae, articulis cylindricis, primo leviter elongato, 2—10 subaequalibus, ultimo iterum paulo longiore, apice acuminato. Thorax transversus, basi coleoptera amplectens, apicem versus angustatus. Scutellum sat magnum, triangulare. Coleoptera apice coniunctim leviter late emarginata, ad angulum exteriorem profundius excisa. Abdomen apicem versus angustatum, pilosellum. Pedes breviusculi, validiusculi, intermedii basi approximati, coxis posticis parvis, angustis, interne scuti instar productis, femorum insertionem obtegentibus, tibiis parce spinulosis, tarsis 4-articulatis, omnibus simplicibus, articulo primo modice elongato, quarto haud breviore, sequentibus duobus sensim minoribus, quarto tenui.

Observationes.

1. Oris structuram accuratius examinare nondum mihi contigit, genus autem satis distinctum, mandibulis elongatis, falciformibus, decussatis a reliquis huius tribus discedens, habitu intermedium inter *Tachyporum* et *Heterothopem*, elytris pectore non longioribus, apice ad angulum exteriorem profunde sinuatis *Oxyopodam* quodammodo referens.

2. Caput et thorax laevissima, glaberrima, polita, hoc punctorum pari uno altero notato; scutellum, elytra et abdomen punctata et pubescencia.

3. Sexus differentia latet.

4. De victu nihil constat.

* 1. *T. terminalis*: *Niger, nitidus, thorace piceo, palpis, pedibus elytrorumque margine postico rufis, antennis elongatis, nigris, articulo primo testaceo.* — *Long. 1 $\frac{3}{4}$ lin.*

Tab. 1. f. 4.

Er. Col. March. I. 418. 1.

Habitat Berolini, rarissimus.

Antennae capite thoraceque longiores, nigrae, apice fuscescentes, articulo primo testaceo. Oris partes testaceae. Caput laevissimum, nigrum, nitidum. Thorax basi coleopterorum latitudine, antrorsum angustatus, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, latitudine baseos

paulo brevior, transversim convexus, dorso medio utrinque puncto singulo impressus, ceterum laevissimus, nitidus, disco nigro-piceo, margine laterali basalique late rufo-piceis. Scutellum confertim subtiliter punctatum, tenuiter pubescens, nigrum. Elytra thorace paulo longiora, confertim subtiliter punctata, pube tenue depressa grisea densius vestita, nigra, parum nitida, margine apicali tenui rufo. Abdomen minus subtiliter minusque dense punctatum, minus subtiliter griseo-pubescentia, pilis raris rigidis nigris sparsum, nigrum, subnitidum, segmentis singulis rufo-marginatis. Pectus nigrum. Pedes rufo-testacei, coxis anticis concoloribus.

* 2. *T. collaris*: *Niger, nitidus, thorace, scutello palpis pedibusque rufo-testaceis, antennis testaceis, medio fuscis.* — *Long. 1 $\frac{3}{4}$ lin.*

Habitat in Guyana Venezuelensi, Dom. Moritz.

Statura omnino praecedentis, at paulo minor. Antennae capitis thoracisque longitudine, articulo primo testaceo, sequentibus fuscis, ultimis 3 vel 4 ferrugineis. Oris partes pallide testaceae. Caput nigrum, nitidum. Thorax basi coleopterorum latitudine, apicem versus leviter angustatus, basi et lateribus leviter rotundatus, angulis posterioribus obtusis, latitudine parum brevior, transversim convexus, dorso medio et apice utrinque puncto singulo impressus, ceterum laevissimus, rufo-testaceus, nitidus. Scutellum confertim subtiliter punctatum, rufo-testaceum. Elytra thoracis longitudine, confertim subtiliter punctata, pube subtili depressa cinerea vestita, nigra, parum nitida, margine apicali rufescente. Abdomen creberrime subtilius punctatum, fortius densiusque griseo-pubescentia, nigro-piceum, subnitidum, segmentorum marginibus rufo-piceis. Pectus piceum. Pedes testacei, coxis anterioribus concoloribus.

Variat thorace piceo, marginibus piceo-rufis.

3. *T. laticollis*: *Rufo-piceus, nitidus, capite, thoracis disco elytrisque nigro-piceis, thorace coleopteris latiore.* — *Long. 2 lin.*

Habitat in Amer. mer. ins. St. Vincentii, Mus. Dom. Hope.

Antennae capite thoraceque longiores, testaceae, apice flavae. Oris partes pallide testaceae. Caput laevissimum, fusco-piceum, nitidum. Thorax basi coleopteris multo latior, apicem versus fortiter angustatus, basi modice, lateribus fortiter rotundatus, angulis posterioribus rotundatis, latitudine baseos plus dimidio brevior, leviter transversim convexus, dorso ante medium et prope basin utrinque puncto singulo minuto subtilique impressus, punctis posterioribus multo magis distantibus, ceterum laevissimus, piceus, nitidus, margine omni rufescente. Scutellum parce subtilissime punctatum, piceum. Elytra thorace paulo breviora, parcus subtiliter obsoleteque punctata, tenuiter subtiliterque pubescentia, margine laterali nigro-pilosello, picea, nitida, margine summo apicali rufescente. Abdomen crebrius subtiliter punctatum, longius griseo-pubescentia, piceo-rufum, nitidulum. Pectus piceo-rufum. Pedes testacei, femoribus anticis basi lineola longitudinali nigra.

Pedes plerumque breviusculi, coxis anticis exsertis, conicis, posticis subconicis, trochanteribus posticis simplicibus, tibiis vel omnibus vel posterioribus saepius spinulosis, spinis apicalibus validioribus, tarsis 5-articulatis, anticis saepe dilatatis.

Sexus differentia plerumque abdominis segmento inferiore sexto maris apice emarginato vel inciso, feminae rotundato integroque obvia; tarsi antici etiam maris saepe magis quam feminae dilatati.

O b s e r v a t i o .

Remotis Lathrobii, quae stigmatibus prothoracis occultis et antennarum insertione differunt, haec tribus cum sectione Brachelytrorum fissilabrum Latreillei et Mannerheimii convenit, at characterem a labro derivato relinquendum putavi, in nonnullis generibus et speciebus (e. g. Quedio molochino) omnino obsoletum. Cum genere Staphylino Gravenhorstii autem exactissime congruit tota haec tribus, antennarum insertione et stigmatibus prothoracis conspicuis a reliquis satis determinata.

Subtribus prima.

Xantholoniini.

Stigmata prothoracica detecta.

Antennae basi inter se non magis quam ab oculis distantes.

Labrum transversum, bilobum, lateribus coriaceum membranaceumve plerisque;

totum corneum, bilobum *Sterculiae*;

totum corneum, sexdentatum *Scytalino*;

integrum, apice membrana elongata porrecta biloba auctum *Platyprosopo*.

Mandibulae plerumque haud prominentes.

Maxillae mala exteriore coriacea, oblonga, apice haud dilatata *Platyprosopo*, *Othio*, *Sterculiae*;

apice extrorsum leviter dilatata et praeter barbam introrsum vergentem setosa *Holiso*, *Diocho*, *Xantholino*, *Leptacino*;

segmento inferiore corneo apice extrorsum fortiter dilatato *Scytalino*.

Palpi maxillares filiformes *Platyprosopo*, *Othio*, *Sterculiae*, *Scytalino*, *Xantholino*;

articulo ultimo subulato *Holiso*, *Diocho*, *Leptacino*.

Ligula minuta, integra, rotundata *Othio*, *Holiso*, *Sterculiae*, *Scytalino*, *Xantholino*;

minuta, rotundata, medio incisa *Diocho*, *Leptacino*;

magna, biloba *Platyprosopo*.

Paraglossae ligula multo longiores, ciliatae plerisque;
nullae *Platyprosopo*.

Palpi labiales filiformes *Platyprosopo*, *Othio*, *Xantholino*;

articulo ultimo securiformi *Sterculiae*, *Scytalino*;

articulo ultimo subulato *Holiso*, *Diocho*, *Leptacino*.

Antennae rectae *Platyprosopo*, *Othio*, *Holiso*, *Diocho*;

fractae *Sterculiae*, *Scytalino*, *Xantholino*, *Leptacino*.

Tribus tertia.

Staphylini.

Stigmata prothoracica conspicua.

Antennae in frontis margine anterieore insertae.

Labrum plerisque bilobum, saepius limbo exteriore membranaceo coriaceo, piloso.

Mandibulae magis minusve prominentes, falcatae, acutae, medio saepe dentatae, basi lacinia membranea libera, interne ciliata instructae.

Maxillae cardine stipiteque corneis, malis membranaceis coriaceisve, interiore interne, exteriore apice fortius barbatis.

Palpi maxillares 4-articulati, articulo primo minuto, secundo tertio magis minusve elongatis, quarto his subaequali vel securiformi vel subulato.

Mentum breve, corneum.

Labium membranaceum, exsertum.

Ligula membranea membranaceave, minuta, iam biloba, iam integra, paraglossis magnis multo breviore plerisque;

sat magna, biloba, paraglossis nullis *Platyprosopo*, *Oxyporo*.

Palpi labiales omnibus triarticulati.

Antennae in capitibus margine anterieore intra mandibularum basin insertae, 11-articulatae, articulis 3 primis reliquis paulo magis elongatis, filiformes, vel apicem versus sensim paulo crassiores.

Oculi laterales, parum prominentes.

Caput exsertum, saepius porrectum, basi magis minusve constrictum.

Thorax basi lateribusque marginatus, apice truncatus, margine posteriore rotundato coleopterorum basi applicatus.

Prosternum triangulare, spatio pone coxas membraneo.

Scutellum triangulare.

Elytra pectoris longitudine.

Abdomen marginatum, segmentis sex distinctis, septimo saepius conspicuo, stylis analibus plerumque exsertis.

*Caput collo quasi tenui brevique thoraci affixum plerisque;
basi modice constrictum, thoraci insertum Othio;
basi haud aut leviter constrictum, thoraci insertum Platyprosopo.*

*Thorax oblongus, apice truncatus plerisque;
oblongus vel elongatus, apice attenuatus Sterculiae;
trapezoideus Holiso.*

*Elytra sutura integerrima Platyprosopo, Othio, Holiso, Diocho;
sutura imbricata Sterculiae, Scytalino, Xantholino, Leptacino.*

Abdomen elongatum, plerisque lineare.

Pedes breviusculi plerisque;

elongati Sterculiae;

*intermedii basi approximati Platyprosopo, Othio, Holiso, Diocho,
Leptacino * et ***;*

*basi distantes Sterculiae, Scytalino, Xantholino, Leptacino ** et ***;
tibiis omnibus spinulosis Othio, Holiso, Diocho;*

anticis externe incrassatis et muricato-spinulosis, Scytalino, Xantholino, Leptacino;

anticis inermibus Platyprosopo;

omnibus inermibus vel subtilissime spinulosis Sterculiae;

tarsis breviusculis,

*anticis simplicibus Holiso, Sterculiae, Scytalino, Xantholino,
Leptacino * et **;*

*anticis dilatatis Platyprosopo, Othio, Diocho, Leptacino *** et ****.*

Observationes.

1. Antennarum structura et elytrorum sutura in duas sectiones haec subtribus dividi potest, altera antennis rectis et elytrorum sutura integerrima Platyprosopum, Othium, Holisum et Diochum, altera antennis fractis et elytrorum sutura imbricata Sterculiam, Scytalimum, Xantholimum et Leptacimum continente. Exceptis paucis Leptacini speciebus genera illa coxis intermediis approximatis, haec coxis intermediis distantibus conveniunt. Platyprosopus labri ligulaeque structura magis forte discrepat.

2. Corpus plerumque magis quam in Staphylininis genuinis elongatum, a quibus haec subtribus praecipue antennarum insertione distinguitur.

* Antennae rectae. Elytrorum sutura integerrima.

Platyprosopus Mannerh.

Mannerh. Brachelytr. p. 36.

Antennae rectae.

Ligula biloba; paraglossae nullae.

Palpi omnes filiformes.

Corpus elongatum, alatum. Caput sat magnum, thoracis fere latitudine, porrectum, basi haud constrictum, oculis parvis, haud prominulis. Labrum (t. IV. f. 25. c.) transversum, membrana biloba, antrorsum producta auctum, lobis acuminatis. Mandibulae sat validae, medio bidentatae. Maxillae (t. IV. f. 25. b.) mala interiore membranacea, interne barbata, exteriore elongata, portione basali cornea, apicali membranacea, apice barbata. Palpi maxillares articulo primo breviore, reliquis longitudine subaequalibus. Labium (t. IV. f. 25. a.) mento transverso, ligula sat elongata, membranacea, biloba,

lobis margine interiore ciliatis, paraglossis nullis. Palpi labiales articulo primo secundoque leviter obconicis, hoc paulo maiore, tertio iterum paulo maiores, apice truncato. Antennae basi ab oculis magis quam inter se distantes, rectae, apicem versus sensim attenuatae, articulo primo leviter elongato, secundo obconico, sequentibus sensim leniter decrementibus, ultimo apice oblique truncato submarginatoque. Thorax coleopteris latitudine aequalis vel amplior, basi lateribusque rotundatus. Scutellum sat magnum, triangulare. Elytra apice oblique introrsum truncata, sutura integerrima. Abdomen elongatum, apice attenuatum. Pedes breviusculi, validiusculi, tibiis posterioribus spinulosis, anticis dense pubescens, tarsis anticis dilatatis, posterioribus articulo primo elongato, sequentibus tribus triangularibus, sensim paululum minoribus.

Observationes.

1. Capite basi haud constricto et thorace ampliore ad Tachyporinos habitu, oris structura quodammodo ad Oxytelinos et Omalinos accedit, stigmatibus autem prothoracis detectis conspicuis et antennarum insertione ab iis distinguuntur. Corporis habitu Xantholininos cum Tachyporinis coniungit.

2. In hac subtribu hoc genus valde insigne labro haud sinuato, processu membraneo valde elongato bilobo aucto, et ligula biloba, paraglossis omnino nullis, qua nonnisi cum Oxyphoro, generi altero hanc tribum terminante, congruit.

3. Mas abdominis segmento inferiore sexto apice emarginato, femina rotundato distinguuntur.

* 1. *P. beduinus: Niger, fusco-pubescent, capite thoraceque glabris, pedibus rufis. — Long. 6½ — 9 lin.*

Nordm. Symb. 133. 1.

Habitat in Nubia, Dom. Prof. Ehrenberg.

Corpus elongatum, subdepressum, nigrum, nitidum, capite thoraceque nitidis. Antennae capite thoraceque paulo breviores, articulo secundo tertio dimidio breviore, rufo-piceae, apice dilutiores, articulo secundo nigritante. Oris partes rufae. Caput magnum, coleopterorum latitudine, subovatum, supra parum convexum, versus latera dense subtiliter, medio parcus subtilissime punctatum, utrinque punctis paucis maioribus sparsum et puncto singulo grossiusculo notatum, glabrum, lateribus et infra confertissime punctatum, fusco-pubescent. Thorax capite et coleopteris latior, latitudine tertia parte brevior, basin versus subangustatus, lateribus leviter rotundatis, basin versus subsinuatis, basi leviter rotundatus, apice truncatus, angulis posterioribus obtusis, anterioribus rectis, leviter deflexis, leviter transversim convexus, confertim subtilissime punctatus, medio utrinque intermedium et latera puncto singulo grossiusculo notatus, glaberrimus. Elytra thorace tertia parte breviora, subdepressa et scutellum confertissime subtiliter punctata, pube depresso-fusco-grisea densius vestita. Abdomen coleopteris paulo angustius, apicem versus sensim attenuatum, confertissime subtiliter punctatum, punctis rarissimis maioribus sparsum, pube depresso-fusca dense obductum, parce pilosum, segmento quinto margine apicali, sexto supra apice, infra toto, septimoque obscure rufis. Pedes rufi, coxis anticis concoloribus.

* 2. *P. elongatus*: *Niger, griseo-pubescent, thorace glabro coleopterorum latitudine, his antennis pedibusque rufis.* — *Long. 6 lin.*

Mannerh. Brachelytr. 36. 1. — Nordm. Symb. 154. 2.

Habitat Grusia, Dom. Marschall a Bieberstein, in Chersoneso Taurica, Dom Schüppel.

Elongatus, subdepressus, niger. Antennae capite thoraceque paulo breviores, articulo tertio secundo sesqui longiore, dilute rufi. Oris partes rufae. Caput thoracis latitudine, oblongum, lateribus subrectis, supra leviter convexum, creberrime subtilius punctatum, linea tenui media longitudinali laeviore, pube depressa grisea densius vestitum. Thorax coleopteris vix latior, latitudine sesqui prope longior, lateribus vix rotundatis, pone medium subsinuatus, basi modice rotundatus, apice truncatus, angulis posterioribus subrotundatis, anterioribus rectis, parum convexus, parce subtilissime punctatus, punctorum maiorum seriebus quatuor longitudinalibus notatus, seriebus intermediis 5—6-, lateralibus 3-punctatis, glaberrimus, limbo laterali confertissime subtiliter punctato, griseo-pubescente. Elytra thorace paulo longiora et scutellum testaceo-rufa, dense subtiliter punctata, pube depressa fulvescenti-grisea obducta. Abdomen elongatum, dense subtiliter punctatum, segmentis singulis margine apicali, ultimo apice latiore rufo-piceis. Pectus rufo-piceum. Pedes cum coxis anterioribus rufi.

Othius Leach.

Steph. Illustr. V. p. 253. — Er. Col. March. I. p. 420.

Cafius Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. p. 411.

Antennae rectae.

Ligula integra; paraglossae lineares.

Palpi omnes filiformes.

Corpus mediocre, elongatum, lineare, alatum. Caput subovale, basi modice constrictum, collo brevi angusto thoraci insectum, oculis parvis, rotundatis, haud prominulis. Labrum angustum, transversum, medio incisum. Mandibulae breves, medio obtuse dentatae. Maxillae (t. IV. f. 24. b.) mala interiore ampliore membranacea, interne barbata, exteriore tenuiore, basi cornea, subcylindrica, apice coriacea, barbata. Palpi maxillares articulo primo minuto, secundo tertioque longitudine subaequalibus, quarto minore, subacuminato. Labium (t. IV. f. 24. a.) mento transverso, ligula rotundata, integra, membranea, paraglossis divergentibus, membranaceis, interne ciliatis, ligulam superantibus. Palpi labiales articulis sensim paulo longioribus, ultimo apice subacuminato. Antennae basi ab oculis totidem atque inter se distantes, breviusculae, filiformes, rectae, articulo primo modice elongato, secundo tertioque obconicis, ultimo ovato-subacuminato. Thorax oblongus, basi rotundatus, apice truncatus. Scutellum triangulare, Elytra apice truncata, sutura integerrima. Abdomen lineare. Pedes breves, coxis intermediis contiguis, tibiis spinulosis, tarsis posterioribus articulo primo leviter elongato, anticis articulis 4 primis dilatatis, subtus spongioso-tomentosis.

Observationes.

1. A Xantholinis, quibuscum a plerisque auctoribus coniungitur, hoc genus distinctum antennis rectis, elytrorum sutura integerrima, coxis intermediis approximatis et tarsis anticis dilatatis.

2. Dom. *Lacordaire* recte quidem hoc genus a Xantholino distinxit, nomine autem Caffii, ab Anglis auctoribus aliis huius tribus speciebus tributo, errore quadam inductus, usus est. Com. Dejean in recentissimo collectionis sua Catalogo idem hoc genus nomine *Sauriodes* distinxit, nomen autem Anglis prius usitatum praevalere debet.

3. Mas abdominis segmento sexto subtus apice leviter emarginato, femina rotundato distinguuntur.

4. Victor in silvis sub musco, foliis deciduis lapidibusque et sub cortice truncorum emortuorum.

* 1. *O. fulvipennis*: *Niger, nitidus, antennis, pedibus, ano elytrisque rufis, his punctulatis.* — *Long. 4½ — 5½ lin.*

Er. Col. March. I. 420. 1.

Paederus fulvipennis Fab. Ent. Syst. I. II. 537. 4. Syst. El. II. 609. 4. — Panz. Ent. Germ. 362. 5. Faun. Germ. 27. 3.

Staph. fulgidus Payk. Mon. Staph. 22. 14. Faun. Suec. III. 377. 14.

Staph. fulminans Grav. Micr. 47. 70. Mon. 105. 107. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX* 332. 89. — *Gyll. Ins. Suec. II.* 357. 72. — *Sahlb. Ins. Fenn. I.* 334. 71.

Gyrohypn. fulminans Mannerh. Brachelytr. 33. 9. — *Runde Brachelytr. Hal. 11. 7.* — *Nordm. Symb. 119. 14.*

Cafius fulminans Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris. I. 411.

Staph. fulvopterus Fourcr. Ent. Par. I. 167. 11. (forte)

Le Staph. à étuves marons pointillés Geaffr. Hist. Ins. I. 365. 11. (forte)

Staph. ustulatus Grav. Micr. 46. 69. — *Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. IX.* 332. 88.

Habitat in Europa.

Elongatus, linearis, niger, nitidus. Antennae capite paulo longiores, articulo tertio secundo sesqui longiore, 4—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, pilosellae, rufae. Palpi rufi. Caput thoracis latitudine, oblongum, antrorsum subangustatum, angulis posterioribus fortiter rotundatis, supra parum convexus, utrinque supra oculos parce vaseque punctatum, sulculis duobus anticis inter antennas leviter convergentibus, lateralibusque obliquis ante oculos brevioribus obsoletioribusque notatum, inter oculos medio obsolete transversim impressum. Thorax coleopteris perparum angustior, latitudine sesqui longior, basin versus haud angustatus, lateribus pone medium subsinuatus, apice truncatus, angulis anterioribus deflexis, subrotundatis, dorso punctis utrinque tribus, duobus versus apicem, tertio pone medium impressus, versus margines plerumque rufescens. Scutellum laeve. Elytra vix thoracis longitudine, parcus punctata, parce subtiliterque cinereo-pubescentia, rufa, nitida. Abdomen minus crebre subtiliter punctulatum, tenuiter griseo-pubescentia, segmentis singulis margine apicali, et subtus segmento ultimo toto rufis. Pedes cum coxis rufi.

Variat thorace etiam rufo, interdum medio picecente, capite, pectore, abdominisque segmentorum singulorum basi rufo-piceis.

Obs. Staph. ustulatus Grav. specimen est coleopteris disco nigricantibus (conf. Grav. Mon. p. 106.).

* 2. *O. melanocephalus*: *Piceus, capite nigro, thorace antennis pedibusque testaceis, elytris punctatis, thorace paulo brevioribus.* — *Long. 2½ lin.*

Er. Col. March. I. 421. 2.

Staph. melanocephalus Grav. Mon. 107. 111. — *Gyll. Ins. Suec. II.* 360. 74. — *Sahlb. Ins. Fenn. I.* 336. 73.

Gyrohypn. melanocephalus Mannerh. *Brachelytr.* 34. 15. — *Nordm. Symb.* 120. 21.

Habitat in Europa.

Antennae capite paulo longiores, articulo tertio secundo sesqui longiore, 4—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, testaceae. Os rufo-testaceum. Caput thorace paulo angustius, oblongo-ovatum, supra leviter convexum, utrinque supra oculos parce vage punctulatum, sulculis duobus anticis inter antennas profundioribus, subparallelis, lateralibus obliquis ante oculos omnino fere obsoletis, fronte punctis 4 quadratim positis impressa, nigrum, nitidum. Thorax coleopteris perparum angustior, latitudine sesqui longior, basin versus haud angustatus, lateribus pone medium vix sinuatis, apice truncatus, angulis anterioribus deflexis, leviter rotundatis, dorso utrinque punctis duobus, altero ante, altero pone medium, testaceus, nitidus. Scutellum nigrum, laeve. Elytra thorace paulo breviora, fusco-picea, nitida, parcus profundius punctata. Abdomen subtilissime punctulatum, subtiliter parceque pubescens, piceum, nitidum, subtus segmentorum marginibus apiceque testacei. Pectus piceum. Pedes cum coxis testacei.

* 3. *O. punctipennis*: *Niger, nitidus, pedibus testaceis, elytris punctatis, thorace paulo longioribus.* — *Long. 2½ lin.*

Staph. punctipennis Boisd. et Lacord. *Faun. Ent. Paris.* I. 409. 44.

Habitat in Austria, Helvetia, Italia, Gallia; Anglia.

Statura et summa similitudo praecedentis, niger, nitidus. Antennae capite sesqui longiores, apicem versus haud incrassatae, articulo secundo tertioque aequalibus, 4—10 sensim paulo brevioribus at vix crassioribus, penultimis leviter transversis, obscure ferrugineae, articulis tribus primis nigris. Os piceum. Caput vix thoracis latitudine, subovatum, supra parum convexum, supra oculos utrinque parce punctatum, fronte punctis quatuor quadratim positis notata, sulculis duobus anticis inter antennas parallelis, minus profundis licet sat distinctis, lateralibus ante oculos omnino nullis. Thorax ut in praecedente omnino, at nigerrimus, et puncta in dorso utrinque impressa paulo magis distantia. Scutellum laeve. Elytra thorace paulo longiora, profundius punctata, parce griseo-pubescentia, nigro-picea, margine apicali piceo-testaceo. Abdomen subtilissime parce punctulatum, tenuiter griseo-pubescentia. Pedes testacei, coxis posterioribus nigris.

Obs. 1. Praecedenti admodum affinis, praeter colorem autem antennarum articulis 2 et 3 aequalibus, capite minus oblongo, et elytris longioribus sat distinctus.

2. Nomine Othii laeviusculi Kirby (Steph. Illustr. V. 255. 8.) ex Anglia a Dom. Rudd benevole communicatus.

* 4. *O. pilicornis*: *Niger, nitidus, antennis pedibusque piceis, elytris laevis, stria suturali impressa.* — *Long. 3 lin.*

Er. Col. March. I. 421. 3.

Staph. pilicornis Payk. *Mon. Car. App.* 335. 14—15. *Faun. Suec.* III. 379. 16. — *Schrank Faun. Boic.* I. 642. 868. — *Gyll. Ins. Suec.* II. 359. 73. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 335. 72.

Xantholinus pilicornis Zetterst. *Faun. Lappon.* I. 81. 3. *Ins. Lappon.* 66. 5.

Gyrohypn. pilicornis Mannerh. *Brachelytr.* 34. 10. — *Nordm. Symb.* 119. 16.

Var. b: Rufus, capite, elytris abdominisque segmentis duobus penultimis nigro-piceis.

Staph. pilicornis var. b Payk. *Faun. Suec.* III. 379. 16. — *Gyll. Ins. Suec.* II. 359. 73. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 335. 72.

Gyrohypn. pilicornis var. b Mannerh. *Brachel.* 34. 10.

Staph. alternans Grav. *Micr.* 48. 72. *Mon.* 107. 109. — *Latr. Hist. nat. Crust.* et *Ins.* IX. 333. 91.

Gyrohypn. alternans Mannerh. *Brachelytr.* 34. 12. — *Runde Brachelytr.* Hal. 12. 8. — *Nordm. Symb.* 119. 16.

Gyrohypn. nigriceps Mannerh. *Brachelytr.* 34. 11. — *Nordm. Symb.* 120. 17.

Var. c: Fusco-rufescens, subtus dilutior, capite picecente.

Staph. pilicornis var. Payk. Faun. Suec. III. 380. 16. — *Gyll. Ins. Suec.* II. 359. 73. — *Sahlb. Ins. Fenn.* I. 335. 72.

Xanth. pilicornis var. b Zetterst. *Ins. Lappon.* 66. 5.

Staph. affinis Payk. *Mon. Staph.* 24. 16.

Habitat in Suecia, Germania, sub cortice Pinuum.

Linearis, subdepressus. Antennae capite sesqui longiores, apicem versus leviter incrassatae, articulo tertio secundo vix longiore, 4—10 sensim crassioribus, 6—10 crassis, transversis, ultimo conico, rufo-piceae vel rufae, pilosellae. Palpi rufi. Mandibulae prominentes, rufo-piceae. Caput thorace latius, subquadratum, angulis posterioribus fortiter rotundatis, convexum, laeve, punctis subtilibus 4 inter oculos nonnullisque aliis in fronte impressum, sulcis duobus anticis inter antennas minus profundis, parallelis, apice obsoletis, lateralibus ante oculos omnino nullis, nigro-piceum, nitidum. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine sesqui longior, lateribus subrectis, angulis anterioribus leviter rotundatis, leviter convexus, puncto unico utrinque in medio dorsi, unoquo maiore angulos anteriores versus notatus. Elytra thoracis longitudine, laevia vel parce subtiliterque obsoletissime punctulata, stria suturali impressa. Abdomen laeve. Pedes rufo-testacei.

Variat colore corporis vel nigro-piceo, vel rufo-testaceo, capite elytrisque nigro-piceis et abdominis segmento quarto quintoque fuscis, vel interdum corpore toto testaceo, capite solo magis minusve picecente. Var. secunda apud nos frequentior occurrit.

Obs. *Gyrohypnus nigriceps* Mannerheim statura paulo maiore et capite latiore specie haud satis distinctus.

Species mihi invisa.

5. *O. macrocephalus*: *Piceus, nitidus, palpis, antennis, capite postico segmentorumque marginibus rufescens, elytrorum dimidia parte anteriore pedibusque rufo-testaceis, thorace utrinque 3-punctato.* — *Long. 2 lin.*

Gyrohypnus macrocephalus Nordm. *Symb.* 124. 26.

Habitat in America boreali occidentali, ad littora ins. Sitchae a cel. Eschscholtz lectus.

Antennae capite longiores, ex rorsum sat distincte crassiores, rufae, longius pilosae. Palpi rufescentes. Caput thorace latius, quadratum, antice vix angustatum, supra convexum, nigrum, basi, praesertim lateribus, piceo-

rufescens, nitidum, angulis verticis et regione ophthalmica punctis nonnullis impressum, in antice frontis inter antennas foveola, certo situ conspicua, infra rufescens, glabrum (?), tenue pubescens (?). Clypeus valde angustus, pallide flavescens, labro rufo-ferrugineo. Collum nigro-piceum, nitidum, laeve. Thorax antice subrotundatus, paulo latior quam basi, angulis modice deflexis, lateribus subobliquis, basi attenuatus, postice fere truncatus, supra convexus, nigro-piceus, nitidus, laevis, antice ad latus prope marginem utrinque punctum unum maiuscum, paulo ab eo in disco puncta duo remota, quorum ultimum obsoletum. Scutellum parvum, apice subacuminatum, nigro-piceum, impunctatum. Elytra thorace paulo latiora, sed vix longiora, supra minus convexa, nitida, antice laete flavo-testacea, dimidia parte posteriore nigra, superficie laevis vel vix conspicue punctulata. Abdomen elytris triplo longius, nigrum, nitidum, vix pubescens, segmentorum marginibus, praesertim infra et ano rufo-ferrugineis. Pedes pallide flavescentes. — O. pilicorni similis, differt thorace et elytris paulo angustioribus, colore etc. (Nordm.)

Holisus Er.

Antennae rectae.

Ligula rotundata, integra, brevissima; paraglossae amplae.

Palpi omnes articulo ultimo subulato.

Corpus elongatum, lineare, valde depresso, alatum. Caput sat magnum, quadratum, angulis rotundatis, basi profunde constrictum, collo quasi brevi tenui thoraci affixum, exsertum, porrectum, oculis parvis, rotundatis, haud prominulis. Labrum transversum, bilobum. Mandibulae apice adunciae, medio obtuse dentatae. Maxillae (t. IV. f. 23. b.) mala interiore membranacea, introrsum barbata, exteriore segmento primo triangulari, corneo, altero membraneo, barbato. Palpi maxillares leviter elongati, articulo primo minuto, brevi, secundo tertioque longitudine subaequalibus, hoc apicem versus sensim leviter incrassato, quarto tenui, subulato. Labium (t. IV. f. 23. a.) mento brevi, transverso, ligula brevissima, ultra palporum insertionem haud prominente, paraglossis sat prominulis, acuminatis, membranaceis, pubescentibus. Palpi labiales articulo primo cylindrico, modice elongato, secundo hoc paulo breviore, ultimo praecedenti longitudine aequali, at tenui acutoque. Antennae aequae ab oculis atque inter se distantes, filiformes, rectae, articulo primo reliquis maiore, obconico, incurvo, apicem versus sensim subincurvatae, articulo ultimo ovato. Thorax quadrangulus, angulis rotundatis, basin versus angustatus, basi truncatus, apice utrinque oblique truncatus. Scutellum triangulare. Elytra apice truncata, sutura integerrima. Abdomen lineare, subtilius marginatum. Pedes breves, coxis intermediis contiguis, tibiis omnibus subtiliter spinulosis, tarsis brevibus, articulis 4 primis subaequalibus, crassiusculis, quinto brevi, tenui, unguiculis tenuibus, elongatis, tarsis anticis simplicibus.

Observationes.

1. Corpore valde depresso, plano Achenio assimilis, at huius tribus, oris structura Xantholino propinquus, at sutura elytrorum integerrima, ligula brevissima, paraglossae ampliores, et palporum utrorumque articulus ultimus subulatus a Leptacino ligula integra distinctus: Othio antennis rectis propior, at para-

glossis amplis, ligula brevissima, maxillarum mala exteriore apice dilatata, palporum articulo ultimo subulato et tarsis anticis simplicibus diversus.

2. Sexus differentia latet.

3. Species omnes ex America meridionali allatae. De victu earum nihil comperfum.

* 1. *H. humilis:* *Niger, nitidus, antennis pedibusque piceis, capite thoraceque vase punctatis, linea media longitudinali laevi.* — Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in Brasilia.

Piceo-niger, nitidus. Antennae capite paulo longiores, articulo secundo tertioque subaequalibus, 5 — 10 sensim paulo crassioribus, ultimo ovato, apice abrupte acuminato, nigro-picei, basi dilutiores. Palpi rufo-testacei. Caput thorace multo maius, coleopterorum latitudine, oblongo-subquadratum, angulis posterioribus obtusis, subrotundatis, punctis profundioribus aequaliter sparsum. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine antica vix brevior, basin versus angustatus, lateribus leniter rotundatus, ante basin subsinuatus, basi leviter rotundatus, apice utrinque oblique truncatus, angulis anterioribus rotundatis, posterioribus obtusis, planus, supra punctis parcis sparsisque subtilioribus impressus, linea media longitudinali laevi. Elytra thorace tertia parte longiora, dense subtilius punctata, tenuiter griseo-pubescentia. Abdomen parcius minus subtiliter punctatum, tenuiter griseo-pubescentis, segmento ultimo apice piceo. Pedes picei.

* 2. *H. analis:* *Niger, nitidus, ano rufo, femoribus piceis, capite thoraceque utrinque parce punctatis.* — Long. $3\frac{1}{2}$ lin.

T. 1. f. 5.

Habitat prope Caracas Columbiae, Dom. Moritz.

Habitu omnino praecedentis, at multo maior, niger, nitidus. Antennae capite plus sesqui longiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 4—10 sensim paulo brevioribus et crassioribus, ultimo ovato, apice abrupte acuminato, pilosellae, nigrae. Palpi rufo-picei. Caput thoracis latitudine, subquadratum, angulis posterioribus subrotundatis, supra punctis rarioribus vagis profundis impressum, secundum marginem lateralem punctorum serie sat regulari notatum. Thorax latitudine anteriore paulo brevior, basin versus angustatus, basi truncatus, apice utrinque oblique truncatus, lateribus leviter rotundatus, angulis omnibus obtusis, planus, dorso utrinque punctis rarioribus vagis profundis impressus. Elytra thorace sesqui longiora, plana, dense subtiliter punctata, tenuiter griseo-pubescentia. Abdomen sat crebre minus subtiliter punctatum, tenuiter pubescentis, lateribus parce pilosellum, segmento ultimo apice dimidiato-testaceo. Pedes picei, tibiis nigricantibus.

3. *H. debilis:* *Piceus, nitidus, antennarum basi, pedibus, elytris anoque testaceis, thorace utrinque capiteque nigro crebrius punctatis.* — Long. 2 lin.

Habitat in Americae meridionalis ins. St. Johannis, Dom. Moritz.

Statura omnino H. humilis, at paululum maior. Antennae capite paulo longiores, rufo-piceae, articulis duobus primis testaceis. Os rufo-piceum, palpis testaceis. Caput thorace paulo latius, subquadratum, angulis posterioribus leviter rotundatis, planum, crebrius sat profunde vase punctatum, fronte