

25) RAPID #  
-473174



-473174

BORROWER  
KKU



129.237.44.35

System Date/Time: 09/16/2004 11:53:20

---

**CALL #: QL571 K83**  
**LOCATION: gen**

TYPE: Article  
USER JOURNAL TITLE: Koleopterologische Rundschau  
OCLC JOURNAL TITLE: Koleopterologische Rundschau  
IWA CATALOG TITLE: Koleopterologische Rundschau  
ARTICLE TITLE: Scheerpeltz, O.: Studien and den palaarktischen Arten der Gattung  
Myrmecopora...  
VOLUME: 50  
NO:  
YEAR: 1972( 1972)  
COPYRIGHT: CCL  
PAGES: 93-109 *SPFH9110*  
ISSN: 0075-6547  
OCLC #:  
VERIFIED:

PATRON: makranczy,gyorgy  
PATRON ID: 0  
PATRON PHONE:  
PATRON DEPT: Biology  
PATRON STATUS: grad  
PATRON FAX:  
PATRON ADDRESS:  
PATRON E-MAIL:  
PATRON NOTES:

Koleopterologische Rundschau, Band 50 (1972)

Studien an den paläarktischen Arten der Gattung  
MYRMECOPORA Saulcy (COL. STAPHYLINIDAE).

(125. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden)

von Otto SCHEERPELTZ

Manuskript eingelangt am 12. Mai 1971

Zunächst ein kurzer Überblick über die Geschichte der Gattung und der Arten.

Die Gattung *Myrmecopora* wurde von Saulcy 1864 im ersten Teile seiner Arbeit "Description des espèces nouvelles de Coléoptères" in den Ann. Soc. Ent. France, (4) IV., p. 429 auf die dort von ihm beschriebene Art *publicana* (p. 430), die daher als Typus generis zu gelten hat, aufgestellt. Interessanterweise beschrieb er aber dann im zweiten Teile der gleichen Arbeit auf p. 629 die *Myrmecopora* (*Tachyusa* Erichson) *fugax* Erichson als "*Falagria lata*", allerdings ohne Untersuchung der Mundteile, die ihm sonst die Zugehörigkeit dieser Art zu dem von ihm im ersten Teile der Arbeit aufgestellten Genus *Myrmecopora* erwiesen hätten. Die große Verschiedenheit der ektoskelettalen Erscheinungsbilder der beiden Arten macht aber wohl das Nichterkennen der Zugehörigkeit zur gleichen Gattung verständlich.

Aber schon Erichson hatte in seinem fundamentalen Werke "Genera et Species Staphylinorum", 1839-40, die Arten *laesa* (p. 73), *fugax* (p. 74) und *uvula* (p. 910), allerdings als zu seiner schon in den "Käfern der Mark Brandenburg", 1837-39, p. 307 aufgestellten Gattung *Tachyusa* gehörig, bekannt gemacht.

1850 beschrieb Aubé in seiner Arbeit "Description de quelques insectes coléoptères appartenant à l'Europe et à l'Algérie (Ann. Soc. Ent. France (2), VIII., p. 301) seine *Falagria crassiuscula* aus Batum in Imeretien (Kaukasus), die später als zu *Myrmecopora* s. str. gehörig erkannt worden ist.

Im gleichen Jahre 1850 gab Kiesewetter eine kurze Beschreibung seiner *Tachyusa sulcata* (Stettiner Ent. Zeitg., XI., p. 218) aus Süd-Frankreich und Venetien, die ja später zum Subgenus *Xenusa* der Gattung *Myrmecopora* gehörig befunden wurde.

1852 hatte Sachse in seiner Arbeit "Neue Käfer" unglücklicherweise in einer Reihe von Beschreibungen nordamerikanischer Arten aus dem Staate Georgia die Art *Myrmedonia "pygmaea"* (p. 115) bekannt gemacht, die später als Synonym zu *Myrmecopora crassiuscula* Aubé angesehen wurde, von mir

aber jetzt für eine eigene, gute Art gehalten wird. Die Patria dieser Art war wegen ihrer Beschreibung unter nordamerikanischen Arten lange umstritten, obwohl Sachse in den einleitenden Worten zu seiner Arbeit sagt: "Ich ergreife zugleich diese Gelegenheit, um noch einige andere Arten bekannt zu machen, die aus anderen Weltgegenden in meine Sammlung gekommen sind." In der Beschreibung seiner Art "pygmaea" fand er es aber nicht für notwendig, ihre Patria anzugeben, obwohl er bei den übrigen Arten überall die Patria hinzugefügt hat.

In ihrem umfangreichen Werke "Histoire Naturelle des Coléoptères de France, Brévipennes, Aléochariens, Myrmédonnaires" stellten die beiden Autoren E. Mulsant und Cl. Rey im IV. Bande (1875) auf p. 410 ihre neue Gattung *Xenusa* mit den Arten *uvula* Erichson (p. 413) und *sulcata* Kiesewetter (p. 416), sowie ihre neue Gattung *Ilyusa* (p. 419) mit den Arten *laesa* Erichson (p. 422) und *fugax* Erichson (p. 425) auf, wodurch diese schon früher bekannt gemachten Arten zunächst ihre richtige systematische Zugehörigkeit und Stellung erhielten.

1895 endlich faßte Ganglbauer im zweiten Bande seines Werkes "Die Käfer von Mitteleuropa" (p. 249 - 251) die bisherigen Kenntnisse über die europäischen Arten zusammen, vereinigte die bisherigen Gattungen von Mulsant-Rey als Untergattungen mit der Gattung *Myrmecopora* Saulcy und baute zum ersten Male eine kurze Dichotomik der Subgenera und Arten auf.

In den folgenden Jahrzehnten wurde eine weitere Anzahl neuer Arten der Gattung aus der paläarktischen Faunenregion (11), aber auch aus anderen Faunenregionen (8), alle jedoch nur in Einzelbeschreibungen bekannt gemacht, so daß es unmöglich wurde, diese vielen neuen Arten ohne eine Übersicht ihrer besonderen Charaktere einfach auseinander zu halten. Da mir Überdies in den großen Materialien der bei mir vereinigten Staphyliniden-Sammlungen auch noch anscheinend unbekanntere Arten unter das Binokular gekommen waren, entschloß ich mich, zumindest die paläarktischen Arten einem neuerlichen, eingehenden, vergleichenden Studium zu unterziehen, als dessen Ergebnis sich die vorliegende Arbeit ergab.

Die aus den anderen Faunenregionen bekannt gewordenen acht Arten dürfen aber, meiner Meinung nach, mit ganz wenigen Ausnahmen, nicht zur Gattung *Myrmecopora* Saulcy gehören, weil in ihren Beschreibungen Charaktere angeführt werden, die dieser Gattung nicht eigen sein können.

Dichotomik der paläarktischen Arten der Gattung *Myrmecopora* Saulcy

- 1(14) Die Oberflächen von Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind im Grunde spiegelglatt und stark glänzend. Selbst bei einer etwas dichteren Punktierung sind die dann mehr oder weniger kleinen Zwischenräume zwischen den Punkten im Grunde stets als spiegelglatt und stark glänzend erkennbar. Der Kopf, der Halsschild und die Flügeldecken sind durch den glatten Untergrund ihrer Oberflächen stets mehr oder weniger stark glänzend.
- 2(9) Die länglich-verkehrt-kegelstumpfförmigen Glieder der verhältnismäßig dünnen und schlanken Fühler sind selbst vom vierten Glied an alle sehr deutlich länger als an ihren Enden breit; meist ist ihre Länge um etwa ein

Drittel bis um die Hälfte größer als  
bis vier vorletzten Glieder nur so lang  
Fühler

3(8) Größere Arten von etwa 2,75 bis 4 mm  
schlanken Fühler sind sehr deutlich  
die drei bis vier vorletzten Glieder zu  
ihren Enden breit. Die Hintermitel-  
weniger breit abgerundet.

4(5) Die Oberflächen von Kopf und Halsschild  
glänzendem Grunde außerordentlich  
Durchmesser der Punkte erreichen  
messer der Cornealfacetten der Augen  
räume zwischen den Punkten sind die  
chendurchmesser. Ganz bräunlichgelb  
Abdominalsegmente sind gewöhnlich  
und Beine sind hell bräunlichgelb.  
Minimalsternit, zu seinem Ende etwas  
nolende etwas weiter hervor, den kleinen  
und der furchenartige Mittellängsrunne  
tigger ausgebildet als beim Weibchen.  
Formen der Körner sammelt man  
worden sind, ist über das russische und  
Kaukasusländer bis nach Japan auf eine

1850.

5(4) Die Oberflächen von Kopf und Halsschild  
stark glänzenden Grunde etwas  
messer der Punkte erreichen etwa die  
Cornealfacetten der Augen oder sind  
schnittlichen Zwischenräume zwischen  
zweimal so groß, wie die Punkte

6(7) Der Halsschild ist im Gegenstand  
seine größte Breite in einer Querschnitts-  
tellänge ist höchstens nur um ein  
Seitenkonturen verlaufen von dem  
leicht konvergent und dann über die  
abgerundeten Hinterwinkel zum  
stärker konvexen Hinterende. Sternit  
etwas feiner und weniger dicht  
riß weniger stark quer, etwa um die

d. Die Patria dieser Art war we-  
Arten lange umstritten, obwohl  
seit sagt: "Ich ergreife zugleich  
en bekannt zu machen, die aus  
men sind." In der Beschreibung  
notwendig, ihre Patria anzuge-  
Patria hinzugefügt hat.

Naturelle des Coléoptères de  
ires" stellten die beiden Auto-  
auf p.410 ihre neue Gattung  
3) und sulcata Kiesewetter  
9) mit den Arten laesa Erich-  
vodor durch diese schon früher be-  
stematische Zugehörigkeit und

ande seines Werkes "Die Käfer  
ntnisse über die europäischen  
ngen von Mulsant-Rey als Un-  
Saulcy und baute zum ersten  
ten auf.

teilere Anzahl neuer Arten der  
, aber auch aus anderen Fau-  
übungen bekannt gemacht, so  
ohne eine Übersicht ihrer  
n. Da mir überdies in den  
den-Sammlungen auch noch  
gelommen waren, entschloß  
in ihnen, eingehenden,  
lich die vorliegende

nen acht Arten dürf-  
ennen, nicht zur Gat-  
beschreibungen Charak-  
ein können.

Myrmecopora Saulcy

geldecken sind im Grunde  
er etwas dichteren Punktie-  
Zwischenräume zwischen den  
ark glänzend erkennbar. Der  
durch den glatten Untergrund  
glänzend.

glieder der verhältnismäßig  
vierten Glied an alle sehr  
t ist ihre Länge um etwa ein

Drittel bis um die Hälfte größer als ihre Enddicke. Seltener sind die drei  
bis vier vorletzten Glieder nur so lang wie breit.

Subgen. Myrmecopora s.str. Ganglbauer  
1895, Käf.-Mitt-Eur., II., p.250.

3(8) Größere Arten von etwa 2,75 bis 4 mm Länge. Alle Glieder der langen und  
schlanken Fühler sind sehr deutlich länger als an ihren Enden breit; selbst  
die drei bis vier vorletzten Glieder sind stets sehr deutlich länger als an  
ihren Enden breit. Die Hinterwinkel des Halsschildes sind stets mehr oder  
weniger breit abgerundet.

4(5) Die Oberflächen von Kopf und Halsschild sind auf spiegelglattem, stark  
glänzendem Grunde außerordentlich fein und sehr weitläufig punktiert; die  
Durchmesser der Punktchen erreichen kaum ein Viertel der Größe der Durch-  
messer der Cornealfacetten der Augen, die durchschnittlichen Zwischen-  
räume zwischen den Punktchen sind drei- bis viermal so groß wie die Punkt-  
chendurchmesser. - Ganz bräunlichgelb, der Kopf und die Basalhälften der  
Abdominalsegmente sind gewöhnlich dunkelbraun, die Mundteile, Fühler  
und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das letzte Abdo-  
minalsternit, zu seinem Ende etwas enger abgerundet, aus dem Abdomi-  
nalende etwas weiter hervor; der kleine Mittellängseindruck der Kopfoberseite  
und der furchenartige Mittellängseindruck des Halsschildes sind etwas kräf-  
tiger ausgebildet als beim Weibchen. - Die arenicole Art, die öfter bei  
Formen der Körner sammelnden Ameisen Aphegona und Messor gefunden  
worden sind, ist über das östliche Süd-Europa, Kleinasien, Armenien, die  
Kaukasusländer bis nach Transkaukasien verbreitet. - Länge: 2,75 - 4,5 mm  
crassiuscula Aubé

1850, Ann.Soc.Ent.France, (2) VIII, p.301  
(als Falagria beschrieben) .

5(4) Die Oberflächen von Kopf und Halsschild sind auf einem spiegelglatten,  
stark glänzenden Grunde etwas kräftiger und dichter punktiert, die Durch-  
messer der Punkte erreichen etwa die Hälfte der Größe der Durchmesser der  
Cornealfacetten der Augen oder sind sogar noch etwas größer, die durch-  
schnittlichen Zwischenräume zwischen den Punkten sind kleiner, höchstens  
zweimal so groß, wie die Punktdurchmesser.

6(7) Der Halsschild ist im Gesamtumriß weniger stark quer-verkehrt-trapezoidal,  
seine größte Breite in einer Querlinie durch das vorderste Drittel seiner Mit-  
tellänge ist höchstens nur um ein Viertel größer als seine Mittellänge. Seine  
Seitenkonturen verlaufen von den Punkten der größten Breite nach hinten  
leicht konvergent und dann über die in der Anlage stumpfwinkeligen, aber  
abgerundeten Hinterwinkel zum nach hinten zwar flach, aber doch etwas  
stärker konvexen Hinterrande. Seine etwas stärker gewölbte Oberseite ist  
etwas feiner und weniger dicht punktiert. Auch der Kopf ist im Gesamtum-  
riß weniger stark quer, etwa um die Hälfte breiter als lang. - Ganz gelb-

lichbraun, der Kopf und die Basalhälften der Abdominalsegmente sind dunkler braun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das letzte Abdominalsternit, zu seinem Ende enger abgerundet, aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; die Kopfoberseite hat in der Mitte einen kleinen, flachen, rundlichen Eindruck; der Halsschild trägt in der hinteren Hälfte der Längsmittellinie einen flachen, aber ziemlich breiten Längseindruck. Beim Weibchen sind diese Bildungen auf dem Kopfe und auf dem Halsschild viel schwächer entwickelt. - Die arenicole Art ist über Syrien, den Libanon und Palästina verbreitet. Auch sie wurde öfter in Gesellschaft der Ameisen *Aphenogaster* und *Messor* gefunden. - Länge: 3,25 - 4 mm.

*publicana* Saulcy  
1864, Ann.Soc.Ent.France, (4) IV., p.430  
(Typus generis et subgeneris)

- 7(6) Der Halsschild ist im Gesamtumriß viel stärker quer-verkehrt-trapezoidal, seine größte Breite in einer Querlinie durch das vorderste Drittel seiner Mittellänge ist gut um die Hälfte größer als seine Mittellänge. Seine Seitenkonturen verlaufen von den Punkten der größten Breite nach hinten stärker konvergent und dann über die in der Anlage stumpfwinkeligen, aber breit abgerundeten Hinterwinkel zum nach hinten sehr flach konvexen Hinterrande. Seine flach gewölbte Oberseite ist etwas stärker und ziemlich dicht punktiert. Auch der Kopf ist im Gesamtumriß sehr stark quer, fast doppelt breiter als lang. - Ganz gelblichbraun, der Kopf und die Basalhälften der Abdominalsegmente sind dunkelbraun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das letzte Abdominalsternit, zu seinem Ende enger abgerundet, aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; die Kopfoberseite hat in der Mitte einen sehr großen, flachen, runden Eindruck; der Halsschild trägt in seiner Mittellängslinie eine ziemlich tief eingeschnittene, breite Mittellängsfurche. Beim Weibchen sind die Bildungen auf dem Kopfe und dem Halsschild viel schwächer entwickelt. - Von der neuen Art fanden sich ein Männchen (Holotypus) und ein Weibchen (Allotypus), beide in coll.m., in dem noch nicht vollständig bearbeiteten, riesigen Staphylinidenmaterial der coll.Leonhard, mit folgenden Fundortangaben: Kleinasien, Golf von Makri, (gegenüber der Insel Rhodos), leg. Hilf, 1905. Die wahrscheinlich auch arenicole Art dürfte über den Südwesten Kleasiens weiter verbreitet sein. - Länge: 3 - 3,5 mm.

*Hilfi* nov.spec.

- 8(3) Kleinere Art unter 2,5 mm Länge. Nur die Glieder der Basalhälften der Fühler sind etwas länger als an ihren Enden breit, die Glieder der Endhälften der Fühler sind so lang wie breit. Die Oberflächen von Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind auf spiegelglattem, stark glänzendem Grunde außerordentlich fein und sehr weitläufig punktiert, im ganzen glänzend. Die Hinterwinkel des Halsschildes sind ausgeprägt stumpfkegig. - Ganz rötlich-gelbbraun, der Kopf und die Basalhälften der Abdominalsegmente sind dunkel-

braun, die Mundteile  
chen ragt das letzte,  
Abdominalende etwa  
ner Längsmittellinie  
Weibchen noch schw  
nym zu *M. crassi* u  
daß sie vom Autor in  
veröffentlicht worde  
mußte. Die kurze, d  
bung, darin aber vor  
seinen ausgeprägt st  
Sammlung aus der U  
vorliegenden Stücke  
die ausgeprägt stumpf  
aber einwandfrei vor

- 9(2) Die verkehrt-kegel  
sind vom vierten G  
Glieder aber nehme  
letzten Glieder de  
Viertel bis um die h

- 10(11) Größere und bre  
von Kopf, Halsschild  
de sehr fein und sek  
kaum glänzend. -  
der sonst braunen  
Männchen ragt das  
nit aus dem Abdom  
ren Hälfte seiner O  
hat in seiner Längsm  
druck, der in der  
durchzogen ist. Be  
dem Halsschild v  
hygro-arenicole A  
nördlicheren Medi  
Griechenland, die

er Abdominalsegmente sind dunkel  
sind hell bräunlichgelb. - Beim  
, zu seinem Ende enger abgerun-  
r hervor; die Kopfoberseite hat in  
en Eindruck; der Halsschild trägt  
e einen flachen, aber ziemlich  
id diese Bildungen auf dem Kopfe  
itwickelt. - Die arenicole Art ist  
rbreitet. Auch sie wurde öfter in  
und Messor gefunden. - Länge:

*publicana* Saulcy  
Soc. Ent. France, (4) IV., p. 430  
(Typus generis et subgeneris)

ärker quer-verkehrt-trapezoidal,  
das vorderste Drittel seiner Mit-  
eine Mittellänge. Seine Seiten-  
rößten Breite nach hinten stärker,  
nge stumpfwinkeligen, aber breit  
en sehr flach konvexen Hinter-  
etwas stärker und ziemlich dicht  
nriß sehr stark quer, fast doppelt  
er Kopf und die Basalhälften der  
Mundteile, Fühler und Beine sind  
das letzte Abdominalsternit, z.  
Abdominalende etwas weiter her-  
en sehr großen, flachen, runde  
ttellängslinie eine ziemlich tief  
Beim Weibchen sind die Bildun-  
el schwächer entwickelt. - Vor-  
olotypus) und ein Weibchen (Al-  
nt vollständig bearbeiteten, rie-  
ard, mit folgenden Fundortan-  
enüber der Insel Rhodos), leg-  
cole Art dürfte über den Südwe-  
inge: 3 - 3,5 mm.

*Hilfi* nov. spec.

e Glieder der Basalhälften de  
breit, die Glieder der Endhäft-  
berflächen von Kopf, Halsschild  
tark glänzendem Grunde außer-  
, im ganzen glänzend. Die Hir-  
mpfeckig. - Ganz rötlich-gelb-  
Abdominalsegmente sind dunkel-

braun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell rötlichgelb. - Beim Männ-  
chen ragt das letzte, zum Ende enger abgerundete Abdominalsternit aus dem  
Abdominalende etwas hervor; der Halsschild hat in der hinteren Hälfte sei-  
ner Längsmittellinie einen seichten, längsfurthenartigen Eindruck, der beim  
Weibchen noch schwächer ausgebildet ist. - Die Art wurde bisher als Syno-  
nym zu *M. crassiuscula* Aubé angesehen. Dazu mag beigetragen haben,  
daß sie vom Autor im Rahmen der Beschreibungen nordamerikanischer Arten  
veröffentlicht worden ist, so daß ihre Patria mit Recht angezweifelt werden  
mußte. Die kurze, die Art nicht ausreichend charakterisierende Beschrei-  
bung, darin aber vor allem die Angabe über die Gestalt des Halsschildes mit  
seinen ausgeprägt stumpfeckigen Hinterwinkeln, läßt die mir in meiner  
Sammlung aus der Umgebung von Smyrna (Ismir) in Nordwest-Kleinasien  
vorliegenden Stücke als zu dieser Art gehörig erkennen. Der Fühlerbau und  
die ausgeprägt stumpfeckigen Hinterwinkel des Halsschildes scheiden sie  
aber einwandfrei von den verwandten Arten. - Länge: 2 - 2,5 mm.

*pygmaea* Sachse,  
1852, Stettiner Ent. Zeitg., XIII., p. 115

- 9(2) Die verkehrt-kegelstumpfförmigen, basalen Glieder der kräftigeren Fühler  
sind vom vierten Glied an so lang wie an ihren Enden breit, die nächsten  
Glieder aber nehmen sehr rasch an Breite zu, so daß die drei bis vier vor-  
letzten Glieder der Fühler sehr deutlich quer, an ihren Enden um etwa ein  
Viertel bis um die Hälfte breiter als lang erscheinen.

Subgenus *Ilyusa* Mulsant-Rey  
1875, Hist. Nat. Col. France, Brévipennes, Aléochariens,  
Myrmedoniaires, IV., p. 419.

- 10(11) Größere und breitere Art von mindestens 3 mm Länge. Die Oberflächen  
von Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind auf glattem, glänzendem Grun-  
de sehr fein und sehr dicht punktiert, dadurch trotz des glatten Untergrundes  
kaum glänzend. - Ganz braunschwarz, die Mundteile, drei Basalglieder  
der sonst braunen Fühler und die Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim  
Männchen ragt das zu seinem Ende enger abgerundete, letzte Abdominalster-  
nit aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; der Kopf hat in der hinte-  
ren Hälfte seiner Oberseite einen breiten, tieferen Eindruck; der Halsschild  
hat in seiner Längsmittellinie einen mehr oder weniger breiten, tieferen Ein-  
druck, der in der Mitte meist von einer fein eingeschnittenen Längslinie  
durchzogen ist. Beim Weibchen sind die Bildungen auf dem Kopfe und auf  
dem Halsschilde viel schwächer entwickelt. - Länge: 3 - 3,5 mm. - Die  
hygro-arenicole Art ist über die Küstengebiete des Schwarzen Meeres, des  
nördlicheren Mediterraneums, von Südrußland über Rumänien, Bulgarien,  
Griechenland, die südlichere Adria- und Apenninenländer, Süd-Frankreich

und Korsika, bis nach West-Spanien verbreitet und lebt im feuchten Sande meist unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus.

fuga x Erichson  
1839 - 40, Gen. Spec. Staph., p. 74 (Tachyusa).  
- lata Saulcy, 1864, Ann. Soc. Ent. France,  
(Typus subgeneris)

11(10 Kleinere und schmalere Arten von höchstens 2,5 mm Länge.

12(13) Der Kopf ist im Gesamtumriß weniger stark quer, nur um ganz wenig mehr wie um ein Drittel breiter als lang. Die Flügeldecken sind kaum oder nur sehr wenig länger als die Mittellänge des Halsschildes. Die Oberflächen von Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind auf einem spiegelglatten, glänzenden Grunde nicht sehr fein und nicht dicht punktiert, daher etwas glänzend. - Ganz braunschwarz, die Flügeldecken sind öfter etwas heller braun, die Mundteile, zwei bis drei Basalglieder der sonst braunen Fühler und die Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das zu seinem Ende enger abgerundete, letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; der Halsschild hat in der hinteren Hälfte der Mittellängslinie einen kurzen Längseindruck. Beim Weibchen ist der Längseindruck auf dem Halsschilde nur undeutlich. - Die allem Anschein nach arenicole Art ist aus "Turkmenien", wahrscheinlich aus der Küstenregion des Kaspisees oder des Aralsees bekannt geworden. - Länge: 2,5 mm.

turanica Eppelsheim  
1888, Deutsche Ent. Zeitschr., XXXII., p. 52.

13(12) Der Kopf ist im Gesamtumriß ziemlich stark quer, um etwas mehr wie um die Hälfte breiter als lang. Die Flügeldecken sind um etwa ein Drittel länger als die Mittellänge des Halsschildes. Die Oberflächen von Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind auf einem spiegelglatten, stark glänzenden Grunde nicht sehr fein, aber ziemlich dicht punktiert, daher wenig glänzend. Die Oberflächen der Abdominaltergite sind, bis auf die ziemlich tiefen, schmalen und glatten Basalquerfurchen der ersten drei freiliegenden Tergite, gleichfalls ziemlich dicht und fein punktiert. - Ganz tiefschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind braun. - Beim Männchen tritt das letzte, zu seinem Ende enger abgerundete, letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas hervor; die Mitte der Kopfoberseite ist etwas abgeflacht; der Halsschild hat in der Basalhälfte seiner Mittellängslinie einen breiten, flachen Eindruck. - Länge: 2,5 mm. - Mir liegt von der neuen, wahrscheinlich hygro-arenicole Art ein Männchen (Holotypus in coll. m.) vor, das in Afghanistan bei Beharak südlich von Faizabad im Uferbereich eines Gewässers aufgefunden worden ist.

afghanica nov. spec.

14(1) Die Oberflächen von Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind im Grunde mehr oder weniger stark, meist rundnetzmaschig oder leicht körnelig mikroskulptiert. Selbst bei einer dichten Punktierung dieser Körperteile sind auf



19(18) Der Halsschild ist im Gesamtumriß länger und schmaler, seine Mittellänge ist etwas größer als seine größte, in einer Querlinie durch das vorderste Drittel seiner Mittellänge gelegene Breite. Die Glieder der Basalhälften der Fühler sind bis zum achten Gliede deutlich länger als an ihren Enden breit, das neunte und zehnte Glied sind so lang wie breit.

20(21) Die Oberfläche des Kopfes ist ziemlich kräftig, wenn auch nicht dicht punktiert, die Punktierung ist dort etwa dreimal stärker als die in der Mikroskulptur kaum erkennbare, feinste Punktierung des Halsschildes. Die Durchmesser der Punkte auf der Kopfoberfläche sind so groß wie die Durchmesser der Cornealfacetten der Augen, die durchschnittlichen Zwischenräume zwischen den Punkten sind so groß wie die Punktdurchmesser. - Ganz dunkelbraun bis schwarzbraun, die Mundteile, die Basalglieder der in der Endhälfte angedunkelten Fühler und die Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; der Kopfscheitel hat in der Längsmittellinie einen kleinen, rundlichen Eindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie einen breiten und tiefen, in der Längsmittellinie meist durch eine feine Längsfalte längsgeteilten Eindruck. Beim Weibchen hat der Kopfscheitel meist keinen Eindruck und der Halsschild hat in der Längsmittellinie nur einen schmäleren, längsfurchenartigen Eindruck. - Länge: 2,5 - 3 mm. - Die hygro-arenicole Art ist über die Südküste Frankreichs, von der Riviera bis in die Camargue und über die nördlicheren Küstengebiete Korsikas verbreitet. Sie lebt im feuchten Sande unter angeschwemmtem Tang und anderem Detritus.

Sydowi Bernhauer  
1927, Koleopt.Rundschau, XIII., p.97.

21(20) Die Oberfläche des Kopfes ist viel feiner und nicht sehr dicht punktiert, die Punktierung ist dort nur wenig stärker als die trotz der Mikroskulptur sehr gut erkennbare Punktierung des Halsschildes. Die Durchmesser der Punkte auf der Kopfoberfläche sind kaum halb so groß wie die Durchmesser der Cornealfacetten der Augen, die durchschnittlichen Zwischenräume zwischen den Punkten sind so groß, wie die Punktdurchmesser. - Ganz dunkelbraun bis schwarzbraun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen tritt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; der Kopfscheitel hat eine kleine Abflachung; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine tiefe Längsfurchenbildung, die in der Mitte meist etwas grubchenförmig erweitert ist. Beim Weibchen ist der Kopfscheitel gleichmäßig flach gewölbt und der Halsschild hat in der Längsmittellinie einen längsfurchenartigen Eindruck. - Länge: 2,5 - 3 mm. - Die hygro-arenicole Art ist über die östlichen Teile der Südküsten des Mittelmeeres, vom Nildelta Ägyptens über die Cyrenaica, Lybien, Tripolis bis Tunis, verbreitet. Sie lebt im feuchten Sande unter angeschwemmtem Detritus.

Boehmi Bernhauer  
1910, Entom.Blätter, VI., p.259.

- 22(17) Die normal gebildeten Hintertarsen sind viel kürzer als die Hinterschienen. Das erste Glied dieser Hinterschienen ist weniger gestreckt, so lang wie oder nur wenig länger, seltener sogar ganz wenig kürzer als die beiden folgenden Glieder zusammengenommen.
- 23(24) Größere, plumpere und breitere Art von mindestens 3,5 mm Länge. Alle Glieder der Fühler sind, bis auf das neunte und zehnte Glied, erheblich länger als an ihren Enden breit. Die dichte Punktierung der Kopfoberfläche ist doppelt so stark wie jene noch dichtere des Halsschildes und der Flügeldecken. Die Punktierungen der Tergitoberflächen des Abdomens sind noch etwas stärker, aber etwas weitläufiger als jene des Kopfes. Der Kopf ist im Gesamtumriß quer-rechteckig, fast doppelt breiter als lang. Der Halsschild ist nur sehr wenig breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, im Gesamtumriß quer-trapezoidal. Die Flügeldecken sind im Gesamtumriß quer-rechteckig, um etwa ein Viertel breiter als an den Schultern lang und um ebensoviel länger als der Halsschild. - Ganz braunschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen tritt das zum Ende enger abgerundete, letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; der Kopf hat auf dem Scheitel einen flachen Längseindruck, der Halsschild hat in der Längsmittellinie einen tiefen, hinter der Basis etwas verbreiterten, längsfurcheartigen Eindruck. - Länge: 3,75 mm. - Von der neuen, *hygro-arenicolus* Art liegt mir ein Männchen (Holotypus in coll.m.) vor, das an der Küste Süd-Frankreichs im Dep. Var in der Umgebung von St. Tropez im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen aufgefunden worden ist.

*meridiogallica* nov.spec.

- 24(23) Kleinere, schlankere und schmalere Arten von höchstens 3 mm Länge.
- 25(28) Etwas größere Arten von mindestens 2,5 mm Länge. An den Fühlern sind die mittleren Glieder vom vierten bis zum siebenten Gliede sehr deutlich, das vierte und fünfte Glied um fast die Hälfte, das sechste und siebente Glied um etwa ein Drittel bis um ein Viertel länger als an ihren Enden breit, das achte bis zehnte Glied ist so lang wie breit. Die Oberfläche des Kopfes ist von einer sehr deutlichen, mehr oder weniger kräftigen und dichten Punktierung bedeckt.
- 30(27) Die Fühler und Beine sind länger, feiner und schlanker ausgebildet. Die Hintertarsen sind viel kürzer als die Hinterschienen, ihr erstes Glied ist etwas länger als die beiden folgenden Glieder zusammengenommen. Die Punktierung auf der Oberfläche des Kopfes ist etwas kräftiger und auch weniger dicht als jene auf der Oberfläche des Halsschildes. - Ganz dunkelbraun bis schwarzbraun, die Flügeldecken sind mitunter etwas heller braun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das letzte Abdominalsternit, zum Ende enger abgerundet, aus dem Abdominalende meist etwas weiter hervor; der Kopfscheitel hat einen Längseindruck in seiner Abflachung; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine

tief eingeschnittene Längsfurche, die ziemlich breit und basal meist etwas grubchenartig vertieft ist. Beim Weibchen hat der Kopfscheitel nur die Andeutung eines Eindruckes und die Längsfurche in der Längsmittellinie des Halsschildes ist weniger tief eingeschnitten und schmaler. - Länge: 2,75 - 3 mm. - Die *hygro-arenicole* Art findet sich fast an allen Küsten des Mittelmeeres und an den atlantischen Küsten des westlichen Europa, wo sie im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus gefunden wird.

*uvula* Erichson  
1839 - 40, Gen. Spec. Staph., p. 916 (*Tachyusa*)  
(Typus subgeneris)

27(26) Die Fühler und Beine sind viel kürzer, etwas kräftiger und weniger schlank ausgebildet. Die Hintertarsen sind nur wenig kürzer als die Hinterschienen, ihr erstes Glied ist so lang wie oder sogar ganz wenig kürzer als die Hinterschienen, ihr erstes Glied ist so lang wie oder sogar ganz wenig kürzer als die beiden folgender Glieder zusammengenommen. Die Punktierung auf der Oberfläche des Kopfes ist etwas schwächer und sehr dicht, fast so dicht wie jene auf der Oberfläche des Halsschildes. - Ganz dunkelbraun bis schwarzbraun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das letzte, zum Ende enger abgerundete Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter vor; der Kopfscheitel hat einen schwachen Längseindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine Längsfurche, die an der Basis meist etwas grubchenartig vertieft ist. Beim Weibchen hat der Kopfscheitel nur die Andeutung eines schwachen Längseindruckes und der Halsschild in der Längsmittellinie eine ganz seichte Längsfurche. - Länge: 2,75 - 3 mm. - Die *hygro-arenicole* Art findet sich an den Ost- und Südküsten Englands, der Kanal-Inseln und vereinzelt an einigen Punkten der französischen Kanalküste und der holländischen Küste. Sie wurde im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus aufgefunden.

*brevipes* Butler  
1909, Entom. Monthly Magazine, XLV., p. 29.

28(25) Etwas kleinere Arten von höchstens 2,5 mm Länge. An den Fühlern sind die beiden basalen Glieder, das vierte bis sechste Glied ganz wenig länger als breit, die folgenden Glieder sind so lang wie breit, das neunte und zehnte Glied ist sogar ganz wenig breiter als lang. Die Oberfläche des Kopfes ist entweder nur von einer sehr feinen Punktierung bedeckt oder überhaupt nicht punktiert, sondern nur von einer dichten, etwas rauhen und leicht körneligen Mikroskulptur bedeckt.

29(30) Die Oberflächen des Kopfes und Halsschildes sind ganz gleichmäßig, zwar äußerst fein, aber etwas rau und leicht körnelig und äußerst dicht mikroskulptiert, dadurch fast vollkommen glanzlos und matt. Eine Punktierung ist in dieser Mikroskulptur meist überhaupt nicht erkennbar. - Ganz

braunschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. Beim Männchen tritt das zum Ende enger abgerundete Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter vor; der Kopfscheitel hat einen schwachen Längseindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine Längsfurche, die an der Basis meist etwas grubchenartig vertieft ist. Beim Weibchen hat der Kopfscheitel nur die Andeutung eines schwachen Längseindruckes und der Halsschild in der Längsmittellinie eine ganz seichte Längsfurche. - Länge: 2,75 - 3 mm. - Die *hygro-arenicole* Art findet sich fast an allen Küsten des Mittelmeeres und an den atlantischen Küsten des westlichen Europa, wo sie im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus gefunden wird.

1830, Staph.

30(29) Die Oberflächen des Kopfes und Halsschildes sind ganz gleichmäßig, zwar äußerst fein, aber etwas rau und leicht körnelig und äußerst dicht mikroskulptiert, dadurch fast vollkommen glanzlos und matt. Eine Punktierung ist in dieser Mikroskulptur meist überhaupt nicht erkennbar. - Ganz dunkelbraun bis schwarzbraun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen ragt das letzte, zum Ende enger abgerundete Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter vor; der Kopfscheitel hat einen schwachen Längseindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine Längsfurche, die an der Basis meist etwas grubchenartig vertieft ist. Beim Weibchen hat der Kopfscheitel nur die Andeutung eines schwachen Längseindruckes und der Halsschild in der Längsmittellinie eine ganz seichte Längsfurche. - Länge: 2,75 - 3 mm. - Die *hygro-arenicole* Art findet sich fast an allen Küsten des Mittelmeeres und an den atlantischen Küsten des westlichen Europa, wo sie im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus gefunden wird.

1936, p.

31(16) Etwas kleinere Arten von höchstens 2,5 mm Länge. An den Fühlern sind die beiden basalen Glieder, das vierte bis sechste Glied ganz wenig länger als breit, die folgenden Glieder sind so lang wie breit, das neunte und zehnte Glied ist sogar ganz wenig breiter als lang. Die Oberfläche des Kopfes ist entweder nur von einer sehr feinen Punktierung bedeckt oder überhaupt nicht punktiert, sondern nur von einer dichten, etwas rauhen und leicht körneligen Mikroskulptur bedeckt.

32(35) An den Fühlern ist das vierte und fünfte Glied ganz wenig länger als breit, die folgenden Glieder sind so lang wie breit, das neunte und zehnte Glied ist sogar ganz wenig breiter als lang. Die Oberfläche des Kopfes ist entweder nur von einer sehr feinen Punktierung bedeckt oder überhaupt nicht punktiert, sondern nur von einer dichten, etwas rauhen und leicht körneligen Mikroskulptur bedeckt.

33(34) Die Oberfläche des Kopfes und Halsschildes sind ganz gleichmäßig, zwar äußerst fein, aber etwas rau und leicht körnelig und äußerst dicht mikroskulptiert, dadurch fast vollkommen glanzlos und matt. Eine Punktierung ist in dieser Mikroskulptur meist überhaupt nicht erkennbar. - Ganz

ist etwas  
r die An-  
linie des  
s: 2,75-  
s Mittel-  
vo sie im  
Detritus \*

Erichson  
achysal  
generis

weniger  
Hinter-  
g kürzer  
anz we-  
e Punk-  
r dicht,  
dunkel-  
bräun-  
rundete  
cheitel  
mittel-  
vertieft  
wachen  
seichte  
et sich  
zeltan  
Küste.  
I son-

Butler  
p.29. \*

n sind  
länger  
e und  
ie des  
oder  
n und

äßig,  
dicht  
ktie-  
Ganz

braunschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind gelblichbraun. - Beim Männchen tritt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas deutlicher hervor; der abgeflachte Kopf hat auf dem Scheitel einen breiten Längseindruck; der Halsschild hat in der Mittellängslinie einen breiten, flachen Längseindruck. Beim Weibchen sind diese Bildungen auf dem Kopfe und auf dem Halsschild viel schwächer entwickelt und weniger deutlich erkennbar. - Länge: 2,25 - 2,5 mm. - Die hygro-arenicole Art lebt fast an allen Küsten Europas, von jenen des Schwarzen Meeres, über die Küsten der Aegaeis, der Adria, der Tyrrhenis, der Küsten Südfrankreichs, über die Küsten der iberischen Halbinsel zu den atlantischen Küsten Frankreichs, Englands und der Nord- und Ost-See, überall im feuchten Sande unter angeschwemmtem Tang und sonstigem Detritus.


1850, Stettiner Ent. Zeitg., XI., p.218 (Tachyusa)

- 30(29) Die Oberflächen des Kopfes und des Halsschildes sind zwar auch fein, aber nur sehr zart mikroskulptiert, dadurch deutlich etwas glänzend. In der feinen und zarten Mikroskulptur ist aber eine feine, nicht dichte Punktierung sehr gut erkennbar. - Ganz braunschwarz, die Flügeldecken sind mitunter etwas heller braun, die Mundteile, Fühler und Beine sind gelblichbraun. - Beim Männchen ragt das zum Ende etwas enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende meist ein wenig hervor; der Scheitel des Kopfes hat einen ziemlich tiefen und breiten Eindruck; der Halsschild hat in seiner Mittellängslinie eine ziemlich tiefe Längsfurche. Beim Weibchen sind diese Bildungen auf dem Scheitel des Kopfes und auf dem Halsschild viel schwächer entwickelt. - Länge: 2,25 - 2,5 mm. - Die hygro-arenicole Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmtem Tang und sonstigem Detritus an den Küsten des Roten Meeres, am Golf von Suez, der Halbinsel Sinai und dem Golf von Akaba.

Bernhaueri Koch

1936, Publ. Mus. "Pietro Rossi", Duino, p.100.

- 31(16) Etwas kleinere Arten von höchstens 2,25 mm Länge. An den verhältnismäßig kräftigen und ziemlich kurzen Fühlern ist schon das vierte Glied nur sehr wenig länger als breit, sehr oft aber nur so lang wie breit; die folgenden Glieder nehmen aber an Breite mehr oder weniger zu, so daß die zwei bis drei vorletzten Glieder sehr deutlich, zumindest um ein Viertel bis um etwa die Hälfte breiter als lang erscheinen.
- 32(35) An den Fühlern ist das vierte und fünfte Glied noch deutlich ganz wenig länger als an seinem Ende breit; die folgenden Glieder nehmen gegen das Fühlerende nur sehr wenig an Breite zu, so daß die beiden vorletzten Glieder nur um etwa ein Viertel, höchstens um etwa ein Drittel breiter als lang erscheinen.
- 33(34) Die Oberfläche des Kopfes ist auf einem sehr kräftig und rau, etwas körnelig mikroskulptierten, vollkommen glanzlosen Grunde ziemlich dicht



und fein, aber in der groben, rauhen Mikroskulptur nicht deutlich erkennbar punktiert. Die Durchmesser der Pünktchen sind nur etwa halb so groß wie die Durchmesser der Cornealfacetten der Augen. Auf der Oberfläche des gleichfalls kräftig und rau, etwas körnelig mikroskulptierten, vollkommen glanzlosen Halsschildes ist eine Punktierung überhaupt nicht erkennbar. - Ganz braunschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind gelblichbraun. - Beim Männchen tritt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas weiter hervor; der Scheitel des Kopfes hat einen breiten und ziemlich tiefen Mittellängseindruck; der Halsschild trägt in der Mittellängslinie eine schmale Längsfurche. Beim Weibchen sind diese Bildungen auf dem Kopfscheitel und auf dem Halsschilde viel schwächer entwickelt. - Länge: 2 mm. - Die *hygro-arenicole* Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmtem Tang und sonstigem Detritus an den Küsten der das Skagerak der Nordsee säumenden Teile Norwegens, Schwedens und Dänemarks, dürfte aber wahrscheinlich an den Küsten der Nord- und Ost-See weiter verbreitet sein, weil sie auch auf Helgoland und Borkum gefunden worden ist.

Lohmander i Bernhauer  
1927, Entom.Tidskr., XLVIII., p.167

34(33) Die Oberflächen des Kopfes und Halsschildes sind beide auf einem feinst mikroskulptierten, etwas glänzenden Grunde ziemlich dicht und kräftig punktiert, die Durchmesser der Punkte sind so groß wie die Durchmesser der Cornealfacetten der Augen. - Ganz braunschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind gelblichbraun. - Beim Männchen ragt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas hervor; der Kopf hat auf dem Scheitel einen ziemlich großen, flachen Eindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine ziemlich schmale und flache Mittellängsrinne. Beim Weibchen sind diese Bildungen auf dem Kopfe und auf dem Halsschilde viel schwächer entwickelt. - Länge: 1,75 - 2,25 mm - Die *hygro-arenicole* Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus, aber auch in den feinen, von Sand erfüllten und meist überspülten Felsspalten der Klippen an den Küsten des Schwarzen Meeres Bulgariens, an den Küsten des Marmara-Meeres und der Aegaeis Griechenlands bis zum Peloponnes.

minima Bernhauer  
1900, Verh.zool.bot.Ges.Wien, L., p.537.

35(22) An den Fühlern ist das vierte Glied so lang wie breit, das fünfte Glied ist schon deutlich quer, die folgenden Glieder nehmen gegen das Fühlerende stärker an Breite zu, so daß die beiden vorletzten Glieder gut um die Hälfte oder sogar um etwas mehr wie um die Hälfte breiter als lang erscheinen.

36(37) Die Oberflächen von Kopf und Halsschild sind auf einem fein mikroskulptierten, aber etwas glänzenden Grunde beide fast gleichartig und dicht,

roskulptur nicht deutlich erkennen sind nur etwa halb so groß der Augen. Auf der Oberfläche schnellig mikroskulptierten, vollkterung überhaupt nicht erkennen. Fühler und Beine sind gelblich-enger abgerundete letzte Ab- weiter hervor; der Scheitel des n Mittellängseindruck; der Hals-:hmale Längsfurche. Beim Weib-heitel und auf dem Halsschilde. - Die hygro-arenicole Art lebt Tang und sonstigem Detritus an stummen Teile Norwegens, hrscheinlich an den Küsten der weil sie auch auf Helgoland und

Lohmander Bernhauer  
Entom. Tidskr., XLVIII., p. 167

Ides beide auf einem feinst  
le in dicht und kräftig  
so die Durchmesser der  
: Mundteile, Fühler  
das zum Ende enger  
alende etwas hervor;  
n, flachen Eindruck;  
ch schmale und flache  
en auf dem Kopfe und  
nge: 1,75 - 2,25 mm -  
unter angeschwemmten  
en feinen, von Sand er-  
open an den Küsten des  
Marmara-Meeres und der

Bernhauer  
L., p. 537.

fünfte Glied  
n das Fühler-  
der gut um die  
s lang erschei-

fein mikroskulp-  
artig und dicht,

verhältnismäßig kräftig punktiert, wobei die Punktierung auf der Oberfläche des Kopfes nur gerade noch erkennbar stärker ist als jene auf der Oberfläche des Halsschildes. Die Durchmesser der Punkte auf der Oberfläche des Kopfes sind etwa halb so groß wie die Durchmesser der Cornealfacetten der Augen, die durchschnittlichen Zwischenräume zwischen den Punkten sind etwa halb so groß wie die Punktdurchmesser. - Ganz braunschwarz, die Mundteile, Fühler und Beine sind gelblichbraun. - Beim Männchen tritt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende meist etwas hervor; der Scheitel des Kopfes hat einen ziemlich großen, länglichen, aber flachen Mitteleindruck; der Halsschild hat in der Mittellängslinie einen flachen, breiten Längseindruck, der basal meist durch ein Grübchen etwas vertieft ist. Beim Weibchen sind die Bildungen auf dem Kopfe und auf dem Halsschilde viel schwächer entwickelt. - Länge: 1,25 - 1,5 mm. - Die hygro-arenicole Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus, aber auch in den von feinem Sand erfüllten und überfluteten Felsspalten der Klippen an den Küsten des Schwarzen Meeres Bulgariens.

Bureši Rambousek  
1909, Věstník Česk. Spol. Nák., 1., p. 19, t, f. 2.

37(36) Die Oberfläche des Kopfes ist auf einem fein mikroskulptierten, etwas glänzenden Grunde fast doppelt so kräftig und viel weitläufiger als jene des Halsschildes punktiert, die halb so stark und doppelt dichter punktiert ist. Die Durchmesser der Punkte auf der Oberfläche des Kopfes erreichen an Größe die Größe der Durchmesser der Cornealfacetten der Augen, die durchschnittlichen Zwischenräume zwischen den Punkten sind etwas größer als die Punktdurchmesser. - Ganz schwarzbraun, die Mundteile, Fühler und Beine sind gelblichbraun. - Beim Männchen tritt das letzte Abdominalsternit, das zum Ende enger abgerundet ist, aus dem Abdominalende etwas hervor; der Scheitel des Kopfes hat einen seichten Längseindruck; der Halsschild hat in der Mittellängslinie eine schmale, seichte Längsfurche, die an der Basis durch ein kleines Grübchen etwas vertieft erscheint. Beim Weibchen sind die Bildungen auf dem Kopfe und auf dem Halsschilde viel schwächer entwickelt. - Länge: 1,5 mm. - Die hygro-arenicole Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen und sonstigem Detritus, aber auch in den von feinem Sande erfüllten und überspülten feinen Felsspalten der Klippen der Inselgruppen von Madeira und den Kanarischen Inseln.

maritima Wollaston  
1860, Ann. Mag. Nat. Hist., (3) VI., p. 51. (Tachyusa).-

38(15) Arten ostpaläarktischer Gebiete von östlich des Meridianes von 100° östlicher Länge gelegenen Fundorten.

39(40) Etwas größere Art von mindestens 2,75 mm Länge. Das verkehrt-kegelstumpfförmige vierte Glied der längeren und dünneren Fühler ist so wie die folgenden Glieder bis etwa zum siebenten Glied erheblich länger als an

ihren Enden breit. Die Oberflächen von Kopf und Halsschild sind auf einem sehr zart mikroskulptierten, aber etwas glänzenden Grunde ziemlich kräftig und nicht sehr dicht punktiert. - Ganz schwarzbraun (immatur rötlichbraun), die Mundteile, Fühler und Beine sind hell rötlichgelb. - Beim Männchen ragt das zum Ende enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende etwas hervor; der Kopf trägt auf dem Scheitel einen seichten Längseindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine an der Basis etwas grubchenartig verbreiterte, seichte Längsfurche. Beim Weibchen sind diese Eindrücke auf dem Kopfe und auf dem Halsschilde schwächer ausgebildet. - Länge: 2,75 - 3 mm. - Die hygro-arenicole Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen an den Westküsten Japans und an den Ostküsten Koreas und Chinas.

rufescens Sharp  
1874, Trans. Ent. Soc. London, p. 11. (Tachyusa).

40(39) Etwas kleinere Art von nur 2 mm Länge. Das vierte Glied der viel kürzeren und kräftigeren Fühler ist kaum länger als breit; die folgenden Glieder werden noch etwas kürzer, so daß die vorletzten Glieder ganz schwach quer erscheinen. Die Oberflächen von Kopf und Halsschild sind auf einem sehr zart mikroskulptierten, etwas glänzenden Grunde sehr fein und dicht punktiert. - Ganz schwarzbraun, die Mundteile, Fühler und Beine sind hell bräunlichgelb. - Beim Männchen tritt das zum Ende etwas enger abgerundete letzte Abdominalsternit aus dem Abdominalende meist ein wenig weiter hervor; der Scheitel des Kopfes hat einen leichten Längseindruck; der Halsschild hat in der Längsmittellinie eine seichte, schmale Längsfurche. Beim Weibchen sind diese Eindrücke auf dem Kopf und auf dem Halsschilde schwächer ausgebildet. - Länge: 2 mm. - Die hygro-arenicole Art lebt im feuchten Sande unter angeschwemmten Tanghaufen an den Westküsten Japans und an den Ostküsten Koreas und Chinas.

algarum Sharp  
1874, Trans. Ent. Soc. London, p. 12. (Tachyusa)

Außer den paläarktischen, in der vorstehenden Dichotomik behandelten Arten sind aus anderen Faunenregionen bis jetzt noch folgende Arten der Gattung bekannt geworden:

Aus der afrikanischen Faunenregion:

*Myrmecopora (Xenusa) basalis* Cameron 1926, Bull. Soc. Ent. Belgique, LXVI., p. 21, aus dem Kongo-Gebiet. (Die Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung *Myrmecopora* Saucy erscheint mir sehr zweifelhaft).

Aus der australisch-polynesischen Faunenregion:

*Myrmecopora (Xenusa) funesta* Broun 1912, Trans. New Zeal. Inst. XLIV., p. 398, aus Neu-Seeland.

*Myrmecopora* (*Xenusa*) *granulata* Broun, *ibid.*, p.398, aus Neu-Seeland. (Die Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung *Myrmecopora* Sauly erscheint mir sehr zweifelhaft).

*Myrmecopora* (*Xenusa*) *insignicornis* Fauvel 1878, *Ann.Mus. Genova*, XII., p.303, aus Neu-Guinea. (Die Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung *Myrmecopora* Sauly erscheint mir sehr zweifelhaft).

*Myrmecopora* (*Xenusa*) *pumilio* Sharp 1880, *Trans.Ent.Soc.London*, p.38, aus Hawaii.

*Myrmecopora* (*Xenusa*) *senilis* Fauvel 1878, *Ann.Mus. Genova*, XIII., p.582, aus Süd-Australien. (Die Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung *Myrmecopora* Sauly erscheint mir sehr zweifelhaft).

Aus der nearktischen Faunenregion:

*Myrmecopora* (*Ilyusa*) *vaga* Leconte 1866, *Proc.Acad.Nat.Philadelphia*, p.371, Falagria, vom Lake superior Nord-Amerikas. (Die Zugehörigkeit dieser Art zum Subgenus *Ilyusa* erscheint mir etwas zweifelhaft).

*Myrmecopora* (*Xenusa*) *californica* Scheerpeltz 1965, *Deutsche Ent.Zeitschr.*, neue Folge XII., p.49, aus Kalifornien.

Es ist aber, meiner Meinung nach, sehr wahrscheinlich, daß die in der vorstehenden Dichotomik behandelten, paläarktischen Arten und die oben angeführten Arten aus anderen Faunenregionen nur einen ganz kleinen Bruchteil der tatsächlich existierenden Arten der Gattung *Myrmecopora* Sauly darstellen. Die Biotope, in denen diese Arten leben, sind doch noch viel zu wenig untersucht worden! Ich bin überzeugt, daß bei künftigen, eingehenden Untersuchungen der maritimen Küstenfauna der Kontinente und ihrer Inseln noch viele, bis jetzt noch unbekannte Arten der Gattung auftauchen werden.

#### Literatur

- AUBÉ, Ch.: 1850, Description de quelques insectes coléoptères appartenant à l'Europe et l'Algérie. *Ann.Soc.France*, (2) VIII., p.299 - 346 (p.301).
- BERNHAEUER, M.: 1900, Neunte Folge neuer Staphyliniden aus Europa nebst Bemerkungen. *Verh.zool.bot.Ges.Wien, L.*, p.532-541 (p.537).  
1910, Beitrag zur Staphylinidenfauna des paläarktischen Gebietes. *Entom.Blätter*, VI., p.256-260 (p.259).  
1927, Zwei neue Kurzflügler aus Schweden. *Entomologisk Tidskrift*, XLVIII., p.167-168 (p.167).  
1927, Neue Kurzflügler des paläarktischen Faunengebietes. *Koleopt.Rundschau*, XIII., p.90-99 (p.97).
- BROUN, T.: 1912, Description of New Genera and Species of Coleoptera. *Trans.New-Zealand Inst.*, XLIV., p.379-440 (397-398).

- BUTLER, E.A.: 1909, *Myrmecopora brevipes*, a new species allied to *M. uvida* Er. and addition to the British Fauna. *Ent. Monthly Magazine*, XLV., p.29-31 (p.29).
- CAMERON, M.: 1926, Description of new species of myrmecophilous Staphylinidae from the Belgian Congo. *Ann. et Bull. Soc. Ent. Belgique*, LXVI., p.77-90 (p.87).
- EPPELSHEIM, E.: 1888, *Neue Staphyliniden Central-Asiens*. *Deutsch. Ent. Zeitschr.*, XXXII., p.49-67 (p.52).
- ERICHSON, W.: 1839-40, *Genera et Species Staphylinorum Insectorum Coleopterorum familiae* (p.73-74, 910).
- FAUVEL, A.: 1878, *Les Staphylinides des Moluques et de la Nouvelle Guinée*. *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XII., p.63-121, 171-315 (p.303).  
1878, *Les Staphylinides de l'Australie et de la Polynésie*. *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XIII., p.168-298, 465-596 (p.582).
- GANGLBAUER, L.: 1895, *Die Käfer Mitteleuropas*, II. (p.249-251).
- KIESEWETTER, H.v.: 1850, *Fünzig Diagnosen unbeschriebener oder wenig bekannter europäischer Käfer*. *Stettiner Ent. Zeitg.*, XI., p.217 - 235.
- KOCH, C.: 1935, *Wissenschaftliche Ergebnisse der entomologischen Expeditionen Seiner Durchlaucht des Fürsten Alessandro C. della Torre e Tasso nach Ägypten und auf die Halbinsel Sinai*. XIII. *Staphylinidae*. *Publ. Mus. "Pietro Rossi", Duino*, p. 1-122 (p.100-102).
- KÜSTER, H.C.: 1854, *Die Käfer Europas nach der Natur beschrieben*, XXVI., nr.8, 9.
- LECONTE, J.L.: 1866, *Additions to the Coleopterous Fauna of the United States*. *Proc. Acad. Nat. Science, Philadelphia*, p.361-394 (p.371-392).
- MULSANT, E. et REY, Cl.: 1871 - 75, *Histoire Naturelle de Coléoptères de France*, Pars 23, *Brévipennes, Aléochariens, Myrmédonaires*, I. - V. (IV., p.410-425).
- RAMBOUSEK, F.J.: 1909, *O Bulharských Staphylinidech*. *Věstník České Spol. Nák.*, Praha, p.1-33 (p.19).
- SACHSE, F. 1852, *Neue Käfer beschrieben von Dr. Sachse in Leipzig*. *Stettiner Ent. Zeitg.*, XIII., p.115-127, 142-149, 454 (p.115).
- SAULCY, F.de: 1864, *Descriptions des espèces nouvelles de Coléoptères en Syrie et en Egypte et en Palestine*. *Ann. Soc. Ent. France*, (4) IV., p.421-448, 629-660 (p.429-430, 629).
- SHARP, D.: 1874, *The Staphylinidae of Japan*. *Trans. Ent. Soc. London*. p.1-103 (p.11-12).  
1880, *On some Coleoptera from the Hawaiian Islands*. *Trans. Ent. Soc. London*, p.37-54 (p.38).

SCHEERPELTZ, O.: 1965  
de  
De  
WOLLASTON, T.V.: 186  
M  
18

- es, a new species allied to *M. uvida*  
the British Fauna. Ent. Monthly Mag.  
-31 (p.29).
- species of myrmecophilous Staphy-  
lgian Congo. Ann. et Bull. Soc. Ent.  
77-90 (p.87).
- n Central-Asiens.  
r., XXXII., p.49-67 (p.52).
- ies Staphylinorum Insectorum Coleo-  
73-74, 910).
- Moluques et de la Nouvelle Guinée.  
r. Nat. Genova, XII., p.63-121,
- des de l'Australie et de la Poly-  
. Stor. Nat. Genova, XIII., p.168-
- europas, II. (p.249-251).
- en unbeschriebener oder wenigbe-  
Käfer. Stettiner Ent. Zeitg., XI.,
- nisse der entomologischen Expedi-  
ucht des Fürsten Alessandro C. della  
nd auf die Halbinsel Sinai.  
"Pietro Rossi", Duino,
- atur beschrieben, XXVI.,
- us Fauna of the United  
e, Philadelphia, p.361-
- nouvelle de Coléoptères de  
, Aléochariens, Myrmédo-  
425).
- dech. Věstník České Spol.
- sachse in Leipzig. Stettiner  
7, 142-149, 454 (p.115).
- ouvelles de Coléoptères en  
estine. Ann. Soc. Ent. France,  
50 (p.429-430, 629).
- ans. Ent. Soc. London. p.1-103
- from the Hawaiian Islands.  
7-54 (p.38).
- SCHEERPELTZ, O.: 1965, Eine neue Art der Gattung *Myrmecopora* Saulcy von  
der pazifischen Küste Nordamerikas, (Col. Staph.).  
Deutsche Ent. Zeitschr., n.F., XII., p.49-51.
- WOLLASTON, T.V.: 1860, On addition to the Madeiran Coleoptera. Ann.  
Mag. Nat. Hist. (3) VI., p.48-54, 100-109 (p.51).  
1864, Catalogue of the Coleoptera of the Canaries (p.534)